

A c t i t i s

Avifaunistische Mitteilungen

aus den Bezirken

Leipzig und Karl-Marx-Stadt

Im Auftrage der Bezirksfachausschüsse Ornithologie  
des Deutschen Kulturbundes und der Bezirksnatur-  
schutzverwaltungen beider Bezirke

herausgegeben von

Kurt Größler

Dieter Saemann

Klaus Tuhscherer

Willy Weise

(für Leipzig)

(für Karl-Marx-Stadt)

Heft 6

Leipzig/Karl-Marx-Stadt

Februar 1972

- als Manuskript gedruckt -

Die Anschriften der Herausgeber

Kurt Größler	701 Leipzig, Perthesstr. 5
Dieter Saemann	9382 Augustusburg, Schloß
Klaus Tuchscherer	701 Leipzig, Waldstr. 13
Willy Weise	9113 Claußnitz, Untere Dorfstr. 84

Zu beziehen durch das Sekretariat des Deutschen Kulturbundes  
Leipzig, 701 Leipzig, Käthe-Kollwitz-Str. 115

und

"Museum für Jagdtier- und Vogelkunde"

9382 Augustusburg, Schloß

Inhalt:

Beobachtungsbericht 1968

Zusammengestellt von K. Größler und  
K. Tuhscherer (Leipzig)  
sowie D. Saemann und W. Weise  
(Karl-Marx-Stadt)

## 1. Vorbemerkungen

Heft 6 unserer kleinen Reihe enthält nur den Beobachtungsbericht für 1968 und trotzdem mußten wir den vorliegenden Stoff straffen, um den vorgeschriebenen Umfang nicht zu überschreiten. Ein erfreuliches Zeichen der regen Mitarbeit zahlreicher Helfer, deren Namen in den Heften 4 und 5 aufgeführt sind. Die neu hinzugekommenen werden am Anfang dieses Berichtes genannt. Ihnen allen sei hiermit herzlich gedankt.

Vorbemerkungen sind nur wenig erforderlich, wir haben uns bemüht, die Aufbereitung des Materiales in Form und Aussage der des Vorjahres anzugleichen. Erstmals war es durch freundliche Hilfe von H. Dorsch möglich, die Beringungslisten aller Beringer des Bezirkes Leipzig - bis auf eine unwesentliche Ausnahme - nach faunistisch interessanten Angaben durchzugehen und auszuwerten. Dies zeitigte besonders bei den Arten gute Ergebnisse, die sich der Beobachtung leicht entziehen (vgl. Rohrsänger, Braunelle, Blaukehlchen usw.). Bei den aufgeführten Dekadenzahlen für Wasservögel bitten wir zu berücksichtigen, daß es sich um die Maximalwerte aus ausgewählten Beobachtungsgebieten handelt. Es sind somit einerseits (bei den Enten) nicht alle im Bezirk festgestellten Vögel erfaßt und andererseits durchaus Doppelzählungen möglich, wenn innerhalb der 10 Tage die Tiere ihren Rastplatz wechseln.

Möge weiterhin eifrige Mitarbeit uns helfen, die aufgewandte Mühe und Zeit vergessen zu lassen.

## 2. Übersicht der in den Heften 4 und 5 noch nicht genannten Beobachter

### Leipzig

Alletter	Arndt	Buschen
Busenius	Büttner	Dietze
Eichstädt	Feilotter(Fei)	Friedel
Fritzsche	Geißler	Großmann
Harlitzschka	Hartung	Heller (Hel)
Heinig	Höfig	Johannes
Joiko	Kohl	Karg

Köcher	Körner, G.u.B.	Küppe
Kunze	Leonhardt (Leo)	Marschner
Mühlbauer	Oehme	Oeler
Olzmann	Opens	Oppermann (Opp)
Pontius	Prochno	Puder
Rafael	Rauppach	Richter (Ri)
Rößner	Rosenkranz	Salzmann
Schubert	Sengenberger	Steinbach
Stelzner	Straßburg	Stremke (Stre)
Strohmann (Stro)	Trenkmann (Tre)	Urban
Verständig	Vogel	Weber (Web)
Weidner	Wolf	Zetzsche
Zöhe	Zschockelt	

#### Karl-Marx-Stadt

Beobachter, Namensabkürzungen und die Beobachtungsgebiete siehe in Heft 4 und 5.

1968 kamen folgende Mitarbeiter hinzu:

Kiekhöfel, P.	Kiek	Großhartmannsdorfer Teiche, Talsperren im Gebirge (Wasservogelspezialist)
Krajewski, B.	Krej.	S-Teil Krs. KMStadt-Land
Schubert, K.	Schub	Plauen und Umgebung
Wiegand, H.	Wieg	Kreis Glauchau, bes. Rumpfwald und Ebersbacher Wald.

-----

Berichtigung: Die Angaben unter Misteldrossel Bez. KMStadt (Heft 5, S. 58) beziehen sich auf den Steinschmätzer !!

3. Übersicht über die Ankunfts- und Abzugsdaten Bezirk Leipzig 1968

Haubentaucher	18.2. Fö, /10.3. Wei, Hoy/17.3. Do, G/	(22.3.)	-	8.12. G, 10.12. Kop
Rothalstaucher	16.3. Fö 24.3. Fö	(26.3.)	-	1.12. Fö, 8.12. G
Schwarzhalst.	30.3. Fö, Wei 7.4. G	(13.4.)	-	27.10. Fö, 1.12. Fö
Zwergrohrdommel			-	14.9. Frie
Weißstorch	31.3. Wei 8.4. G, Feh	(13.4.)	-	viele Spätdaten
Roter Milan	2.3. G 4.3. Oeh	(6.3.)	-	4.10. Kop, 6.10. Kop
Schwarzer Milan	27.3. Sch 31.3. G, Oeh	(2.4.)	-	20.9. C. Feh, 22.9. G
Wespenbussard	9.5. Wb 11.5. Fö	(12.5.)	-	14.9. Grö, 5.10. Grö
Rohrweihe	22.3. Mar 23.3. Wei, Fö/	(27.3.)	-	30.9. Wb, 7.10. Fö
Baumfalk	21.4. Wb 27.4. Fö, Wb, Sch	(28.4.)	-	28.9. Fö, Grö, 29.9. Mar
Wasserralle	15.4. Fö 27.4. G		-	19.10. Fö, 30.10. Mar
Kiebitz	18.2. Frie 3.3. G, Fö, Hoy	(9.3.)	-	28.11. Leh, Grö, 4.12. Leh
Flußregenpf.	24.3. Fö 31.3. Do, G, Fö, Grö	(12.4.)	-	21.9. Fö 7.10. Fö
Bekassine	16.3. Fö 17.3. Tu	(23.3.)	-	23.11. Hoy, 24.11. Fö
Hohltaube	9.3. Fö 16.3. G	(23.3.)	-	7.9. Tre
Ringeltaube	15.3. Mar 16.3. Fö, Grö	(17.3.)	-	25.10. Kop, 3.11. Ha
Turteltaube	23.4. Kop 27.4. Fö	(2.5.)	-	3.9. G. Feh, 15.9. Fö, Tu
Kuckuck	17.4. Har 20.4. Fö	(21.4.)	-	8.9. Fö, 5.10. Fö
Mauersegler	20.4. J. Fie 23.4. Leh	(27.4.)	-	3.9. Fö, 15.9. Erd
Wendehals	20.4. Fö 21.4. Frie	(27.4.)	-	31.8. Fö, 7.9. Fö
Heidelerche	11.3. Oeh 16.3. G	(17.3.)	-	19.10. G, 20.10. Fö
Feldlerche	24.2. Fö, Grö 26.2. Oeh	(9.3.)	-	3.11. Fö, 23.11. Grö

Rauchschwalbe	17.3.Grö,	31.3.Weil,Fö,Oeh	(6.4.)	-	19.10.Oeh,Fö, 20.10.Leh
Mehlschwalbe	10.4.Erd,	21.4.Oeh	(5.5.)	-	4.10.Oeh, 5.10.Fö
Uferschwalbe	13.4.G,	21.4.Fö	(25.4.)	-	28.9.Fö,Grö, 16.10.Leh
Pirol	3.5.Mar,	5.5.Fö,Ha,Tu	(6.5.)	-	7.9.Fö, 8.9.Weil
Misteldrossel	21.2.Kop,	26.2.Kop	(2.3.)	-	13.10.Tu,Grö,19.10.Kop
Singdrossel	18.2.Fö,	24.2.Oeh	(25.2.)	-	17.11.Tu, 8.12.Kop
Steinschmätzer	27.3.Do,	28.3.Fö	(30.3.)	-	28.9.Grö, 29.9.Frie
Braunkehlchen	15.4.Erd,	18.4.Mar	(20.4.)	-	8.9.Ha, 14.9.G
Gartenrotschw.	31.3.Fö,	3.4.Erd	(6.4.)	-	7.10.Ha, 13.10.Fö
Hausrotschw.	23.3.Weil,Mar	25.3.Oeh	(26.3.)	-	19.10.Fö,Grö, 26.10.Grö
Nachtigall	17.4.Fö	18.4.Leh	(19.4.)	-	7.8.Fö, 19.8.Fö
Feldschwirl	27.4.G,	28.4.Fö	(29.4.)	-	1.8.Fö
Drosselrohrs.	19.4.Oeh,	21.4.Fö	(23.4.)	-	
Teichrohrs.	28.4.Do,	2.5.Leh	(5.5.)	-	6.10.Fö,Ki,Opp, 13.10.Gro
Sumpfrohrs.	5.5.Tu,	9.5.Fö	(16.5.)	-	7.9.Gro, 8.9.Opp
Schilfrohrs.	12.4.G	17.4.Mar	(21.4.)	-	8.9.Fö, 21.9.Karg
Gartenspötter	3.5.Fö,	4.5.Karg	(5./6.5.)	-	11.9.Erd 6.9.Schu
Mönchsgrasm.	1.3.Ze,	30.3.Sch	(6.4.)	-	13.10.Fö, 23.10.Wg
Sperbergrasm.	9.5.Mar	10.5.Oeh		-	
Gertengrasm.	28.4.Fö	29.4.Fö,Wg	(30.4.)	-	8.9.Fö, 14.9.Fö
Dorngrasmücke	17.4.Erd,	21.4.Weil,Fö	(22.4.)	-	8.9.Fö, 14.9.Fö, Ku
Zaungrasmücke	12.4.Grö,	13.4.Wg,Tu	(14.4.)	-	21.9.Fö, 7.10.Ki
Fitis	27.3.Oeh,	28.3.Fö	(29.3.)	-	5.10.Grö, 13.10.Fö
Zilpzalp	22.3.Fö,	23.3.Fö,Frie	(24.3.)	-	20.10.Grö, 27.10.Fö, 4.11.Opp
Waldlaubsänger	14.4.Grö,	15.4.Frie	(18.4.)	-	7.9.Fö

Grauschnäpper	5.5.C.Feh,	6.5.Fö	(9.5.) -	14.9.Fö,Grö, 22.9.Wg
Trauerschnäpper	16.4.Fö,	18.4.C.Feh	(20.4.) -	4.10.Wg, 7.10.Fö
Brachpieper	18.4.Mar,	20.4.Fö	(27.4.) -	31.8.Fö.
Baumpieper	6.4.Fö	7.4.Do	(12.4.) -	21.9.Fö, 22.9.Ki
Wiesenstelze	27.3.Grö,	2.4.Mar	(7.4.) -	28.9.Fö,Grö, 12.10.Grö
Bachstelze	8.3.Mar,	12.3.Oeh	(16.3.) -	16.11.Hel, 23.11.Oeh
Rotrückenvürger	28.4.G,	5.5.Ha	(6.5.) -	15.9.Wg, Grö, 7.10.Fö
Girlitz	31.3.Fö,	8.4.Erd	(14.4.) -	5.10.Grö, 27.10.Fö
Gartenammer	20.4.Fö,	23.4.Kop	(28.4.) -	9.7.Kop, 13.7.Fö

Ankunfts- und Abzugsdaten Wintergäste Bezirk Leipzig 1968

Saatgans	5.10.Fö,	7.10.G,Ha	-	9.3.Fö, 16.3.Leh
Rauhfußbussard	30.9.Wb,	6.10.Wb	-	30.3.Grö, 13.4.Fö
Sperber	17.9.Kop,	28.9.We	-	8.4.Kop, 10.4.Puder
Kornweihe	12.10.Kop,	27.10.Ha, Fö	-	30.3.Sch, 7.4.Do
Wachholderdrossel	7.9.Fö,	15.9.Tu	-	19.4.Erd, 21.4.Fö
Rotdrossel	14.9.Wb,	4.10.Kop	-	18.4.Fö, 21.4.Do
Wasserpieper	28.9.Fö,	17.10.Erd	-	31.3.Grö, 13.4.Grö
Berghänfling		21.10.Grö	-	9.4.G, 10.4.Erd
Erlenzeisig	8.9.Fö,Kop,	15.9.Tu	-	12.4.Grö, 28.4.Fö
Gimpel	20.10.Fö,	26.10.Ha	-	9.3.Ha, 24.3.Fö
Bergfink	17.9.We,	20.9.Erd	-	31.3.Fö,G 7.4.Ha

4. Beobachtungsbericht 1968

1. Prachtaucher - Gavia arctica

Leipzig: Nur zwei Exemplare weilten im Gebiet:

27.10. - 10.11.	Grube Pehnsforst	1	G, F8, Steinbach
1.12.	Grube Witznitz	1	F8

KMStädt: Einem Frühjahrs- stehen 5 Herbstnachweise gegenüber:

16.-18.4.	Stausee Glauchau	1	Ho, Fri
26.10.	Großteich Großhartmannsdorf	1	Lie
27.10.	Hüttenteich Berthelsdorf	1	Schmi
15.-17.11.	Talsperre Cranzahl	1	Di
16.-20.11.	Schwanenteich Zwickau	1	OLz, Sieb
20.11.	Talsperre Cranzahl	2	Holu

2. Eistaucher - Gavia immer

KMStädt: 1 Ex. wurde von Kiek am 21.11. auf dem Großteich in Großhartmannsdorf beobachtet.

4. Sterntaucher + Gavia stellata

KMStädt: 25./26.5.	Talsperre Cranzahl	1	im Brutkleid Di, Holu
26.10.	Großhartmannsdorf	1	ad. Kiek
17.11.	Talsperre Pöhl	4	Cz/FG Reichenbach

5. Haubentaucher - Podiceps cristatus

Leipzig: Die große Zahl der Brutgebiete läßt die Möglichkeit offen, daß 1968 nicht alle Paare erfaßt worden sind.

Übersicht des Brutbestandes:

Gebiet	Paare	Jungenzahlen						Beobachter	
		?	0	1	2	3	4	5	
Speicherb. Wind.	2		2						G, F8
Schafteich Wind.	1			1					G, F8
Haselbacher Teiche	24		5	11	8				G, F8

Gebiet	Paare	Jungenzahlen							Beobachter
		?	0	1	2	3	4	5	
Eschef. Teiche	10		7	2		1			G, Fö, Frie u. a.
Seebischteich	1				1				Fö, G
Wermisd. Dokorteteich	8	8	(insg. 12 juv)						C. Feh
Göttwitzsee	10	10	(insg. 12 juv)						C. Feh
Horstsee	2	2							C. Feh
Langenrodaer S.	1	1							C. Feh
Zeisigteich	1	1							C. Feh
Kirchenteich	4	4							C. Feh
Häuschenteich	1	1							C. Feh
Dreiteiche	1	1							C. Feh
Harthteich Grethen	1					1			Tu
Münchert. Grethen	3				1	2			Fö, Tu
Rohrbacher Teiche	3			1		1	1		Fö, Tu, Oeh
Tagebau Kulkwitz	2		2						Do, Grö
Grube Rückmarsdorf	4				1	2	1		Grö
Schilfteich Gotha	1	1							Tu
Dammühl. Fraunwalde	1			1					Kop
Burkartshain Mühl.	3	3							Kop
Schwemmt. Machern	1	1							Tu
Machert. Machern	1	1							Stro
Galgent. Lübschütz	1			1					Li
Neumühl. Schildau	8	7						1	Tu, Leh
Schloßteich Trossin	1					1			Tu
Bennewitzer Teiche	5	4		1					Tu
Teiche Klitzschen	1			1					Tu, Leh
Großteich Torgau	11		1	7	2	1			Tu
Furtmühlent. Trossin	1					1			Tu, Leh
Dorfteich Dahlenb.	1							1	Tu, Leh
Teiche Kleinbeucha	3		2		1				Tu
Lausiger Teiche	6		1	2	3				Tu
	124	45	20	28	17	10	2	2	

Vom Großteich Burkartshain und den Teichen bei Trebsen liegen keine Meldungen vor, aus beiden Gebieten sind Brutvorkommen aus anderen Jahren bekannt und auch für 1968 wahrscheinlich.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich einige Bestandsänderungen - Abnahme der Brutpaarzahlen in Torgau und Eschefeld, Zunahme in Wermsdorf -, der Gesamtbestand hat sich jedoch gehalten. Zur Brutzeit wurden Altvögel zeitweilig am Stolpenteich Heyda (Kop), Mühlteich Machern (Tu) und am Ausreißerteich (Tu) angetroffen.

75 Paare führten 134 juv., d.h. 1,78 juv/Paar, weitere Paare zogen keine Jungvögel auf, sodaß die tatsächliche Zahl 1,40 juv/Paar beträgt.

Im Vergleich mit den Zahlen des Vorjahres ein recht ungünstiges Ergebnis. Eine sichere Zweitbrut kontrollierten Leh und Tu im Teichgebiet bei Klitzschen.

Übersicht des Durchzuges (berücksichtigt sind nur die Beobachtungen von den drei wichtigsten Rastgebieten, in denen die Art nicht brütet):

Mo/Dek.		Elsterstausee	Grube Witznitz	Pleißestausee
Febr.	II			1 F8
	III			
März	I	2 Hoy	1 F8	
	II	2 F8	8 F8	3 F8
	III	4 F8, Gr8	5 F8	2 F8
April	I	10 Hoy	8 F8	
	II	2 F8	20 F8	
	III	2 F8, Wei		
Mai	I		7 F8	
	II	5 Wei	3 F8	2 G
	III			
Juni	I	2 Hoy		
	II	7 F8	8 F8	
	III	1 F8	7 F8	4 F8
Juli	I	6 F8		
	II	5 Ho	22 F8	11 G
	III	3 F8	5 F8	8 F8
Aug.	I	4 F8	12 F8	4 F8
	II	2 F8		18 G
	III	6 F8	8 F8	14 F8

Sept.	I	10 Wg	34 F8	4 F8
	II	10 F8, Wei, Grö		5 Grö
	III	13 Hoy	16 F8	19 F8
Okt.	I	14 Hoy	23 F8	40 F8
	II	20 Hoy	39 F8	10 F8
	III	16 Hoy	8 F8	12 F8
Nov.	I			4 Wei
	II		6 F8	18 F8, Wei
	III		25 F8	16 G
Dez.	I		14 F8	4 F8

KMStädt: 1968 kamen Brutmeldungen von folgenden Gewässern:  
 Stausee Glauchau 19.5. 24 besetzte Nester,  
 52 Altvögel 24-26 P. Ho, Fri  
 GroSteich Großhartmannsdorf (1 x 2 juv)  
 6 P. Ihle, Wer  
 Hüttenteich Berthelsdorf (5 juv) 1 P. Lie, Wer  
 Hegeteich Narsdorf (Bez. Lpz.) 2 P. T. Mü  
 Burgteich Plauen 1 P. Schub

Weitere, z.T. kurzfristige Brutzeitbeobachtungen lassen auf Ansiedlungen hoffen:

GroSteich Limbech: 1./2.6. 1 P. balzend J. Frö, Sae  
 Talsperre Cranzahl: 25.5. 1 P. mit schwachem Balzverhalten Di  
 Filzteich Schneeberg: 1.6. 1 Ex. R. M8  
 Talsperre Pöhl: 30.4. 1 P Balz, 12.5. 4 Ex., 20.5. 2,  
 1.6. und 7.7. je 2 Ex. (Wo)

Vom Durchzug lagen 1968 nur 7 Nachweise (16.8. - 15.12.) vor, maximal 10 Ex., 17.11. Talsperre Pöhl (Gz).

#### 6. Rothelsteucher - Podiceps griseigena

Leipzig: Auch bei dieser Art hat sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr gehalten.

Übersicht des Brutbestandes:

Gebiet	Paare	Jungenzshlen					Beobachter
		?	0	1	2	3	
Seebischteich	1	1					F8, G
Eschefelder T.	5		1	1	1	2	F8, G, Frie u.a.
Doktort. Wermsd.	3	3					Kop, C. Feh

Kirchteich Wermsd.	1	1				C. Feh
Göttwitzsee Wermsd.	1	1				C. Feh
Rohrb. Teiche	1				1	F8, Tu, Oeh
Münchert. Grethen	1	1				Tu
Stolpent. Heyda	2		1	1		Kop, Leo
Teiche Klitzschen	3		1	1	1	Tu, Leh
Leusiger Teiche	1	1				Tu
Grube Rückmarsd.	1		1			Gr8
insgesamt	20	8	4	3	2	3 -

8 Paare führten 16 juv = 2,00 juv/Paar, einschl. der jugenlosen Paare 1,33 juv/Paar.

Frühjahrszugdaten liegen für den Elsterstausee vor:

6.4. 3 (Wei), 7.4. 1 (Hoy), 13.4. 1 (Hoy) und 19.5. 3 (Wei).

Li traf am 19.4. auf dem Galgenteich/Lübschütz 1 Ex. an.

Den Herbstzug soll folgende Übersicht veranschaulichen:

Mo/Dek.	Pleißest.	Elsterst.	Witznitz	Sp. Wind.	Großt. T.
July	II	1 F8			1 Tu
	III				1 Tu
Aug.	I	2 F8			
	II	1 G			
	III	3 F8	1 F8, Hoy		
Sept.	I	4 F8	1 Ho	1 F8	
	II	4 Gr8	1 F8, Wei		1 F8, Frie
	III	3 F8			
Okt.	I	5 F8			
	II	6 F8			
	III	4 F8			
Nov.	I	7 Wei			
	II	7 F8			
	III	4 G, F8		1 F8	
Dez.	I	1 G, F8			

KMStädt: Großteich Großhartmannsdorf 1 P Iie, Kiek, Wer Gelege wurde am 4.6. verlassen (Kiek).

Hüttenteich Berthelsdorf 25./27.5. 1 Ex. Iie, Kiek

Durchzug: Großhartmannsd. 20.4. 1 (Ihle, Iie), 15.-21.11. 6 (Kiek) Talsperre Pirk 31.10. 1 (Ern, Tho)

7. Ohrentsucher - Podiceps auritus

KMStädt: 19.1. Helsdorf bei Burgstädt lebend gegriffen

1 Graupner am 21.1. gestorben. Präparat im Museum Augustusburg I 1087 A 1 (Sae)

22.4. GroSteich GroBhartmannsdorf 1,0 Kiek

8. Schwarzhelstaucher - Podiceps nigricollis

Leipzig: Im Eschefelder Teichgebiet brüteten 30 Paare.

Sie zogen 61 Jungvögel auf. Im Mai/Juni wurde die Art ferner notiert Rohrbacher Teiche: 15.5. 3 Oeh, Kirchteich Grethen 2.6. 2 Tu, GroSteich Torgau: 5.5. 1 Tu. Es kam jedoch zu keinen weiteren Ansiedlungen.

Herbstzug:

Mo/Dek.	Sp.Wind	Fleißest.	GroSt.T.	Haselb.	Witznitz
Juli	I				
	II		1 Tu		
	III			3 F8	
Aug.	I	3 F8			
	II	1 G	1 G	4 F8	
	III	1 F8	1 F8	2 F8	1 F8
Sept.	I	2 F8	5 F8		2 F8
	II		5 Gr8		
	III	1 G	5 F8		
Okt.	I		4 F8	1 F8	
	II		2 F8	3 Tu	
	III		1 F8		

F8 traf am 1.12. noch auf dem Grubensee Witznitz 1 Ex. an.

KMStädt: Am GroSteich GroBhartmannsdorf hielten sich am 4.5. 2, 13.5. 3 und 21.5. 1 Ex. auf (Kiek), Hüttenteich Berthelsdorf 4.5. 2 Ex. (Wer). Keine Brut!

Im Herbst gelangen 3 Beobachtungen einzelner Ex.: 28.8. Pelzmühle KMStädt (J.Fr8), 15.9. Teich Geyer (C.Feh) und 24.11. GroBhartmannsdorf (Kiek).

9. Zwergtaucher - Podiceps ruficollis

Leipzig: Wie in den vorangegangenen Jahren weisen die eingegangenen Meldungen nur eine sehr unvollständige Übersicht des Brutbestandes aus. Es ist unbedingt mehr auf diese Art zu achten.

Es zeichnet sich möglicherweise ein Rückgang ab.

- Krs. Torgau: Benkenteich 3-4 P. (Leh, Tu), Kuhteich Torgau 2 P. (Tu), Teiche Klitzschen 1 P. (Tu), Altwasser Dübren 1 P. (Leh),
- Krs. Eilenburg: Teich Wölpern 1 P. (Wg), Röcknitz Kuhteich 2 P. (Kop), Schilfteich Gotha 3 P. (Tu),
- Krs. Delitzsch: Kosebruchteiche 2 P. (Erd),
- Krs. Leipzig: Rosentalteich 1 P. (Erd, Grö, JS), Auenhain 1 P. (Erd), Dölitz 1 P. (Erd), Meusdorf 1 P. (Erd), Güldengossa 1 P. (Erd), Papitzer Lachen 2-3 P. (JS, Wb), Böhlitz-Ehrenberg 1 P. (Grö, JS), Imnitz 3-4 P. (Fö). (Grö), Schkeuditz 1 P. (Gro), Rückmarsdorf Grube 9-10 P. (Grö), Schönsau Lache 4 P. (Grö),
- Krs. Altenburg: Sp. Wind. 5 P. (G, Fö), Haselbach 10-12 P. (G, Fö),
- Krs. Geithain: Eschefeld 18-20 P. (G, Fö u.a.)
- Krs. Borna: Steinbach 1 P. (Tu), Kleinbeucha 4-5 P. (Grö, Tu)
- Krs. Grimma: Göttwitzsee 5 P. (Ha, C. Feh, G. Feh, Erd), Otterwisch 2 P. (Fö, Tu), Müncherteich 5 P. (Fö, Tu), Rohrbach 5 P. (Fö, Grö, Tu, Geh), Kirchteich Grethen 3-4 P. (Tu), Teich Behren 1 P. (C. Feh),
- Krs. Wurzzen: Falkenhain Holzteich 1 P. (Kop), Thammenhain Holzteich 2 P. (Kop), Stolpenteiche 3 P. (Kop), Dornreichenbach Straßenteich 1 P. (Kop), Schwemnteich Machern 1 P. (Tu), Treseteich 2 P. mit 1 und 4 juv. (Li), Tierparkteich Püchau 2 P. mit 4 und 2 juv. (Li),
- Krs. Oschatz: Horstsee (C. Feh)
- Bekannt wurden womit 39 Brutgebiete mit ca. 125 Paaren.

Durchzug (in den wichtigsten Rastgebieten, in denen die Art nicht brütet):

Mo/Dek.	Elsterfl.	Elsterst.	Pleißest.	Sp.Wind.	Witznitz
Jan. I	1 JS, Tu	2 Hoy, Wei			
II	1 Grö	2 Hoy			
III	1 Grö	1 Fö, Ho			3 Fö
Febr. I					3 Fö
II	1 JS				1 Fö
III					
März I	1 JS, J. Fie				1 Fö
II	1 Grö	1 Hoy			
III	1 JS, Wg	11 Hoy, Grö	2 Fö	2 Fö	
April I		12 Hoy			
II		9 Fö		7 G	
III		1 Fö		14 Fö	
Mai I					
II			1 G		
III					
Juni II	1 Grö				
III		1 Fö	4 Fö		
Juli I					
II			21 G	1 Fö	
III		6 Fö	74 Fö	7 Fö	
Aug. I		4 Fö	161 Fö	5 Fö	
II		4 Fö	219 G	9 Fö	
III		8 Fö		17 Fö	
Sept. I		20 Hoy Ger	314 Fö	64 Fö	
II	3 Erd	8 Hoy	343 Grö	19 Fö	
III	2 Wg, Grö	8 Fö	507 G	22 Fö	
Okt. I		1 Hoy	489 Fö	5 G	16 Fö
II	4 Erd	1 Hoy, Grö	490 Fö	12 Fö	
III	1 Tu, Grö	1 Hoy	119 Fö	4 G	
Nov. I	3 Erd			4 G	
II			21 Fö	6 G	1 Fö
III			16 G	4 Fö	
Dez. I			2 Fö, G	2 G	
II			1 Fö	1 G	

KMStadt: 1968 wurden folgende Brutvorkommen gemeldet:

Kreis	Gebiete	Paare	Beobachter:
Reichenbach	Waschteich Reuth	3	Cz
Rochlitz	Königsfelder Waldt.	3-4	T. Mü
KMStadt/Land	Limbacher Teiche	4	J. Frö, Sae
KMStadt/Stadt	Stadttrand (2-3 Geb.)	2-3	J. Frö, Sae
Brand-Erbisd.	Großhartmannsdorf	2-3	Ihle, Wer
Annaberg	Weberteich Schönfeld	2	Di
Zwickau/Land	Höhlteich Oelsnitz	1	Wink
Auerbach	Unterlauterbacher T.	3	Ern

Mit 20-23 P. erreichte der Brutbestand gegenüber dem Vorjahr nur etwa 50%.

Der Durchzug blieb an allen Gewässern des Bezirkes gering. Die größte Ansammlung notierte C. Feh am 6.10. mit 50 Ex. an der Saydenbachtalsperre. Die folgende Tabelle der P- und n-Werte soll den Durchzug im Bezirk veranschaulichen:

Mo/Dek.	p	n	max.	Mo/Dek.	p	n	max.
März I				Okt. I	7	75	50
II				II	10	26	5
III	1	2	2	III	5	14	4
April I	2	3	2	Nov. I	2	4	3
II	2	2	1	II	5	7	3
III	1	2	2	III	1	1	1
Mai I	1	4	4	Dez. I			
II				II			
III	1	2	2	III	1	1	1
Juli III	1	3	3				
Aug. I	1	6	6				
II	2	2	1				
III	1	10	10				
Sept. I	5	21	9				
II	6	30	9				
III	5	31	10				

Am 14.1. notierte Cz am Wehr der Franzmühle/Elster 37 Ex.

#### 20. Kormoran - Phalacrocorax carbo

Leipzig: 1968 gelangen nur 5 Beobachtungen:

Frühjahr: 17.3. Eschefelder Teiche	1 Frie
1.4. Göttwitzsee	1 C. Feh

Herbst:	20.10. Großteich Torgau	1 ad G
	24.11. Pleiße-Stausee	2 G
	10.12. Lützschena	1 Wb überfliegend.

KMStad: 1968 lediglich 3 Wegzugsdaten:

3.11. Taurea Kra. KMSt/Land nach SSE	4 H.End, W. Wei
14.11. Großteich Großhartmannsdorf	1 ad Kiek
16.11. Talsperre Cranzahl	1 Di

25. Fischreiher - Ardea cinerea

Leipzig: Auch 1968 gelangen in den Rastgebieten wieder die Beobachtungen von größeren Ansammlungen. Im Juli Ansammlungen an den Bennewitzer Teichen, z.B. 16.7. 18 (Tu), 17.7. 25 (Kri).

Übersicht:

Mo/Dek.	Sp.Wind.	Elsterst.	Groß.T.	Elsterfl.	Eschef.T.
Jan.	I	13 Fö			
	II	8 Fö		2 Erd, Eb	
	III	2 Hoy		2 Grö	
Febr.	I 2 G	3 Hoy		1 Wg	2 Fei
	II 1 Wei	10 Fö	21 Leh		
	III	1 Fö, Hoy			
März	I 4 Wei	4 G, Wei		1 Wg	
	II 3 Fö	1 Grö	9 Tu	1 Grö	
	III 1 G, Fö	8 Hoy	14 Fö	3 Grö	6 Fö
April	I			1 Erd, Wg	
	II	1 Fö			
	III 2 Fö	8 Wei		1 Grö	1 Fö
Mai	I				
	II				
	III				
Juni	I				
	II				
	III 14 Grö	1 Fö			6 G
Juli	I	1 Fö			4 Fö
	II 10 Fö		3 Tu		
	III 3 Fö	1 Fö		1 JS	2 Frie

Mo/Dek.	Sp.Wind.	Elsterst.	Großt.T.	Elsterfl.	Eschef.T.
Aug. I	19 G	2 F8, Hoy			
II	13 F8	4 F8			
III	18 F8	10 Hoy			
Sept. I	1 F8	5 G			5 F8
II	7 Frie	11 Hoy		1 Erd	
III	14 G	1 Wei			1 F8
Okt. I	40 G	1 Hoy	24 F8		
II	44 G, F8	15 Hoy	101 Leh		
III	29 G	41 JS	60 Mar		18 Fei
Nov. I	41 G	45 Hoy	110 Leh		
II	45 G	11 Hoy	44 Tu		
III	27 F8	42 F8	85 Leh		
Dez. I	22 G	43 Hoy	72 Leh		5 Frie
II	5 G	12 Hoy			1 Frie
III	3 F8	7 Hoy	10 Leh		

KMStadt: 1968 lagen 54 Dekadennachweise mit 151 Ex. vor, deren zeitliche Verteilung nachfolgende Tabelle veranschaulicht:

Mo/Dek.	p	n	max.	Mo/Dek.	p	n	max.
Jan. I	1	7	7	Juli I			
II	2	5	4	II			
III	1	1	1	III	3	4	2
Febr. I				Aug. I	6	13	4
II	2	3	2	II	4	13	7
III				III	2	4	3
März I				Sept. I	4	13	9
II	2	3	2	II	3	18	8
III	2	4	2	III	5	16	10
Apr. I				Okt. I	4	14	6
II	2	2	1	II	1	16	16
III	2	4	3	III	1	1	1
Mai I				Nov. I	1	7	7
II	1	1	1	II	2	8	5
III	1	3	3	III	1	10	10
Juni I				Dez. I	1	3	3
II				II	1	3	3
III	2	2	1	III	1	1	1

Die unterstrichenen max-Zahlen sind gleichzeitig Werte von der Talsperre Pöhl, dem "bedeutendsten" Rastplatz des Bezirkes.

27. Silberreiher - Casmerodius albus

Leipzig: Nach Angaben von Hu soll Opéns 1 Stück am 30.8. am Horstsee angetroffen haben.

28. Seidenreiher - Egretta garzetta

Leipzig: Oeh teilt mit, am 19.8. habe sich am Rohrbacher Großteich 1 Ex. aufgehalten.

29. Rallenreiher - Ardeola ralloides

Leipzig: Ki meldet für den 8.6. 1 Rallenreiher für die Eschefelder Teiche.

31. Zwergdommel - Ixobrychus minutus

Leipzig: Seit Jahren erstmals wieder als Brutvogel in Eschefeld festgestellt, Beobachtungen:

Ki beringte am 16. und 17.8. je 1 juv.

Weitere Beobachtungen: Prödeler Lachen: 19.5. 1 (F8),  
Imnitzer Lachen: 23.6. 1 (F8), Hafen Leipzig 2 juv. beringt,  
30.6. (Do), Ausstiche Holzhausen: 16.6. 1 (Erd) und Papitzer  
Lachen 1 Paar (Gro). Mar traf am 16.6. 1,0 am Großteich  
Torgau an. Hier hat die Art in den letzten Jahren nicht ge-  
brütet. Am Lossener Teich Kreis Altenburg fing Ka am  
19.8. 1 juv.

KMStädt: Auch 1968 kein Hinweis auf Brut; 2 Wegzugnachweise:

1.8.	KMStädt Kläranlage	1 Sa, Schneider
31.8. und 1.9.	Hohenkirchen je	1 T.MU

33. Rohrdommel - Botaurus stellaris

Leipzig: Wieder zur Brutzeit nur im Kreis Torgau festgestellt.  
Am Großteich Torgau hörte Mar am 22.5. ein Männchen rufen.  
Im Juni rief 1 Ex. am Neumühlteich Schildau (Leh, Kop).  
Am 18.7. sah dort Leh 2 Stück. Ein Überwinterndes Stück fand  
sich vom 31.1. bis 3.2. an den Stolpenteichen ein (Kop).

34. Weißstorch - Ciconia ciconia

Die folgende Übersicht basiert zum größten Teil auf Angaben von Hu.

Leipzig: 1968 war ein sehr schlechtes Brutjahr. Die Zusammenstellung ist sicher nicht ganz vollständig!

Krs. Oschatz: Malkwitz HP o

Krs. Würzen:	Burkarts-		Püßhau HP o (Li)
	hain	HP o	Sachsendorf HP o
	Falkenhain	HP o	Meltewitz
			zeitweise 2 ad

(Nicht besetzt: Wasewitz, Pausitz)

Krs. Grimma:	Grethen	HP o	Gornewitz HP m 4
			Mutzschen HP m 2

Krs. Borna: Oelzschau HP m 3

Krs. Delitzsch:			Wolteritz HP o
	Mocherwitz	HP m 2	Reibitz
			zeitweilig 1 Paar
	Sausedlitz	HP o	Löbnitz HP m 4

Kreis Eilenburg:			Glauchau HP m 4 (Ku)
	Gostemitz	HP o	Schöna HP o

			Zsohepplin HP m 3 (Ku)
			Mörtitz HP m 2 (Ku)

Krs. Torgau:	Welsau	HP o	Döbern
			zeitweilig HP

	Mockritz	HP m 4	Neiden zeitweilig HP
	Drebligar	HP m 4	Proschwitz HP m 2
	Greudnitz	HP m 3	Dautzschen HP m 3

	Döbrichau	HP o	Weßnig
			zeitweilig HP

	Bennewitz	HP m 1	Mahitzschen HP m 3
--	-----------	--------	--------------------

	Staupitz	HP m 3	Klitzschen
			zeitweilig HP

	Melpitz	zeitweilig HP	Großwig HP m 4
--	---------	---------------	----------------

	Pflückhuff	HP o	Camitz
			zeitweilig HP

(Nicht besetzt Loßwig, Belgern)

Die Übersicht ergibt 30 Paare und 8 zeitweise besetzte Horste.

Von den 30 Paaren hatten 13 keine, 1 x 1, 4 x 2, 6 x 3 und

6 x 4 Junge.

Am 22.7. traf Mar in den Elbwiesen bei Greditz einen Trupp von ca. 50. Am 13.5. überflogen 7 Grimma in Richtung Südost (Ha). Zur Zugzeit gelangen ebenfalls Beobachtungen von größeren Trupps, z.B. 24.-28.8. 14 bei Podelwitz/Colditz (Marschner), 2.9. bei Gostemitz 10-12 (Hu) und 18.9. Dornreichenbach ca. 70 (Frank lt. Hu).

Auffallend sind die zahlreichen Spätbeobachtungen:

9.11. bis 7.12. 1 in der Umgebung des Speicherb. Wind. (G,FB), Nov. bis 9.12. 1 bei Schenkenberg (Geisler lt. Hu), am 19.11. dort 2 um den 15.10. 1 längere Zeit bei Altenbach (Dietze lt. Kop).

Die Notiz über Dezembervorkommen im Jahresbericht für 1966 (Heft 3, S. 19) bitten wir zu streichen.

KMStad: Anonyme Gerüchte über eine Brut im Erzgebirge oder dessen nördlichem Vorland erhalten durch die nachfolgend aufgeführten Beobachtungen eine gewisse Bestätigung:

11.5. Berthelsdorf Krs. Freiberg	1	Lie
20.5. Berthelsdorf Krs. Freiberg	3	Wer
30.5. Venusberg Krs. Zschopau nach Nord	1	Gö
Ende 5. KMStad-Adelsberg	1	Neu
31.5. über Falkenstein nach SE fliegend	1	G.Schö
1.6. Dorfchemnitz Krs. Stollberg	1	Si
2.6. Adorf/Vogtl. auf Schornstein	1	H.Franke
6.6. Schlettau Krs. Annaberg	1	Holu
15.6. südl. Königshain Krs. Rochlitz	5	He.Fri
26.6. Niederbobritzsch Krs. Freiberg	1	Wer
27.6. Schönberg bei Bad Brambach	1	R.Gnielka
6.7. Venusberg Krs. Zschopau nach N flgd.	5	Grä
8.7. Augustusburg Krs. Flöha	3	Grä

Weitere Nachweise namentlich im August:

MO/Dek.	p	n	max.	Bemerkungen
Aug. I	1	1	1	5.8. Unterlauterbach Ern
II	1	1	1	
III	5	34	23	28.8. Limbach J.Frö
Sept. I	1	7	7	8.9. Schlettau C.Feh

38. Löffler - Platalea leucorodia

Leipzig: Am 13./14.6. soll sich lt. Fischmeister Wolf 1 Altvogel an den Eschefelder Teichen aufgehalten haben (s. Eschefelderbericht 1968).

KMStädt: 1968 gelang ein bereits publizierter Nachweis (Vgl. Falke 1969, S. 103):

26.5. Talsperre Pöhl            3 ad.    Wo

40. Höckerschwan - Cagnus olor

Leipzig: Um die weitere Entwicklung des Bestandes dieser Art beurteilen zu können, möchten wir um sämtliche Beobachtungen bitten! (Auch von sicheren Parkschwänen mit entsprechender Bemerkung). Am Schwemnteich Machern hatte ein Paar Gelege (Grö, Tu). Ein weiteres Kohlenbergteich Brandis (Grö, Stro) Zur Brutzeit wurde die Art weiterhin festgestellt:

Eschefelder Teiche: Juni bis Sept. 2-3 ad (Fei, Fö, Gerst u.a.)

Speicherb. Wind: 16.6. 2 Fö

Haselbacher Teiche: 30.6. 5 und 13.7. 1 Fö

Teiche Steinbach: 2.6. 1 Tu

Schloßteich Trossin: 16.6. Tu

Kulkwitz Grube: 1 Paar (Grö)

Göttwitzsee: 18.5. 5 Erd, Ha u.a.

Rohrbacher Teiche: 24.5. - 3.6. 3 Oeh

Großteich Torgau: 1.-21.6. 2-3 ad Leh, Tu.

Außerdem wurden eine Reihe Beobachtungen außerhalb der Brutzeit bekannt:

Grube Großzössen: 14.1. 2 (Fö), Speicherb. Wind.: 3.2. 2 (Fö),

17.2. 1 (Fö), 3.3. 1 (Fö), Elbe km 173-185: 14.1. 1 juv (Tu),

Stolpenteiche: 16.1. 6 (Kop), Falkenhain: 8.3. 1 (Kop),

Elbe bei Düben: bis 11.1. 5 (Frank lt. Hu), Neumühlteich:

20.1. 4, 31.1. 8, 4.2. 3 und 18.2. 2 (Leh), Schildau: 20.1.

20 (lt. Leh), Camitz: 21.1. 6 (Leh), Torgau: 26.1. und 31.1.

4 ad 1 juv (Leh), Proschwitz: 31.1. 2 (Leh) und am Elster-

flutbett 1 am 2.3.-3.3. (JS, J.Fie, Grö) und am 24.3. (JS).

Weitere Notizen liegen vom Herbst und Winter vor:

Speicherb.Wind.: 3.8. 2, 28.9. 1, 20.10. 2, 9.11. 6, 24.11. 4 und 22.12. 3 (F8), Stolpenteiche: 8.12. 2, 10.-12.12. 2 (Kop), Heyda Okt./Nov. 2 (Kop), Kosebruchteiche: 23.8. 5 (Erd) und Mulde bei Bahren 15.12. 2 (Ha, E1).

KMStadt: 1968 lagen über Parkpopulationen folgende Bestandsangaben vor

O r t	Paare	Junge	Beobachter
Bad Brambach	1		R.Gnielka
Bad Elster	1	5 juv	R.Gnielka
Talsperre Pöhl bei Gansgrün	1	2 juv	Cz
ebenda 30.5. 6 Ex.			Ern
KMStadt/Stadt	7	5 juv	Sae
Limbach	4	?	J.Frö,Sae,W.We1
Burgstädt	2	?	W.We1
Oederan Hauboldteich	1	(3.2.-7.4.)	Dr. Hey

In der Regel verbleiben die Alten wintersüber an den Brutgewässern, während die Jungen gewöhnlich im Herbst/Winter für immer abwandern (KMStadt - Sae). Besonders im Januar gelegentlich auf Flüssen: Zschopau zwischen Frankenberg und Dreiwerden 14.-19.1. 5 Ex., 16.1. bei Frankenberg 7, 22.1. bei Sachsenburg 5 (A.Ha).

#### 41.Singschwan - Cygnus cygnus

Leipzig: Vom 21.1. bis 6.2. hielten sich 2 ad auf dem Mühlteich Burkartshain auf (Jo,MU). Ha und Kretzschmar trafen am 21.1. 3 ad auf der Mulde bei Förstgen an. Beide Vorkommen könnten in Zusammenhang stehen.

KMStadt: 18.2.-28.3. Teilüberwinterung von 3 (2 ad, 1 juv) am Großteich Großhartmannsdorf, zwischenzeitlich vom 23.2.-15.3. am Rothbacher Teich Krs. Brand-Erbisdorf (Her, Bähr, Ihle, Kiek, Kut, Schmi, H.Reichelt).

42. Zwergschwan - Cygnus bewickii

Leipzig: Leh beobachtete vom 5.-7.11. 2 ad 2 juv auf dem Großteich Torgau.

43. Saatgans - Anser fabalis

Leipzig: Die Zahlen im Torgauer Gebiet lagen 1968 wieder etwas höher. Leider werden die Gänsegebiete nur noch recht unregelmäßig besucht, deshalb sind Aussagen über den Bestand schwer möglich. Die Ankunft im Herbst erfolgte recht spät!

Mo/Dek.		Großt.Torgau	Krippenhna	Brüche	Witznitz
Jan.	I	1 Leh			
	II				
	III				
Febr.	I	230 Leh	82 J.Fie		
	II	500 Leh			
	III				
März	I		164 F8		
	II	300 Leh			
	III				
Okt.	I	257 F8	375 G		
	II	1984 G			20 F8
	III	1000 Leh		50 JS	108 F8
Nov.	I	2400 F8	350 F8	250 J.Fie, Pa	
	II	3 Tu			
	III	200 Leh	500 Straßb.		1 F8
Dez.	I				
	II				
	III	100 Leh			

Am 14.1. waren im Elbbereich km 173-185 nur 12 (Tu). Überfliegende Trupps wurden in der Umgebung von Falkenhain (Kop u.a.) und im Westteil des Kreises Delitzsch (Kre) notiert; 6.1. Kollau 30; 7.1. Püchau 23, 31, 3; 12.1. Leipzig 22; 4.11. Borsdorf 80; 28.12. Wasewitz 17 (Id).

KMStadt: Wie 1967 war das Auftreten der Art wieder deutlich als "Winterflucht" zu werten. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Beobachtungen verdoppelt:

Mo/Dek.	p'	n	max.	Daten	Richtung	Beobachter
Jan. I	1	30	30	7.	SSW	Vet
	II	2	39	13.	SW	Bähr, Vet
Nov. II	1	5	5	14.	?	J. Frö
	III					
Dez. I						
	II	4	115	11., 18.	S, SSW	Pflug, Timmel, W. Wei
	III	5	260	28., 30., 31.	S, NW	J. Frö, Pflug

#### 45. Bläßgans - Anser albifrons

Leipzig: Die größeren Saatganzzahlen im Torgauer Gebiet brachten gleichzeitig wieder eine ganze Reihe Feststellungen: 5.10. 3 ad Fö, 19.10. 1 ad, 20.10. 10 ad 5 juv G, 2.11. 10 ad 3 juv Fö und 28.11. 1 G. Außerdem wurden Bläßgänse bei Krippenhna, 7.10. 1 ad G; am Grubensee Witznitz: 27.10. 1 ad Fö und am 28.12. an der Mulde bei Canitz 1 ad Fö angetroffen.

Im Frühjahr gelang nur eine Feststellung: 3.2. bei Noitzsch 2 (J. Fie).

KMStadt: Am 7.1. erkannte Wer an der Stimme die Art, als über Freiberg 55 Gänse nach E zogen. Ob alle B. waren, ist unsicher. Vergl. auch Nr. 43, Jan. I.

#### 47. Graugans - Anser anser

KMStadt: 1968 lagen 6 sichere Graugansbeobachtungen vor:

7.3.	Ellefeld	nach N	20 G. Schö
27./28.4.	Großteich Großhartmannsdorf		1 Ihle, Kiek
12.9.	Falkenstein	nach NE	1 G. Schö
5.10.	KMStadt-Nord	nach NE	1 Rin, Sae
20.10.	KMStadt-Draisdorf	nach SW	8 Lom
30.10.	Großteich Großhartmannsdorf		5 Kiek

Weitere Beobachtungen vom 6.10. (1 C. Feh), 19.10. (13 nach SSW Vet) und 26.10. (50 nach S Pflug) sind laut Angabe der Beobachter nicht sicher bestimmt und betreffen möglicherweise Nr. 43.

51. Rothalsgans - Branta ruficollis

Leipzig: Zusammen mit Saatgänsen fiel am 13.10. 1 auf dem Großteich Torgau zur Mittagsruhe ein (Mar, Tu). Wahrscheinlich das gleiche Stück sah Fö am 2.11. an gleicher Stelle. Dies ist der erste Nachweis für das Torgauer Gebiet.

53. Brandgans - Tadorna tadorna

Leipzig: Wieder eine ganze Reihe von Daten, im Gegensatz zu 1967:

27.7. Speicherb.Wind.	1 C.Feh
3./4.8. " "	1 Fö, Ki, Web, Ger
19.9. Elsterflutbett	1 juv Erd
27.9. Elsterflutbett	1 juv Grö
29.9. Elsterflutbett	1 juv G.Grö
1.10. Elsterflutbett	1 juv Erd
6.10. Göttwitzsee	4 Ha,Wo,G.Feh,Kop,Leo, Verständig
20.10.Göttwitzsee	4 C.Feh
23.11.Großteich Torgau	8 (?) Mar

54. Pfeifente - Anas penelope

Leipzig:1968 war die Art recht spärlich vertreten. Im Winter wurden nur 3 Ex. beobachtet:

20.1. Elsterstausee 1 Fö und 18.2. Grubensee Witznitz 1 Fö.

20.1. Elsterflutbecken 1 Grö

Übersicht des Frühjahreszuges:

Mo/Dek.	Sp.Wind.	Groß.T.	Witznitz
März I			
II	11 Fö	2 Tu	
III	3 Wei,G	2 Fö	
April I			3 Fö
II	1 Wei,G,Fö		
III			

Weiterhin meldeten Do vom 24.3. 4 Grube Kulkwitz, G am 31.3. 1 Haselbach und Fö am 11.5. o,l wieder in Haselbach.

Sommerdaten fehlen völlig!

Mo/Dek.	Sp.Wind.	Großt.T.	Elsterst.	Witznitz
Okt. I	2 F8			1 F8
II	2 F8	5 F8	2 Hoy	6 F8
III	3 G		7 F8	5 F8
Nov. I	15 F8	1 F8		
II	3 G			1 F8
III	2 F8			
Dez. I	4 G			

KMStad: Im Frühjahr 1968 gelangen keine Nachweise, im Herbst lediglich an 3 Gewässern (siehe Übersicht) zwischen 28.9. - 14.11.

Mo/Dek.	Großhartm.	Talsp. Pöhl	Schloßteich KMSt.
Sept. III	0,2 Kiek	1,0 Wo	
Okt. I	1,7 Kiek		2,2 Sae
II	0,5 Kiek		
III	0,2 Kiek		
Nov. I	3,6 Kiek		
II	0,3 Kiek		

55. Schnatterente - *Anas strepera*

Leipzig: Auch 1968 gelang wieder kein Brutnachweis, obwohl die Art zur Brutzeit am Pleißestausee (29.6. 2 F8 und 14.7. 1 F8) und an den Eschefelder Teichen (29.6. 3 G, 30.6. 3 F8, 6.7. 3 F8) gesehen wurde.

Zur Frühjahrszugzeit gelangen nur 4 Beobachtungen:

17.3. Speicherb.Wind. 2g, 17.3. Pleißestausee 2 F8, 26.3.

Elsterstausee 1 Grö und 30.3. Elsterstausee 2 Hoy.

Herbstdaten waren dagegen etwas zahlreicher:

Mo/Dek.	Großt.T.	Elsterfl.	Sp.Wind.	Eschef.T.
Juli I	8 Tu			
II	21 Tu		1 F8	
III	1 Tu			
Aug. I				1 F8
II			2 G	4 F8
III				

Sept.	I			
	II	2 Tu		
	III		1 G	2 F8
Okt.	I			3 Stre
	II	6 F8	1 G	
	III		5 G	
Nov.	I	13 F8	4 G	
	II			
	III	1 JS,Gr8		
Dez.	I		3 G	
	II	1 JS,Gr8		
	III	1 Wg,Gr8		

Auffallend sind die hohen Julizahlen vom Großteich Torgau. Ferner am 13.10. Grubensee Witznitz 4 F8 und noch am 14.1. am Elsterflutbecken 1 Gr8.

KMStad: Aus dem Berichtszeitraum lagen 4 Meldungen vor:

6.4. Stausee Glauchau	2,1 Ho,Fri
Hüttent. Berthelsdorf	2 Kiek
9.4. Stausee Glauchau	1,0 Ho,Fri
5.5. ebenda	1,1 Ho,Fri

#### 56. Krickente - *Anas crecca*

Leipzig: 1968 gelang am Speicherbecken Windischleuba ein sicherer Brutnachweis:

29.6. o,1 + 5 pulli G und am 6.7. o,1 + 7 pulli F8.

C.Feh meldet zur Brutzeit ein Paar am GÜttwitzsee. F8 sah am 24.6. 4 bei Audenhain.

Zur Zugzeit zahlreich wie in den Vorjahren. Über das Geschlechterverhältnis liegen folgende Zahlen vor:

Jan.	I	28,25	II	7,8	III	1,0
Febr.	I	19,11	II	95,63		
März	I	44,31	II	28,24	III	72,58
April	I	23,20	II	4,2	III	5,4

Übersicht des Zuges:

Mo/Dek.	Witznitz	Elsterst.	Sp.Wind.	Elsterfl.	Großt.T.	Eschef.T.
Jan.	I				29 JS	
	II	9 F8			3 Gr8	
	III				1 G, Eb, Gr8	
Febr.	I		17 F8		1 Wg	
	II	25 Wei	74 F8		1 Gr8	17 Leh 2 Frie
	III					
März	I		3 G	68 F8	1 Gr8, Wg	
	II	8 F8	2 Hoy	146 G	2 JS	41 Tu
	III		2 F8 u.a.	260 G		90 F8 25 F8
Apr.	I	19 F8	3 F8			2 G
	II			53 G		4 G
	III			37 G		2 G
Mai	I					
	II		1 F8	6 F8		
	III					
Juni	II			14 F8		2 Tu 15 F8, G
	III	1 F8				64 F8
Juli	I					19 F8
	II					
	III	1 F8		2 F8		1 F8
Aug.	I	1 F8			2 Erd	
	II			70 F8		4 F8
	III	1 F8		75 F8	1 Erd	
Sept.	I	12 F8	2 Hoy	1 F8		18 F8
	II		3 Hoy	5 F8	7 Erd	10 Tu
	III	61 F8	8 Wei	126 G		1 G, F8
Okt.	I	12 F8	4 Hoy	300 F8		50 F8
	II	79 F8	9 Hoy	349 F8	4 Tu, Gr8	388 F8
	III	124 F8	69 F8	237 G		300 Frie
Nov.	I		71 F8	881 G	1 Erd	1000 Leh
	II	62 F8	21 Hoy,	55 G	33 Gr8	
	III	85 F8	55 Wei Hoy	196 F8	8 Erd, Gr8	95 Leh
Dez.	I	34 F8	64 Hoy	57 G		170 Leh 2 Frie
	II	17 F8	5 Hoy		2 Erd	
	III		10 Hoy	6 F8	1 Erd	

Bemerkenswert sind die hohen Zahlen im Sommer an den Esche-  
felder Teichen. Im Frühjahr sah Wei ca. 50 am 31.3. auf dem  
Göttwitzsee. In geringerer Zahl in weiteren Teichgebieten  
angetroffen.

KMStadt: Ein Brutnachweis gelang auch 1968 nicht, obwohl  
mehrere Mai- und Juni-Beobachtungen darauf hoffen ließen:  
2., 4. und 9.5. Kläranlage KMStadt je 1 ♂ (Sa), 8.5. Elter-  
leiner Teich 1 ♂ (Di), Ende IV - 1.6. Großteich Großhartm.  
1,1 (Kiek, Lie), 13.5. Teiche Unterlauterbach 1,1 (Ern),  
24.5./25.5. Scheibenberger Teiche je 1 ♂ (Di, C.Feh), 30.5.  
Talsperre Pöhl 3 (Ern), 20.5. und 22.6. Hüttenteich Berthels-  
dorf 1 bzw. 5,2 Ex. (Wer, Lie).

Übersicht des Durchzuges:

ohne vorstehende Beobachtungen (10.3.-15.12.)

Mo/Dek.	Glauchau	Großhartm.	Pöhl	übrige Gewässer		
				p	n	max.
Jan.	I		3,0 Cz			
März	I			1	1,0	1
	II			1	2,0	2
	III	1,0 Ho.Fri	10 Kiek	1	2	2
April	I	1,0 Ho.Fri	2 Kiek, Lie	1	1,0	1
	II	1,0 Ho.Fri	5 Ihle, Lie			
	III		2 Kiek			
Juli	I		4 Kiek			
	II		16 Kiek			
	III			1,4 Cz		
Aug.	I		10 Lie			
	II		30 Wer	2	6	4
	III		50 Kiek	1	4	4
Sept.	I		50 Lie	1	28	28 +)
	II	4 Ho.Fri	60 Lie	1	3	3
	III	1,1 Ho.Fri	75 Kiek	2	14	8
Okt.	I		100 Kiek	2	1,2	0,2
	II		100 Lie			
	III	21 Ho.Fri	4 Kiek	2	3	2

Mo/Dek.		Glauchau	Großhartm.	Pöhl	übrige Gewässer		
					P	n	max.
Nov.	I	18 Ho.Fri	7 Wer		1	0,1	1
	II	30 Ho.Fri	22 Kiek	11,9 Cz	1	3,1	4
	III	35 Ho.Fri	2 Kiek	10,0 Cz	1	2,0	2
Dez.	I	15 Ho.Fri					
	II	3 Ho.Fri		2,0 Cz			

+) Schlammt. Helmsdorf 8.9. (Sieb)

57. Stockente - *Anas platyrhynchos*

Leipzig: Leider kann wiederum nichts über den Brutbestand ausgesagt werden. Zwei Bruten wurden von Baumhöhlen angegeben (8.5. Lützscha 20 m hoch JS und 19.4. 13 m hoch Ratsholz (Erd)).

Anzahl der jungführenden Weibchen:

Ma	I	Juni	I	19	Juli	I	16	Aug.	I	10
	II	4	II	41	II	16				
	III	4	III	13	III	4				

Demnach fiel der Brutbeginn recht spät!

Über die Jungenzahlen liegt folgendes Material vor:

Jungenzahl	pulli	juv	juv unbek. Alters
1		1	
2	2		4
3			6
4	2	3	8
5	8	5	11
6	8	6	5
7	4	3	8
8	2	5	6
9	4	1	4
10		1	
11	1		4
12	2		2
13			
14		1	
Mittel	6,5	6,5	6,0

Übersicht des Durchzuges:

Mo/Dek.	Elsterst.	Pleißest.	Witznitz	Sp.Wind.	Großt.T.	Elsterfl.
Jan.	I	560 Wei				2100 Tu
	II	2000 F8		1500 F8		1800 Grö
	III	500 Hoy				1200 Grö
Febr.	I	1500 Hoy	391 F8	2140 F8	4750 F8	2000 Leh 1452 Erd
	II	2570 F8	106 F8	2800 F8	2900 F8	835 Leh 1016 JS
	III	1035 F8				
März	I	914 F8	58 F8	900 F8	1508 F8,G	1358 Grö
	II	1000 Grö	175 F8		1458 G	450 Tu 824 JS
	III	456 Hoy	26 F8	13 F8		276 JS
April	I	200 Hoy		133 F8		256 Grö
	II	212 F8		24 F8	176 F8	173 Tu
	III					201 JS
Mai	I	47 Hoy				60 Tu 125 Erd
	II	74 F8		104 F8	106 F8	101 Erd
	III					214 Erd
Juni	I	11 Hoy				46 Erd
	II	232 F8		3 F8	315 F8	500 Tu 206 Erd
	III					211 Erd
Juli	I	8 F8				3003 Tu 91 Erd
	II	41 F8	35 F8	53 F8		2628 Tu 42 Grö
	III	129 F8	13 F8	212 F8	150 F8	3759 Tu 442 Erd
Aug.	I	259 F8	5 F8	787 F8		768 Erd
	II	170 F8			8 F8	564 Erd
	III	536 Hoy	4 F8	1450 F8	500 F8	450 Erd
Sept.	I	357 Hoy		1104 F8		112 Erd
	II	585 F8	17 Grö		126 F8	900 Tu 400 Erd
	III	700 Hoy	18 F8	3813 F8		75 Erd
Okt.	I	637 Hoy	79 F8	1900 F8	3200 G	2300 F8 358 Erd
	II	1140 Hoy	5 F8	1900 F8	3300 F8	3100 Tu 528 Erd
	III	2015 F8	132 F8	3242 F8		527 Erd
Nov.	I	2370 Hoy			2012 F8	4400 F8 840 Erd
	II	335 Hoy	357 F8	1520 F8	610 G	2000 Tu 423 Grö
	III	1292 F8	436 G	2285 F8	1396 F8	3200 Leh 551 JS
Dez.	I	576 Hoy	512 G	2680 F8	2105 G	4800 Leh 660 Grö
	II	119 F8		4450 F8		575 Tu 2157 JS
	III	400 Hoy	161 F8	1500 F8	300 F8	55 Leh 2500 Erd

KMStadt: Über Brutbestand, Brutzeit, Anzahl der juv/♀ lagen 1968 keine mitteilenswerten Beobachtungen vor. Aus diesem Grunde soll nur das Zugeschehen an verschiedenen Gewässern des Bezirkes dargestellt werden (siehe Tabelle).

Mo/Dek.	Großhart.	KMStadt	Muldenb.	Pöhl	Pirk
Jan.	I	1650 Sae		4000 Cz	
	II	2150 Sae		700 Cz	
	III	2100 Sae	. . . . .		
Febr.	I	1810 Sae			
	II	1600 Sae		407 Cz	
	III		. . . . .		
März	I	610 Sae			
	II	700 Sae		600 Cz	
	III	120 Sae	. . . . .		
April	I		9 Ern	300 Tho	
	II		14 Ern		
	III	45 Sae	8		
Mai	I		7 Ern	20 Cz	
	II				
	III	125 Sae		80 Ern	
Juni	I		25 Ern		
	II		30 Ern		
	III	190 Sae	26 Ern		
Juli	I				
	II				
	III	285 Sae	27 Ern		
Aug.	I				
	II	440 Sae	150 Ern		
	III		300 Ern		
Sept.	I				
	II	1000 Ihle	500 Sae	320 Ern	
	III	1000 Lie	580 Sae		620 G.Schö
Okt.	I	1500 Lie	560 Sae	40 Ern	
	II	211 Wer	820 Sae	48 Tho	1250 Cz
	III		700 Sae	35 Ern	3000 Ern, Tho
Nov.	I		750 Sae		
	II		1520 Sae	36 Ern	2600 Cz
	III		1100 Sae	14 Ern	3000 Cz
Dez.	II		2610 Sae		400 Cz
	III		2000 Sae		

Leider lagen keine Angaben vom Stausee Glauchau und den Schlammteichen Helmsdorf vor, zwei bedeutenden Stockentenrastplätzen.

58. Spießente - *Anas acuta*

Leipzig: Vom Mai bis Juli wurden außer den in der Tabelle aufgeführten Beobachtungen noch gemeldet: 5.5. Kulkwitz o, 1 F8, 30.6. Eschefeld 1 F8, 14. und 27.7. Pleißestausee 1 G, F8 und 28.7. Haselbach 1 F8.

Übersicht über den Zug:

Mo/Dek.	Sp.Wind.	Eschef.T.	Elsterst.	Groß.T.	Elsterfl.	Witzn.
Jan.	III					1 G, Grö
Febr.	I	2 F8				
	II	6 F8				1 JS, Grö 5 F8
	III					1 Grö
März	I	15 Wei				1 G, Grö 7 Wei
	II	19 G		21 Tu		1 JS, Wg, Grö
	III	9 G	8 G	2 Hoy	39 F8	1 G, Grö
April	I					1 Erd, Wg, Grö
	II	3 Wei, G	1 G			1 Tu, Erd, Grö
	III	2 G				
Juli	III	1 F8				
Aug.	I	1 G				
	II					
	III	2 F8				
Sept.	I		1 F8			1 F8
	II					
	III	2 G				
Okt.	I	2 F8		12 F8		3 F8
	II	6 F8	1 Frie	4 Tu		
	III	13 G	1 Stre	1 F8		1 Tu, Erd, 1 F8 Grö
Nov.	I	9 G		2 Wei, F8	10 F8	1 Erd
	II	1 G				
	III	7 F8		1 F8		1 F8
Dez.	I	8 G			2 Leh	
	II				1 Leh	
	III					

Weitere Beobachtungen aus anderen Gewässergebieten:

Haselbacher Teiche: 3.8. 1 F8,  
 Rohrbacher Teiche: 15.9. 1, 21.9. 1 Oeh  
 Pleißestausee: 3.11. 1 Wei, 24.11. 1 G  
 Wyhra bei Kleinzüssen: 15.12. 0,1 F8  
 Klärbecken Rackwitz: 7.9. 0,1 Grö.

KMStad: 1968 lagen aus dem Bezirk 30 Meldungen vor, im Früh-  
 jahr zwischen 23.3. und 9.4., im Herbst vom 5.8.-8.11.

Übersicht des Durchzuges von 4 Gewässern:

Mo/Dek.	Glauchau	Großhart.T.	SchloSt.KMSt.	Talsp.P8hl
März III		4,5 Kiek		
Apr. I		3,1 Ihle,Kiek Ile		
Aug. I				0,7 Tho
II				
III		2 Kiek		
Sept. I				
II		0,1 Kiek		
III		10 Kiek		
Okt. I			0,2 Sae	
II				
III	1,1 Ho.Fri		0,1 Sae	
Nov. I	1,0 Ho.Fri	1,4 Kiek	0,1 Sae	
II	1,2 Ho.Fri			
III	0,1 Ho.Fri	0,1 Kiek		

Außerdem wurden Spießenten beobachtet: Hüttenteich Berthelsdorf  
 am 31.8. 0,1 und 29.9. 0,2 (Kiek), Teiche Unterlauterbach 5.8.  
 0,2 (Ern).

59. Knäkente - *Anas querquedula*

Leipzig: Öhme meldet einen Nestfund an der Wyhra bei Borna  
 (11 Eier). Weitere sichere Brutbelege gelangen nicht.

Zur Brutzeit wurde die Art angetroffen:

Stolpenteiche: 27.6. 4, 18.7. 5 Kop  
 Kulkwitz Wiesenlache 18.5. 1 (Grö)  
 Schönau Lache: 19.5. 4, 23.6. 1, 6.7. 1,1 (Grö)

Thammenhain: 9.7. 5 Kop  
 Göttwitzsee: 18.5. 4,0 Erd, Ha, 3.6. 3,3 C.Feh, 28.7. 10,15  
 Ha, C./G.Feh  
 Kulkwitz: 5.5. 1,1 Fö  
 Haselbacher Teiche: 16.6. 4 Fö  
 Großteich Burkartshain: 5.5. 1,0 Tu  
 Rohrbacher Teiche: 2.6. 1,0 Tu

Übersicht des Zuges:

Mo/Dek. Elsterst. Sp.Wind. Eschef. Groß.T. Pleißest.Elsterfl.Witzn.

März I

II 1 Wei,Hoy 2 G 2 Tu

III 4 Hoy 7 Fö 2 Grö

April I 2 Hoy 3 G 2 Grö

II 4 Hoy 5 Wei 4 G 2 Erd

III 2 Fö 2 G

Mai I 1 Fö

II 1 Fö 1 Fö

III

Juni I

II 4 Fö 9 G 4 Tu

III 0,1 Grö 17 Fö 5 Fö 8 Fö

Jul I 5 Fö 10 Tu

II 9 Fö 22 Fö 38 Tu 5 Fö

III 6 Fö 340 Fö 18 Fö 5 Tu 43 Fö 3 Grö

Aug. I 1 Fö 244 G 24 Fö 4 Fö 11 Erd 217 Fö

II 1 Fö 580 G,Fö 1 Fö 147 G

III 75 Fö 29 Fö 111 Fö

Sept. I 2 Fö 57 Fö 6 Fö 7 Fö

II 1 Fö 1 Tu 1 Grö

III 1 Fö 1 G 7 Fö

Okt. I 6 Fö 3 Fö 2 Fö 1 Fö

II 2 Fö

III

Nov. I

II

III 2 Fö

Dez. I 1 G

Beobachtungen im November und Dezember sind in unserem Gebiet sehr selten. Folgendes Material liegt über die Geschlechtsverhältnisse vor:

März	I	April	I	8,4	Maí	I	12,2
	II		II	19,14		II	6,0
	III		III	9,4			

KMStadt: Beobachtungen zur Brutzeit lagen von mehreren Orten vor, ein Brutnachweis gelang nicht:

Stausee Glauchau: bis 25.5. 1,1 Ho.Fri, Thieme

Teiche Unterlauterbach: 22.4.-27.5. 1,1, bis 25,6, 0,1 Ern

Hüttenteich Berthelsdorf: 7.6. 3,0 Kiek

Großteich Großhartmannsdorf: bis Mitte Juni 3,1 Di,Holu,Kiek,Ihle

Limbacher Teiche: bis 2.5. 2,1 J.Frö

KMStadt Kläranlage: 3.6. 1,2 Sae, 27.7. 0,2 Sae, 28.7. 1,2 LOM  
1.8. 2,0 Sa

Talsperre Cranzahl: 22.6. 13,0 (Brutmauser) Di, Holu

Nennenswerter Durchzug erfolgte 1968 an 4 Gewässern (siehe Übersicht), zahlreiche Beobachtungen von anderen Gewässern, meist Einzellex. oder kleine Gruppen, bestätigen das entworfenene Bild. Der zusammenhängende Aufenthalt währte vom 23.3. (1,0 Großh. Ihle) bis 29.9. (2,2 Pirk, Tho). 2 Novemberdaten: 11.11. Limbach 1,0 J.Frö, 30.11. Berthelsdorf 9 Lie

Mo/Dek.	Großhartm.T.	St.Glauchau	Unterlauterb.	Limbacher T.
März	III 12 Lie,Wer			1,1 J.Frö
April	I 8,8 Kiek,Lie	2,1 Fri		1,1 J.Frö
	II 5 Ihle	2,1 Fri		
	III 4,3 Kiek	2,1 Fri	1,1 Ern	3,1 J.Frö
Maí	I 1,1 Kiek,Wer	1,1 Fri		2,1 J.Frö
	II 2,0 Ihle	1,1 Thieme	1,1 Ern	
	III 3,1 Di,Holu	1,1 Fri	2 Ern	
Juni	I 3,2 Wer			
	II 3,1 Kiek		0,1 Ern	
	III	22 Fri	0,1 Ern	
Juli	I 3,1 Kiek		25 Hum	
	II 30 Kiek		25 Hum	
	III 50 Kiek		25 Hum	
Aug.	I 50 Kiek			34 J.Frö
	II 50 Kiek	7 Fri		31 J.Frö

Großhartm.T. St.Glauchau Unterlauterb. Limbacher T.

Aug. III	15 Kiek	6 Ern	22 J.Frö
Sept. I			
II	6 Ihle		
III	10 Lie		

60. Löffelente - Anas clypeata

Leipzig: Sommerbeobachtungen waren sehr selten, Hinweise auf etwaige Bruten gab es nicht.

Übersicht:

Mo/Dek. Elsterst. Sp.Wind. Eschef.T. Groß.T. Pleißest. Elsterfl.

März	I					
	II		4 Frie			
	III		7 F8			
April	I	3 Hoy	12 G			
	II		10 G			
	III	2 G	3 Wei			
Mai	I					
	II	2 F8				
	III					
Juni	I					
	II	2 F8	4 G, F8	1 Tu		
	III		5 F8			
Juli	I	1 F8	3 F8			
	II			5 Tu	2 G	
	III	8 F8	10 F8	8 Tu		
Aug.	I	6 G	18 G		1 G	5 Tu
	II	26 G	19 F8			
	III	23 F8			3 F8	
Sept.	I	2 F8	62 F8			
	II	1 Grö	1 F8			
	III	55 G	2 G			
Okt.	I	60 F8		8 F8		
	II	1 Hoy	43 G	6 Frie	21 F8	1 Grö
	III		31 G	17 Stre	2 Mar	1 Tu
Nov.	I		9 G		4 F8	2 Grö
	II		5 G			
	III		2 F8			
Dez.	I		3 G			

Außerdem wurden Löffelenten aus folgenden Gebieten gemeldet:

Schafteich Windischleuba: 17.3. 1,0 G

Haselbacher Teiche: 30.3., 2,1 F8, 31.3. 2,1 G, 3.8. 3 F8,  
31.8. 2 F8, 7.10. 36 F8

Grube Witznitz/ 6.4. 1,1 F8, 27.7. 4 F8, 24.8. 2 F8,

Großössen 7.9. 3 F8, 6.10. 26 F8, 13.10. 2 F8

Rohrbacher Teiche: 21.4. 1,1 Oeh

Teich bei Colditz: 3.9. 6 Geißler

Schönau Lache: 14.5. 0,1 Grö

KMStadt: 1968 wurde Durchzug im wesentlichen nur am Grosteich Großhartmannsdorf bemerkt (siehe Übersicht), daneben vom 27.4.-1.5. Stausee Glauchau 1,1 Ho.Fri und am 11.8. Talsperre Weiderswiese 0,2 Tho.

Übersicht Großhartmannsdorf (7.4.-14.11.):

April	I	4,0 Ihle	Aug.	I	2 Kiek
	II	1,0 Lie		II	
	III	2,2 Kiek		III	0,3 Kiek
Mai	I	1,1 Kiek, Wer	Sept.	I	
	II			II	
	III			III	
Juni	I		Okt.	I	
	II	2,1 Kiek		II	1 Lie
	III			III	0,1 Kiek
Juli	I		Nov.	I	0,2 Lie, Kiek
	II			II	0,1 Kiek
	III	0,1 Kiek		III	

#### 62. Kolbenente - *Netta rufina*

Leipzig: Zur Übersicht im Heft 4 sind noch folgende Nachweise für 1968 nachzutragen:

3.1. - 2.2. Elsterflutbett 1,0 am 16.1. 2,0 (JS, Eb, Erd,  
WG, Tu)

16.6. Eschefelder Teiche 1,0 (G)

21.7. Elsterstausee 1,0 (Wei)

KMStadt: 1968 je 1 ♂ am 6. und 9.4. sowie 20.11. am Grosteich Großhartmannsdorf (Kiek).

63. Tafelente - *Aythya ferina*

Leipzig: 1968 wurden ca. 160 Paare gezählt. Einen besonders hohen Bestand wies Torgau auf.

Übersicht	jugeführende Weibchen	
Großteich Torgau	59	Tu
Kuhteich Torgau	2	Tu
Bennewitzer Teiche	4	Tu
Teiche Kleinbeucha	1	Tu
Kirchteich Grethen	3	Tu
Müncherteich Grethen	2	Tu, F8
Püchau Tierparkteich	1	II
Rohrbacher Teiche	1	Tu
Rückmarsdorf Grube	1	Gr8
Schönau Lache	2	Gr8
Göttwitzsee	10	Ha, C. Feh
Frauwalde	1	Kop
Falkenhain Unterteich	1	Kop
Stolpenteiche	1	Hei
Haseibacher Teiche	45	G, F8
Eschefelder Teiche	16	G, F8
Specherb. Windischleuba	1	F8
Dokorteich Wermsdorf	2	C. Feh

Sicher sind einige Paare übersehen worden bzw. die Brutgewässer wurden nicht aufgesucht. Brutverdacht bestand für den Schilfteich Gotha, Neumühlteich Schildau.

Das erste Weibchen mit pulli wurde am 10.6. bemerkt. Notiert wurden Mitte Juni 6, Ende Juni 42, Anfang Juli 77, Mitte Juli 57, Ende Juli 59, Anfang August 3 und Mitte August 1 Weibchen mit Jungen.

Jungenzahlen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zahl der Weibchen	6	14	24	20	16	14	16	12	7	1	1	2	1	1

135 Weibchen führten 694 Junge, d.h. 5,14 Junge pro Weibchen.

Leider fehlen genügend Angaben für Juni/Juli. Diese Zeit ist besonders wichtig, weil dann der Mauserzug stattfindet. So meldet C.Feh aus Wermsdorf: im Juni noch 200, Juli wenig.

Übersicht:

Mo/Dek.	Elsterst.	PleiBest.	Witznitz	Groß.T.	Elsterfl.	Eschef.T.	Sp.Wind.
Jan. I					8 JS		
II					13 Grö		
III	1 Fö				22 G		
Febr. I					2 Erd		52 G
II	26 Hoy		5 Wei	120 Leh	1 Erd,Grö	37 Frie	182 Fö
III	46 Fö				34 Grö		
März I	58 Fö		1 Fö		37 Grö		380 Wei
II	160 Grö	24 Fö	1 Fö	280 Tu	55 JS		593 G,Fö
III	88 Fö	41 Wei		338 Fö	7 Grö	541 G	380 Wei
April I	17 Fö				15 Erd	299 G	
II	13 Hoy			150 Leh	4 JS	201 G,Fö	56 G
III					4 Erd	231 G	2 G
Mai I	18 Hoy			45 Tu	4 Erd		
II	1 G,Fö				2 Erd	169 Fö	8 G
III					2 Erd		
Juni I					1 Erd,Grö		
II	2 Fö			250 Tu	2 Erd	252 Fö	
III		14 Fö			1 Erd,Grö	288 Fö	
Juli I				391 Tu	1 Erd,Grö	139 Fö	
II		7 G,Fö		278 Tu	2 Grö		
III	4 Hoy			194 Tu	9 Grö	121 Fö	4 Fö
Aug. I	3 Fö	3 Fö			1 Tu,Erd	113 Fö	
II	2 Fö	89 G			2 Erd,Grö	92 Fö	83 Fö
III	30 Hoy		63 Fö		2 Erd		19 Fö
Sept. I	11 Ger	90 Wei	120 Fö		4 JS	334 Fö	6 Fö
II	2 Wei,Fö	113 Grö		136 Tu	16 Erd		181 Fö
III	16 Wei,Fö	275 G	99 Fö		24 Grö	212 G	202 G
Okt. I	14 Hoy	357 Fö	38 Fö	113 Fö	38 Erd		196 G
II	14 Hoy	14 Fö	308 Fö	117 G	54 Erd,Grö	75 Frie	198 G
III	2 Hoy,Fö	191 Fö	1 Fö		59 Grö		55 G
Nov. I	9 Erd	180 Wei		169 Fö	6 Erd		61 G
II		281 Wei,Fö			10 Erd	3 G	47 G
III		316 G		13 Leh	4 JS		37 Fö
Dez. I		196 G	175 Fö		18 Grö		29 G
II					6 Grö		
III					5 Tu,Grö		

KMStad: Selbst vom Großteich Großhartmannsdorf lagen für 1968 keine Brutnachweise vor, sind aber für das Berichtsjahr anzunehmen (siehe Übersicht).

Mo/Dek.	Großhart.	Glauchau	Pöhl	Muldenb.	KMStad	Limbach
März	I				1 Sae	
	II	6 Fri	1 G			
	III	80 Kiek 18 Fri				
Apr.	I	90 Kiek 8 Fri				
	II	30 Wer 4 Fri				
	III	50 Wer, Lie		3 Ern		
Mai	I	25 Kiek				
	II	15 Kiek				
	III	15 Kiek				
Juni	I	20 Lie				
	II					
	III	50 Wer				
Juli	I		4 Wo			
	II	15 Lie				
	III					
Aug.	I					
	II			1 Ern		2 J.Frö
	III	3 Fri				1 J.Frö
Sept.	I					
	II	20 Lie		12 Ern		
	III	80 Lie	1 Wo			7 J.Frö
Okt.	I	120 Kiek 1 Fri			5 Sae	
	II	50 Lie 2 Fri				1 J.Frö
	III	50 Lie				
Nov.	I	2 Wer			2 Sae	
	II	1 Fri			4 Sae	1 Sae
	III		20 Wo		3 Holu	
Dez.	I					
	II		10 Cz			

Ferner wurden größere Ansammlungen notiert: Saydenbach-Talsperre 21.4. 7, 6.10. 28 C.Feh, Talsperre Pirk 13.10. 5,5 Ern, Tho, Talsperre Kriebstein 5.10. 6,1 Vie. Die übrigen Beobachtungen fügen sich in die aufgezeichnete Übersicht. 1968 nur 1 Winterbeobachtung: 2.1. Talsperre Pöhl, 1,1 Ern.

64. Moorente - Aythya rugroca

Leipzig: Wie 1967 gelangen auch 1968 keine Frühjahrsbeobachtungen.

Elsterflutbett: 12.9. 1 Erd, 29.9. 1 Grö, 11.10 - 2.11.

1,0 Tu, Wg, Erd, Grö, 8.11. 2 Erd

Eschefelder Teiche: 21.9. 1 G, 6.10. 2 Stre

Seebischteich: 15.9. 2 Fö

Speicherb. Windischleuba: 22.9. 1 G, 7.10. 1 Fö

KMStadt: 1968 vom Grosteich Großhartmannsdorf 4 Nachweise:

14.6. 1 Kiek 24.7. 1 Ihle

6.7. 1 Kiek 6.10. 1 Kiek

65. Reiherente - Aythya fuligula

Leipzig: 1968 brüteten mindestens 2 Paare in Eschefelder Teichgebiet. Ein Weibchen führte ab 29.6. 8 eigene pulli, und ein Stockentenküken. Von dieser Brut wurden nur 3 juv groß (Fö, G u.a.). Ein weiteres Weibchen hatte auf dem Ziegelteich 6 pulli, die es anscheinend alle großziehen konnte (G, Fö, Frie u.a.).

Übersommernde Stücke wurden wieder in zahlreichen Gebieten notiert:

Rohrbacher Teiche: 19.5. 5,0 Oeh, 2.6. 1,0 Tu

Güttwitzsee: 4.5. 4,1 C.Feh, 10.5. 2,2 C.Feh, 18.5. 2,2

Erd, Ha, Wolf, 1.6. 2,0 C.Feh, 28.7. 1,0

G./C.Feh, Ha

Horstsee: 18.5. 1,1 Erd u.a.

Stolpenteiche: 22.5. 2,1 Kop

Haselbacher Teiche: 13.7. 4,1 Fö, 21.7. 13 Fö

Neumühlteich Schildau: 18.7. 2,0 Tu

Rückmarsdorf - Schönau: 23.6. 1,1; 29.6. 1,0.

Mo/Dek.	Elsterst.	Witznitz	Pleißest.	Sp.Wind.	Großt.T.	Elsterfl.	Eschef.
Jan.	I					1 Erd	
	II		1 Fö			3 JS,Grö	
	III					3 Wg,Grö	
Febr.	I			2 G		2 Erd,Wg	
	II			5 Wei			
	III						
März	I	2 Fö	1 Wei	5 Wei		2 G	5 Frie
	II	12 Fö		1 Fö	28 Fö	1 Tu	
	III	31 Fö,Hoy	1 Wei	18 G	9 Fö	3 Grö	10 Fö
April	I	2 Wei	4 Fö				18 Frie
	II	1 Wei,Hoy		5 G			2 Fö
	III						16 Wei
Mai	I	2 Hoy					
	II	4 Fö		3 Fö			1 Fö
	III						
Juni	I						
	II				6 Tu		11 Fö
	III	2 Fö					11 Fö

Mo/Dek.	Elsterst.	Witznitz	Pleißest.	Sp.Wind.	Groß.T.	Elsterfl.	Eschef.
Juli I					5 Tu		
II							6 F8
III					11 Tu		
Aug. I					11 Tu		4 F8
II				1 G			3 F8
III	2 Hoy		2 F8	1 F8		1 Erd	4 F8
Sept. I	2 F8	5 F8	5 Wei	1 F8			
II			3 Gr8				8 F8
III	3 Wei		12 G	9 G	6 Tu	6 Erd	
Okt. I		51 F8	29 F8	3 G	62 F8	1 Gr8	11 G, F8
II	1 Erd, Hoy	18 F8		4 G, F8	11 G	1 Tu, Erd, Gr8	
III	5 F8	14 F8		1 G		1 Tu, Gr8	1 Frie
Nov. I			5 Wei	42 G	2 F8	3 Gr8	
II			30 F8	13 G		2 Erd	
III			36 G	19 F8			
Dez. I		1 F8	16 G	11 G		1 G, Gr8	
II		1 F8				1 Gr8	
III						3 Wg, Gr8	

KMStadt: für den Großteich Großhartmannsdorf werden 1968 2-3 Paare angegeben (Ihle), andere Beobachter registrierten während der gesamten Brutzeit mind. 6 Ex. (siehe Übersicht). Ein direkter Brutnachweis lag im Berichtsjahr wohl nicht vor.

Übersicht des Durchzuges und Sommeraufenthaltes:

Mo/Dek.	Berthelsd.	Glauchau	Großhart. T.	Pöhl
März	III	3,1 Fri	6,1 Kiek	
Apr.	I		10,10 Kiek	
	II	1,1 Fri	20 Lie	
	III		30 Wer	3,3 Wo
Mai	I	1,1 Lie, Wer	7,7 Lie	
	II	1,1 Lie, Wer	8,8 Wer	
	III	2 Kiek	4,2 Holu	
Juni	I	1,1 Lie	8,8 Lie	
	II			
	III		50 Wer	
Juli	I		18 Kiek	
	II		40 Lie	
	III			
Aug.	I		20 Lie	
	II		1 Lie	
	III			
Sept.	I			1,0 Wo
	II			
	III	17 Kiek	11 Lie	
Okt.	I		6 Fri	5 Lie
	II	2,1 Wer	7,0 Wer	
	III		28 Lie	
Nov.	I	4,1 Fri		
	II	0,1 Fri		
	III			
Dez.	I			
	II			2,0 Cz

Außerdem wurden rastende Reiherenten auf den Talsperren Saydenbach, Cranzahl, Kriebstein, Muldenberg sowie einem kleinen Teich bei Gröna und dem Schloßteich KMStadt (alle je 1 Beob.) beobachtet, maximal 6,5 Ex. am 6.10. auf

der Saydenbach-Talsperre (C.Feh). Die Beobachtungsdaten liegen innerhalb des entworfenen Schemas.

66. Bergente - Aythya marila

Leipzig: Am 11.2. am Elsterstausee 1,0 F8, Hoy, an der gleichen Stelle wieder 1,0 vom 10.3. bis 20.3., anschließend 1,1 bis 7.4. (G,F8,Wei,Hoy,Gr8). Dieses Vorkommen stand möglicherweise mit dem vom Elsterflutbett in Verbindung: 1.1. bis 22.2. meist 1,1, wieder ab 2.-12.3. 0,1 und vom 1.-12.4. 1,1 (Gr8,Erd,JS,G), am 3.1., 7.1. und 3.3. 2,1 (Gr8,Tu).

Im Herbst am 17.10. 0,1 auf dem Elsterflutbett (Erd), am Plei8estausee 3.11. 0,1 (Wei), 1. und 8.12. 0,2 (F8,G) und am Speicherbecken Windischleuba: 7. und 13.10. 3, 20. und 27.10. 1 (F8,G).

KMStad: einzige Beobachtung: Talsperre P8hl 2,0 am 24.11. Cz.

67. Eiderente - Somateria mollissima

KMStad: Von der im Bezirk au8erordentlich selten auftretenden Art wurde am 9.10. am Schlemmteich Johannegeorgenstadt 1 Ex. geschossen, das infolge "Schrote in linkem Brustmuskel" krank erschien, Lang.

71. Eisente - Clangula hyemalis

Leipzig: Der Erpel, der seit Mai 1966 auf dem Elsterflutbett und seiner Umgebung sich aufh8lt, wurde auch 1968 fast immer angetroffen. Nur im Juni und Juli wurde er l8ngere Zeit nicht gesehen.

72. Trauerente - Melanitta nigra

Leipzig: Bemerkenswert sind wieder zwei Fr8hjahrsdaten: 9.3. Mulde bei Gruna 1,0 (F8) und 11.5. Plei8estausee 1,1 (G). Herbst: 16.11. - 8.12. 0,1 Plei8estausee (Wei,F8,G) und 11.11. Elsterflutbett 0,1 (Erd).

KMStadt: Wie 1967 nur 1 Nachweis:

14.1. Dorfcnemnitz Krs. Stollberg 1 ad. ♂ not-  
gelandet S1, M.Windisch. Vogel wurde beringt  
freigelassen und am 19.1. 3 km entfernt  
noch gesehen.

73. Samtente - Melanitta fusca

Leipzig: Nur eine Feststellung: 3./6.1. Elsterflutbett 1  
(G,JS,Tu).

KMStadt: 1968 nur 3 Nachweise!

24.10.	Großhartmannsdorf Bahnhofsteich	1 ♀	Ihle
8.11.	Geyerscher Teich	7	D1
17.11.	Rothbacher Teich Berthelsdorf	1	J.Fischer Wer.

76. Schellente - Bucephala clangula

Leipzig: Es gelangten 1968 nur wenige Ex. zur Beobachtung.

Frühjahr:

Mo/Dek.	Elsterfl.	Großt. T.	Elsterst.	Speicherb.W.
Jan. I	4 G			
II				
III	4 Erd			
Febr. I				
II		8 Leh	1 Hoy	
III			1 F8	
März I	3 G		2 Wei,G	4 Wei
II		7 Tu		1 G
III		10 F8		1 Wei

außerdem Horstsee Wermsdorf: 9.3. 2,0 G.Feh, Grube Witznitz  
17.3. 1,1 F8 und Eschefelder Teiche: je 1,0 am 17.3. Frie,  
18.4. Olz und 0,1 am 24.3. G.

Herbst:

Mo/Dek.	Elsterfl.	Großt.T.	Sp.Wind.	Pleißest.	Eschef.T.
Sept.	I				1 Fö
	II				
	III		1 G		1 Fö
Okt.	I				
	II		2 G		
	III	1 Tu, Erd, Wg, Grö			
Nov.	I	1 Erd, Grö	1 Fö	2 G	6 Stre
	II	1 Erd		3 G	4 Wei, Fö 6 Stre
	III			3 Fö	4 Fö
Dez.	I		2 G		6 G, Fö
	II	1 JS, Grö			
	III	2 Erd, Tu, Grö			

Ferner sahen Kop am 17.11. 0,1 auf dem Dokorteteich Wermsdorf,  
Li am 8.9. 1,0 auf dem Gothaer Teich, Grö 1,0 am 27.11.-7.12.  
auf der Sandgrube Rückmarsdorf.

KMStadt: Auch 1968 blieb der Durchzug überall gering, wie die  
folgende Übersicht verdeutlicht:

Mo/Dek.	Berthelsd.	Großhartm.	Glauchau Geyer.T.	Talsp.Föhl
Febr.	I	1,5 Kiek		
	II	0,1 Kiek		
	III			
März	I			
	II			
	III			
Apr.	I		0,1 Kiek	
	II			
	III			
Mai	I			
	II			
	III			3 Ern
Okt.	III		0,2 Kiek	

Nov. I	1,2 Kiek	9,11 Fri	2 Di, Holu	
II	1,0 Kiek	0,1 Fri	3 Di	2,0 Cz
III		14 Fri		

Außerdem wurden Schellenten beobachtet: 26.2. Zschopaufluß  
b. Zschopau 1,0 Holu, 14.1. Zschopaufluß b. Mittweida 0,1  
Vie, 10.11. Talsperre Kriebstein 7 Schi.

### 77. Zwergsäger - Mergua albellus

Leipzig: Wieder etwas zahlreicher!

Elsterflutbett: 16.-19.1. 1,0 )JS, Eb, Grö), 20.1.-28.1. 1,1  
(Wei, G, Wg, Erd, Grö).

Elsterstausee: 9.3. 3,0 (Wei, G)

Elbe km 173-185: 14.1. 1,8 (Tu)

Pleißestausee: 16.11.-8.12. meist 0,2, nur am 17.11. 0,3  
und am 23.11. 0,1 (Fö, G, Wei)

Speicherb. Wind.: 9.-17.11. 0,1, 24.11. 0,2, 7.12. 0,3 (G, Fö).

KMStadt: 1968 lediglich 2 Nachweise!

27.11. Großteich Großhartmannsdorf 0,1 Kiek

15.12. Talsperre Pöhl 1,4 Cz.

### 78. Mittelsäger - Mergus serrator

Leipzig: 0,1 hielt sich am 14.1. zwischen Gänsesägern auf  
der Elbe kam 173-185 auf (Tu). Frie traf 2,0 am 2.5.  
auf dem Haselbacher Teichen an.

Auf dem Großteich Torgau zählte Leh am 7.11. 0,12 !!

Weiterhin hielt sich 0,1 am 16./17.11. auf dem Pleißestausee  
auf (Wei, Fö) auf.

KMStadt: 1968 vier Nachweise mit wenigstens 13 Ex., alle am  
Großteich Großhartmannsdorf:

8.11. 0,12 Kiek 15./16.11. 0,3 Kiek, Ihle,  
Lie

14.11. 1,6 Kiek 20./21.11. 1,3 Kiek

79. Gänsesäger - Mergus merganser

Leipzig: Am 14.1. wurden auf der Elbe (km 173-185) 17,70 (Tu) und auf der Mulde: Düben-Bilenburg 5,7 (G), Ganitz-Eilenburg 3 (J./M.Fie) und Kössern 4,0 (Erd) gezählt.

Im Frühjahr sonst fast nur auf dem Großteich Torgau:

31.1.	über 60 Mar	18.2.	38 Leh
3.2.	50 Leh	17.3.	3,7 Tu
16.2.	22,46 Leh	23.3.	4,30 Fö
17.2.	8,20 Leh		

Weitere Feststellungen:

14.-16.1.	Elsterflutbett	0,1	Grö,JS
28.1.	Elsterstausee	1,0	Hoy
3.2.	Mulde Zschepplin	1,2	J.Fie
6.4.	Grube Witznitz	0,1	Fö

Vom Rückzug liegen nur 5 Meldungen vor:

16.11.	Fleißestausee	0,1	Wei
17.11.	Fleißestausee	0,1	Fö
	Mulde Höfgen	1,5	Ha
14.12.	Mulde Wasewitz	0,1	Li
15.12.	Grube Witznitz	1,0	Fö
28.12.	Mulde Wasewitz	1,1	Li

KMStad: 1968 wieder 5 Nachweise meist einzelner Ex.

13.4.	Klärteiche Pech- telsgrün	0,1	Krei,Tho
20.10.	Talsperre Muldenberg	1,2	Tho
8.11.	Großh.Großteich	0,1	Kiek
14.-16.11.	ebenda	0,1	Ihle,Kiek,Lie
30.11.	Hüttent. Berthelsdorf	1,0	Kiek,Lie

89. Schreiadler - Aquila pomarina

KMStad: Bereits am 23.3. zog 1 Ex. über Ellefeld  
Krs. Auerbach in nördlicher Richtung G.Schö

91. Mäusebussard - Buteo buteo

KMStadt: Die vorhandenen Brutangaben sind zu lückenhaft, um aussagekräftig zu sein. Einige interessante Durchzugsdaten:

13.10. Pirk	20-25 Ex.	Tho, Ern
18.10. Unterlauterbach	19 Ex.	Ern
10.11. Meinersdorf-Adorf (KMStadt)	32-34 fallen	
zur Nachtruhe ein.		Pflug.

92. Rauhußbussard - Buteo lagopus

Leipzig: Gemeldet wurden 37 Beobachtungen, die sie auf die einzelnen Monate wie folgt verteilen:

Januar	8 Beobachtungen	10 Ex.	September	1 Beobachtung	1 Ex.
Februar	6 Beobachtungen	8 Ex.	Oktober	5 Beobachtungen	9 Ex.
März	13 Beobachtungen	16 Ex.	November	1 Beobachtung	1 Ex.
April	1 Beobachtung	1 Ex.	Dezember	2 Beobachtungen	3 Ex.

KMStadt: Insgesamt fünf Meldungen:

11.3. Claußnitz	W. Wei
19.10. Markersdorf/Chtzl.	W. Wei
20.10. Freiberg/Wasserberg	Lie
29.10. Auerbach	G. Schön
26.11. Oederan	Dr. R. Heyder

94. Sperber - Accipiter nisus

Leipzig: Der geringe Bestand scheint sich zu halten. Folgende Brutzeitnotizen liegen vor:

Gotha-Gostemitz bei Püchau, Tresenwald (L1)	
Dahlen Wiesengrund:	16.6. 1 (Kel)
Forst Nimbschen:	31.6. 1 (K8)
Naunhofer Forst:	30.6. 1 (Stro)
Thümmlitzwald:	1 Paar, Gelege zerstört (Ha, C. Feh)
Kammerforst:	1 Paar mit 3 juv (K1)

Winterbeobachtungen:

Januar	7 Beob.	7 Ex.	September	2 Beob.	2 Ex.
Februar	6 Beob.	7 Ex.	Oktober	10 Beob.	10 Ex.
März	10 Beob.	11 Ex.	November	9 Beob.	9 Ex.
April	5 Beob.	5 Ex.	Dezember	7 Beob.	8 Ex.

KMStadt: Die sehr lückenhaften Brutmeldungen 1968 deuten mehr oder minder starken Rückgang an. Im wesentlichen blieben jedoch die Brutgebiete von 1967 (siehe Aotitis 4) erhalten.

Den Befund von 1967 ergänzende Beobachtungen gingen im Berichtsjahr aus folgenden Kreisen ein:

Kreis	Gebiet	Paare	Beobachter
Brand-Erb.	Deutsheinsiedel	3,6. 1 Ex. (BV)	Gey
Aue	Zschorlau	1 BP	R.Mö
	Lößnitz	1 BP	G.Beyer
Oelsnitz	Umgebung Adorf	BV 1 P	H.Franke

Die 1968 gemeldeten 6 Bruten hatten 1,2,3,3,5 Junge, 1 Brut war gestört. Die Horste standen alle auf Fichte.

BV = Brutverdacht.

95. Habicht - Accipiter gentilis

Leipzig: 1968 25 - 27 Paare gemeldet:

Kreis Torgau:	fehlend ?	
Kreis Oschatz:	Dahlen 1 P. Kel	
	Wermisdorfer Forst	1 P. C.Feh
Kreis Wurzen:	Meltewitz	1 P. gestört Kop
	Frauwalde	1 P. gestört Kop
	Doktorteich	1 P. Kop
	Altenhain	1 P. Blü
	Tresenwald	1 P. Li 2 juv.
Kreis Grimma:	Greohwitz	1 P. Ha, C.Feh
	Otterwisch und Umgebung	3 P. Blü
Kreis Leipzig:	NW - Aue	1 P. Wb, JS, Grö
	Schkeuditz 4.6.	2 juv (Gro)
	Eythra	1 P. Grö
	S - Aue	2 P. Fö, Grö

	Pönitz Wäldchen	18.8.	1 juv (Grö) (Brut ?)
Kreis Geithain:	Walditz		1 P. Frie, Rößner
Kreis Borna:	Pleißestausee/Witznitz		1 P. Fö
Kreis Altenburg:	Pahnaforst		1 P. G, Fö
		27.5.	1 juv (Tre)
	Kammerforst	13.7.	1 juv (Tre)

KMStadt: Situation 1968 ähnlich Nr. 94! 1968 wurden 21 Brut-  
gemeldet. Auch bei dieser Art blieben wohl die 1967er Brut-  
gebiete (siehe Actitis 4) im wesentlichen erhalten. Ergänzende  
Beobachtungen gingen aus folgenden Kreisen ein:

Kreis	Gebiet	Paare	Beobachter
Freiberg	Großschirma	1	Her
Auerbach	Ellefeld	1	Tho
Plauen	Kreisgebiet	5	Schub
Oelsnitz	Adorf	vermutl. 1	H.Franke

Horstbäume: Fichte 11 - Lärche 1

Jungenzahlen:	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	Die übrigen Brut-
	1	4	5	2	waren gestört (3), ein
					Horst enthielt nur

1 taubes Ei (Her), von den restlichen lagen keine genaueren  
Angaben vor.

96. Roter Milan - Milvus milvus

Leipzig: Übersicht des Brutbestandes:

Kreis Torgau:	Belgerner Heide	1 P.	Leh, G. Feh
	Forst Pflückuff	1 P.	Tu, Leh
	Elbaue	1 P.	Leh
Kreis Eilenburg:	Bruchgebiet	1 P.	Tu
Kreis Oschatz:	Wermsdorfer Forst	3 P.	Erd, Wb, G./C. Feh, Kop
	Zeuckritz	1 P. 15.6.	2 juv beringt Lö

	Schmannewitz	1 P. 13.6. 3 juv beringt L8
Kreis Wurzen:	Thammenhain	1 P. Kop
	Meltewitz	1 P. Kop
	Falkenhain	1 P. Kop
	Tresenwald vermutl.	1 P. L1
Krs.Leipzig:	Papier	1 P. JS
	Lützschena	1 P. Wb,Gr8
	südl. Aue	1 P. F8, Gr8
	Störmthal	1 P. Blü
Krs. Grimma	Otterwisch	1 P. Blü
	Lindhardt	1 P. m. 3 juv. Blü
	Ammelshain	1 P. Blü
Krs. Borna:	Bad Lausick	1 P. Blü
Krs.Altenburg:	Pahnaforst	1 P. G,F8,Gr8 15.6. 3 juv beringt Tre

Gemeldet wurden für 1968 nur 21 Paare, trotz der Annahme, daß nicht alle Brutpaare erfaßt wurden, ist mit einer Abnahme des Bestandes zu rechnen.

Kop sah am 9.9. 15-20 bei Zschorna/Krs. Wurzen.

KMStadt: 1968 brachte den ersten Brutnachweis für unseren Bezirk: Krs. Hohenstein-Ernst. Langenberg 1 BP meld.: J.Fr8  
Offensichtlich beziehen sich weitere Brutzeit-Feststellungen auf dieses Vorkommen:

21./22.6. Lobsdorf 1 Ex., 23.6. Niederlungwitz 1 Ex.  
(F.Tröger) 7. und 21.6. KMStadt-West 1 Ex. (J.Fr8)  
Durchzug im Frühjahr vom 7.-21.4. (3 Ex.), im Herbst vom  
28.7.-26.10. (Juli 1, Aug. 1, Sept. 3, Okt. 5 Ex.).

#### 97. Schwarzer Milan - *Milvus migrans*

Leipzig: Ebenfalls nur wenige Brutpaare angegeben:

Kreis Torgau:	Forst Pflückuff	1 P. Tu
Kreis Eilenburg:	Bruchgebiet	1 P. Tu
	Kobershain	1 P. Kop
Kreis Oschatz:	Wermsdorfer Forst	2-3 P. Erd,C.Feh,Kop

Kreis Wurzen:	Thammenhain	1 P. m. 3 juv Kop
	Tresenwald	1 P. Li
Kreis Grimma	Ammelshain	1 P. m. 3 juv Blü
	Otterwisch	1 P. m. 2 juv Blü
Kreis Leipzig:	NW - Aue	3 P. JS, Erd, Wb, Grö
	S - Aue	1-2 P. G, Fö, Blü
Krs. Altenburg	Pahnaforst	1 P. G

Die Übersicht weist nur 13-15 Paare aus, 1966 waren es noch 19, 1967 21 oder 22.

KMStadt: Auch in diesem Jahr bleibt mit insgesamt 8 Ex. die Art ein relativ seltener Durchzügler:

29.4.	Claußnitz	He.Fri
5.5.	Auerbach	Tho
26.5.	Pöhl	Wo
30.5.	Pöhl	Ern
8.6.	Großhartm.T.	Lie
2.9.	Claußnitz	W.Weil
22.9.	Göritzhein (2 Ex)	T.Mü

98. Séeadler - *Haliaeetus albicilla*

Leipzig: Am 13.4. 1 am Großteich Torgau von Höfig lt. Leh, an gleicher Stelle 1 ad vom 29.9. bis 13.10. (Fö, Tu, Mar) und 1 juv am 18.10. (Mar). Ebenfalls ein juv sah K8 am 26.12. im Forst Nimbschen.

KMStadt: Am 23.11. beobachtete J.Frö 1 juv. Ex bei Burkhardtsdorf (KMStadt-Land).

100. Wespenbussard - *Pernis apivorus*

Leipzig: Brutorte 1968:

Kreis Oschatz:	Dornreichenbach	1 P. Kop
Kreis Eilenburg:	Röcknitz	1 P. Kop (27.7. 2 juv. beringt)
Kreis Wurzen:	Kühnitzsch	1 P. Kop (24.7. 1 juv. beringt)
	Thammenhain	1 P. Kop
	Dokorteach	1 P. Kop

Kreis Leipzig:	NW - Aue	2-3 P. Grö, JS, Wb (21.8. 1 juv. beringt Gro)
	Lauer	1 P. Fö
	Oberholz	1 P. Erd, Blü
Kreis Grimma:	Grechwitz	1 P. Ha
	Bahren	1 P. C.Feh
	Otterwisch	1 P. Blü
Kreis Borna:	Rötha	1 P. G, Fö
Kreis Altenburg:	Kammerforst	1 P. G (bei Lucka beringte Tre am 3.8. 1 juv.)
	Deutsches Holz	1 P. Frie

Auch für diese Art werden für 1968 recht wenig Brutpaare angegeben, gemeldet wurden nur 15-16.

KMStadt: Den Brutbestand von 1968 veranschaulicht folgende Tabelle:

Kreis:	Gebiet	Paare	juv	Beobachter
Hainichen	Lauenhain	1	?	Schi
Rochlitz	Rochsburg	1	1	T.MU
Flöha	Schellenberg	1	?	Sae
	Augustusburg/ Mörbitz	1	?	Sae, Stö
KMStadt	Grüna	1	2	J.Frö
	Mohsdorf	1	2	J.Frö
Zschopau	Venusberg BV	1	?	Gö
Glauchau	Niederlungwitz	1	2	Ho.Fri, Wieg
Auerbach	Unterlauterbach l BV	1	?	Ern

Junibeobachtungen außerdem in Großhartmannsdorf (Lie), Burgstädt (Bö) und Helmsdorf (Sieb).

Einzelne Durchzügler wurden von Anfang Aug. - 25.9. registriert.

lol. Rohrweihe - *Circus aeruginosus*

Leipzig: 1968 zeigte sich in einigen Gebieten weiterer Rückgang. Allerdings ist die Übersicht noch nicht ganz vollständig. Bekannt wurden 49 Paare, im Jahr vorher waren es noch 60!

Kreis Torgau:	Neumühlteich	1 P. Kop, Leh, Tu
	Teiche Klitzschen	1 P. Tu
	Großteich Torgau	5 P. Tu
	Bennewitzer Teiche	2 P. Tu, Leh
	Gehegeteich	1 P. Leh
	Großtreben	1 P. Leh
	Elsnigk	1 P. ? Leh
Kreis Eilenburg:	Wildenhainer Bruch	4 P. Tu
	Gallner Teich	1 P. Hey am 30.6. 2 juv. beringt
	Schilfteich Gotha	1 P. Schu am 2.6. 3 juv. beringt
Kreis Oschatz:	Muldenaltwasser Kollau	1 P. Li
	Kobershain	1 P. Kop
	Schöna Mühlteich	1 P. Lö am 15.6. 3 juv. beringt
Kreis Leipzig:	Horstsee	1 P. Erd, Ha
	Papitzer Lachen	2 P. JS, Wb 10.6. 3 juv. beringt Gro
	Priestäblich	1 P. Do Feldbrut! 5.7. 4 juv. beringt
Kreis Wurzen:	Kulkwitz	1 P. Do, Grö
	Hafen Leipzig	1 P. Do, Grö
	Imnitz	1 P. Fö
	Frauwalde	1 P. Kop, 5.7. 5 juv. beringt
Kreis Grimma:	Thammenhain	1 P. Kop 5.-9.7. 4 juv. beringt
	Macherteiche	1 P. Stro
	Alter Muldenarm Dögnitz	1 P. Stro
	Deubener Lachen	1 P. Stro
	Stolpenteiche	2 P. Hei
Kreis Borna:	Göttwitzsee	2 P. Erd, Ha, Wolf, C./G.Feh
	Langenrodaer See	1 P. Erd
	Müncherteich	1 P. Kö, Fö, Tu
Kreis Altenburg:	Rohrbacher Teiche	2 P. Oeh, Tu
	Großzössen	1 P. Fö
Kreis Altenburg:	Haselbacher Teiche	2 P. Ki beringte 3, 5, 1

Kreis Geithain: Eschefelder Teiche 5 P. Ki beringte 3,4,4,3,2 juv.

Die Zahl der von einem Paar großgezogenen Jungvögel betrug:  
2 x 2, 6 x 3, 4 x 4, 1 x 5.

KMStadt: 17 Durchzügler verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Monate:

April	4	Juli	1
Mai	2	Aug.	2
Juni	1	Sept.	5
		Okt.	2

Beobachter: Kiek, Lie, Sae, W.Weil.

Bemerkenswert - aber nicht ungewöhnlich - die Mai- und Junidaten.

#### lo2. Kornweihe - Circus cyaneus

Leipzig: 1968 nur Beobachtungen außerhalb der Brutzeit:

Januar	7 Beob.	8 Ex.	Oktober	5 Beob.	6 Ex.
Februar	keine		November	3 Beob.	3 Ex.
März	1 Beob.	1 Ex.	Dezember	1 Beob.	1 Ex.
April	1 Beob.	1 Ex.			

Für 18 Ex. wurden die Kleider angegeben, 6 wurden als Männchen, 12 als weibchenfarbige Vögel angesprochen.

KMStadt: Von sechs beobachteten Ex. nur eine Winterbeobachtung. Herbstdaten dominieren wie gewöhnlich.

1.1.	Burgstädt	(♀) farb.	Bö
15.4.	Räumtengrün	♂	Hum
13.10.	Meerane	♂	J.Frö
27.10.	Claußnitz	(♀) farb.	He.Fri
3.11.	Claußnitz	(♀) farb.	He.Fri
10.11.	Claußnitz	(♀) farb.	He.Fri, W.Weil

104. Wiesenweihe - Circus pygargus

Leipzig: Am 17.4. sah Fö 1,0 bei Dreiskau und am 11.8. 1 Jungvogel am Speicherb. Windischleuba (zusa. mit G).

106. Fischadler - Pandion haliaetus

Leipzig: Wenn auch für 1968 eine große Zahl von Beobachtungen vorliegen, können diese Feststellungen nicht über einen Rückgang der durchziehenden Stücke hinwegtäuschen.

Mo/Dek.	p	n	Mo/Dek.	p	n
März II	1	2	Juli III	2	4
III	7	15	Aug. I	4	4
April I	2	2	II	2	2
II	9	14	III	5	7
III	2	2	Sept. I	4	4
Mai I	2	2	II	8	10
			III	10	13
			Okt. I	2	2
			II	1	1

Am 1.6. sah Kop 1 Stück bei Falkenhain und am 7.7. G einen an den Haselbacher Teichen.

KMStadt: 18 festgestellte Herbstdurchzügler verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Monate:

August 8, September 8, Oktober 2 (C.Feh 2 Ex. an Saydenbachtalsperre)

107. Baumfalk - Falco subbuteo

Leipzig: Nur noch an wenigen Stellen sicherer Brutvogel:

Kreis Torgau:	Forst Pflückuff	1 P. Tu
Kreis Grimma:	Forst Nimbschen	1 P. Kö
Kreis Altenburg:	Kammerforst	1 P. G
Kreis Leipzig:	Rosenthal	1 P. zog 2 juv auf Grö
	Südfriedhof	1 P. Grö

Zur Brutzeit wurden ferner Baumfalken am Pleißeestausee (F8,G), bei Heyda/Krs. Würzen (Kop), bei Neunitz (C.Feh) und Maßlau (Grö) beobachtet. Der Brutbestand geht weiter rapid zurück.

KMStad: 1968 wurden nur noch 4 sichere Brutpaare gemeldet:

Kreis	Gebiet	Paare	juv.	Beobachter
Flöha	Falkenau	1	?	Schaale
Rochlitz	westl. Claußnitz	1	2	He.Fri
Zwickau	Wilkau-Haßlau	1	3	Wink
Annaberg	Pöhlberg	1	2	Di,Hel,C.Feh
	fragliche Bruten (evtl. schon Durchzug):			
Annaberg	Wiesenbad 24.8.	2 ad,	2 juv	Di,Hol
Klingenthal	Schneckenstein 22.8.		2 Ex.	G.Sch8
Einzelne Herbstdurchzügler im Sept. (4 Ex.) bis 17. Okt. (4 Ex.).				

108. Wanderfalk - Falco peregrinus

Leipzig: Folgende Beobachtungen wurden auf diese Art bezogen:

16.2.	Königsfeld/Rochlitz	1 Alletter
28.7.	Dahlen	1 Kel
22. und 25.8.	Eschfelder Teiche	1 Frie, Ki
12.10.	Zweinigiger Grund/Döbeln	1 Frost

KMStad: Drei Beobachtungen gelangen von diesem immer seltener werdenden Falken:

5.8.	Burkhardttsdorf (1 Ex. nach S)	J.Fr8/W.Meiner
13.10.	Burkhardttsdorf (1 Ex. nach S)	J.Fr8/G.Vetters
6./7.12.	Johanngeorgenstadt (1,0)	M.Lang

111. Merlin - Falco columbarius

Leipzig: 1968 nur 7 Beobachtungen:

Frühjahr:	2.3.	Grube Witznitz	1 F8
	16.3.	Dahlen	1,0 Kel
Herbst:	13.10.	Speicherb. Wind.	0,1 G
	21.10.	Körlitz	1,0 Kop
	28.10.	Mutzschlehna	1 Gr8
	2.11.	Mutzschlehna	1 Gr8
	3.11.	Steubeln	0,1 bzw. 2 G,F8.

KMStadt: Sechs Beobachtungen, davon ein Winterdatum:

2.1. Talsperre Pöhl	Ern
9.3. Niederlungwitz	F. Tröger
10.3. KMStadt-Rabenstein	J.Frö
24.9. Grünaer Wald/KMStadt	J.Frö
6.10. Claußnitz (†)	W.Weil
7.10. Markersdorf/Chtztl.	W.Weil

112. Rotfußfalke - Falco vespertinus

KMStadt: Ein außergewöhnlich frühes Frühjahrsdatum:

31.3. 1 ad. ♂ Limbach/V. (K.Schicker)

Der etwas rotfußfalkenreichere Herbst 1968 brachte folgende Beobachtungen:

23.8. Claußnitz 1 juv. H.End/W.Weil.

Diesen Vogel sah He.Fri noch am 24.8.

26.9. Claußnitz 1 ad. ♂, 2 juv. (möglicherweise ein weiteres Ex.?) W.Weil.

114. Turmfalk - Falco tinnunculus

Leipzig: Hu beringte im Kreis Leipzig 55 Jungvögel, davon in der Kolonie am Gasbehälter Leipzig-Süd 5,4,4,5,4,4,6,6 juv. Wir bitten nochmals um Meldung aller Brutvorkommen, besonders aus dem Stadtgebiet von Leipzig. Ferner um Angaben über Vorkommen in den Wintermonaten (Januar-Februar). Nach unseren eigenen Feststellungen zieht ein wesentlicher Teil unserer Brutfalken weg.

123. Wachtel - Coturnix coturnix

Leipzig: An 8 Stellen wurden 1968 Wachteln verhört:

Bröhßen (6.6. Ha), Wöllnau (23.6. G), Falkenhain 2-3 Rufer (Kop), Schildau (27.6. Kop), Großteich Torgau (9./10.7. Tu), Gostemitz 2 P. (Hu), Wolteritz (21.7. Grö) und Rohrbach (19.5. Oeh).

Am 28.6. konnte Schu 1 Ex. bei Hainichen/Bilenburg fangen.

KMStadt: Von gemeldeten 18 Rufern fallen ein recht frühes Datum (29.4. Claußnitz, W.Weil) und auch Junidaten aus dem Kammgebiet des Gebirges (C.Feh,Di) besonders auf. GÜ fing noch ein Ex. am 24.11. bei Klaffenbach!

125. Kranich - Grus grus

Leipzig: In den Brutgebieten wurden wieder 3 Paare angetroffen (Be, Straßburg).

Aus dem Herbststrastgebiet in der Dübener Heide liegen folgende Daten vor:

24.8.	2	G	23. 10. 45	Straßburg
21.9.	18	Weil	26.10. 163	Kop
29.9.	23	Be	31.10. 55	Wb
18.10.	117	Wb	3.11. 100	J.Fie
19.10.	21	Weil	10.11. 100	Ger, J.Fie, Pa
22.10.	62	JS		

Eine erfreulich große Zahl weiterer Herbstzugdaten liegen auch aus anderen Gebieten vor:

27.9.	Leipzig	Rufe	Buschan
14.10.	Frauwalde	32	Kop
16.10.	Holzhausen	34	Wb
17.10.	Mookritz	4	Hu
19.10.	Krippenhna	137	G
19.10.	Klärbecken Rackwitz	122	Grö
20.10.	Sohmannewitz	46	Kop
	Döben	37	C.Feh, Ha
	Torgau	140	Leh
21.10.	Leipzig	50	FÜ
24.10.	Rohrbach	12	Oeh
28.10.	Leipzig	55	Kre
3.11.	Noitzsch	2	FÜ, G
14.11.	Connewitzer Holz	14-15	Weil

KMStadt: Wie im Vorjahr nur eine Beobachtung: J.Frö, Pflug und Kraj sahen am 20.10. 14 Ex. E - W ziehend bei Burkhardtstort/Meinersdorf.

127. Wasserralle - Rallus aquaticus

Leipzig: Das Vorkommen ist sehr sehr lückenhaft bekannt. 1968 wurde die Art zur Brutzeit für folgende Gebiete notiert: Wildenhainer Bruch (Tu), Eschefelder Teiche (Fö), Prödeler Lachen (Fö), Göttwitzsee (Erd) und Rohrbacher Teiche (Oeh), Windisch-Leuba (Grö), Schkeuditz (Gro).

KMStadt: 6.5. Großhartmannsdorfer Großteich 1 Ex. Lie  
15.9. Annaberg/Humpeltal 1 Ex. Schie  
30.12. (- 11.1.1969) 1 Ex. in einem Abwassergraben  
in Treuen/V. Wo

128. Tüpfelsumpfhuhn - Porzana porzana

Leipzig: 1968 wurden nur 6 Beobachtungen bekannt.

12.4.	Elsterstausee	Rufe	Fö
15.4.	Prödeler Lachen	1	Fö
23.6.	Papitzer Lachen	1 Totfund	JS
18.8.	Eschefelder Teiche	1	Fö
31.8.	Schkeuditz	1	Gro
3.10.	Rückmarsdorf	1	Grö

KMStadt: Am 30.8. 1 Ex. am Großteich Limbach-O. J.Frö

131. Wachtelkönig - Crex crex

Leipzig: Nur an 3 Stellen rufende Vögel:

Elsterstausee (8.5. 1 und 15.5. 2 Fö), Lauer (15.5. 1 Fö), Döblitz (8.6. 1 Erd). Do sah 1 Ex. noch am 8.9. im Hafen bei Leipzig.

KMStadt: Von über 20 gemeldeten Rufern (bes. aus den Kreisen Brand-E, Marienberg, Annaberg, Stollberg) fällt eine große Dichte im oberen Flöhagebiet (einschl. Nebentäler) auf, wo allein 8-10 Rufer verhört werden konnten. Aus den nördlichen

Kreisen des Bezirks wurde nicht eine einzige Feststellung mitgeteilt!

133. Teichhuhn - Gallinula chloropus

Leipzig: Überwinterter wie in jedem Jahr in ziemlicher Anzahl, z.B. Hafen Leipzig bis 7 (Do), Elster bei Wahren bis 7 (Wb), Elster bei Lützschena 9 (JS) und Rosental Leipzig 15 (Grö).

Übersicht der bekannten Brutgebiete:

Kreis	Brutplätze	Paare	Gebiete
Torgau	6	7	Bennewitzer Teiche, 2 (Tu), Großteich Torgau 1 (Tu), Benkenteich 1 (Loh), Schloßteich Trossin 1 (Tu), Bleckmühlteich 1 (Tu), Furtmühlenteich 1 (Tu)
Eilenburg	2	2	Zadlitzbruch 1 (Tu), Wölpern 1 (Wg)
Delitzsch	3	7	Kosebruchteich 4 (Erd), Sandgrube Gerbisdorf W 2 (Grö), Klärbecken Rackwitz 1 (Grö),
Wurzen	11	20	Küchenteich Falkenhain 1 (Kop), Röcknitz Kuhteich 1 (Kop), Straßenteich Falkenhain 1 (Kop), Thammenhain 2 (Kop), Kühren Streckteich 1 (Kop), Burkartshain 3-4 (Kop), Schwemnteich Mochern 1 (Tu), Ententeich Bennewitz 1 (Stro), Stolpenteiche 3 (Hei, Kop), Ölschütz 4 (Hel), Kohlenbergteich/Brandis 1 (Grö)
Oschatz	3	3	Grasteich 1 (Kel), Malsenteich 1 (Lß/Kel), Mühlteich Dahlen 1 (Lß/Kel)
Grimma	6	8	Golzern/Bröhren 1 (Ha), NE Grechwitz 1 (Ha), Naundorf 1 (Wolf), Müncherteich 1 (Tu), Mühlteich Pomßen 1 (Tu), Rohrbach 3 (Oeh, Tu)
Borna	4	8	Kleinbeucha 1 (Tu), Steinbach 2 (Tu), Groitzsch 4 (Krug), Rötha 1 (Grö)

Geithain	1	6	Eschefeld (Fö, Fei, G u.a.)
Leipzig	19	38	Anpflanzungen Markkranstädt 2 (Do), Domholz 3 (Wb), Papitzer Lachen 3 (Gro, JS), Rosentalteich 2 (JS, Erd), Elsterflutbecken 3 (Grö), Böhlitz-Ehrenberg 5 (JS, Grö), Park Lützschena 1 (JS), Lachen Altscherbitz 1 (Grö), Teich Auenhain 1 (Erd), Teich Gülden- gossa 4 (Erd), Vorwerksteich Störnthäl 1 (Erd), Tongrube Holzhausen 1 (Erd), Schachteich Döhlitz 1 (Erd), Zetkin-Park 1 (Erd), Leutzscher Holz 2 (Wg), Krankenhaus St. Georg 1 (J. Fie), Entenlache Eythra 1 (Grö), Plaußig Teich 1 (Grö), Rückmars- dorf Grube 4 (Grö)
Altenburg	2	7	Haselbacher Teiche 7 (Grö), Windisch-Leuba "mehrere".

Diese Übersicht dürfte kaum die Hälfte des tatsächlichen Brutbestandes ausweisen. Es ist kaum möglich, den gesamten Bestand der sehr anspruchslosen Art zu erfassen.

#### 134. Bleßhuhn - Fulica atra

Leipzig: Auf eine Übersicht des Brutbestandes haben wir verzichtet. Ein Vergleich der uns vorliegenden Angaben für 1968 mit der Übersicht die Erdmann für 1970 zusammenstellte zeigt, daß 1968 nur etwa die Hälfte des Brutbestandes erfaßt wurde. Von den bei Erdmann nicht aufgeführten Gebieten waren 1968 besetzt:

Kreis Grimma	Schösserteich Roda 1 Paar	(Erd)
Kreis Leipzig	Böhlitz-Ehrenberg 1 Paar	(JS, Grö)
Kreis Torgau	Kuhteich 4, Gehegeteich 7 (Tu)	(für den Großteich nennt Tu 451).

Selbstverständlich sind die Bestandszahlen für viele Gebiete nicht übereinstimmend (z.B. Kulkwitz Wiesenlachen 1968 7 Paare (Grö), weil aber für viele Gebiete die Angaben fehlen läßt sich weder etwas über Umsiedlung noch über den Gesamtbestand aussagen.

Von 46 Paaren werden die Pulli-Zahlen angegeben: 4 x 1, 10 x 2, 8 x 3, 12 x 4, 3 x 5, 7 x 6, 1 x 7 und 1 x 8. 3,6 Überwinternde Stück wurden besonders auf dem Elsterflutbett angetroffen (s. Tabelle). Dieses Gebiet gewinnt von Jahr zu Jahr eine größere Bedeutung als Winterplatz. In geringerer Zahl Überwinternd auf der Elbe und Mulde.

Übersicht über den Durchzug: (Auswahl)

Mo/Dek.	Elsterfl.	Sp.Wind.	PleiBest.	GroßSt.T.	Witznitz	Elsterst.	Eschef.T.
Jan. I	241 Gr8						
II	493 Gr8		14 F8			1 F8	
III	306 Gr8					5 Hoy	
						3 Hoy, F8	
Febr. I		25 F8	17 F8				
II	263 Gr8	34 G, F8	30 F8			2 Hoy	
III	176 Gr8					11 Hoy	
						9 Hoy, F8	
März I	177 JS	82 F8, G	17 F8			14 F8	
II	151 JS	47 G	16 F8	35 Tu		15 F8	
III	39 JS	10 G	5 F8	55 F8	11 F8	4 Hoy	204 G
Apr. I	8 Erd						
II	2 Tu, Erd	40 G					151 G
III	2 JS, Erd	80 G			4 F8	1 Hoy	212 F8
							83 G
Mai I	1 Erd, Gr8			42 Tu		1 Hoy, F8	
II	2 Gr8	68 F8				1 G	102 F8
III	2 Gr8						150 G
Juni I	2 Erd						
II	2 Gr8						
III	1 Gr8	3 Gr8		250 Tu			321 F8
							592 F8
Juli I	2 Gr8			696 Tu			
II	1 JS, Gr8	3 F8	5 F8	1157 Tu			616 F8
III	4 Erd	55 F8	22 F8	1345 Tu		1 Hoy, F8	
						10 Hoy	805 F8
Aug. I	4 Erd	571 G	107 F8			6 Hoy	954 F8
II	2 Erd	372 G	157 G			22 Hoy	803 F8
III	2 Erd	443 F8	152 F8				
						55 Hoy	

Mo/Dek.		Elsterfl.	Sp.Wind.	Pleißest.	GroßT.	Witznitz	Elsterst.	Eschef.T.
Sept.	I	2 JS, Erd	296 F8	306 F8		21 F8	103 Hoy	1562 F8
	II	4 Erd, Gr8	262 F8		950 Tu		59 Gr8	
	III	11 Gr8	678 G	851 G			16 F8	1260 G
Okt.	I	25 Gr8	475 G	900 F8	225 F8	265 F8	107 Hoy	
	II	78 Gr8	418 G	512 F8	54 Tu	15 F8	70 F8	
	III	107 Erd	175 G	351 F8	8 F8	59 F8	70 Hoy	50 Frie
Nov.	I	122 Gr8	120 G		30 Leh			
	II	161 Gr8	195 G	557 F8		33 F8		96 G
	III	200 Gr8	76 F8	549 G		5 F8		
Dez.	I	215 Gr8	216 G	470 G				
	II	308 JS	1 G	91 F8		63 F8	3 Hoy	
	III	372 Gr8	1 F8	8 F8				

KMStadt: 1968 wurden folgende Bestandzahlen gemeldet:

Kreis	Gebiet	Paare	Beobachter
Brand.-Erb.	Großteich Großhartmannsdorf	ca. 10	Ihle, Wer
Freiberg	Hüttenteich Berthelsdorf	1	Wer
KMSt.-Land	Limbacher Teichgebiet	10-13	Sae
	Schafteich Limbach	5	Sae
	Teiche bei Hartmannsdorf	2	Sae
Rochlitz	Höllteich Chursdorf	2	W. Wei
	Teiche Königsfeld	1	Hol
Zschopau	Großteich Drebach	1	G8, Schef
Auerbach	Teiche Unterlauterbach	8	Ern, Krei
Glauchau	Stausee	6	Olz, Ho, Fri
Plauen	Vorsperre Thoßfeld (P8hl)	1	Ern, Tho, Wo
Reichenbach	Waschteich Reuth	2	Cz

Weitere Brutzeitbeobachtungen lagen vor: Schloßteich KMStad (1 Ex. Übersommernd - Sae), Kläranlage KMStad (Lom, Sa, Sae), Schlettauer Teiche (Di), Vorsperre Talsperre Poppengrün (Ern), Klärteiche Pechtelsgrün (Ern). In Unterlauterbach wurden 1 x 4, 2 x 5, 1 x 6 und 3 x 7 Eier notiert (Ern)!

Wie alljährlich verlief der Durchzug im Bezirk wenig eindrucksvoll. Die folgende Tabelle zeigt, daß die Zahl der gleichzeitig im Gebiet rastenden Bl. looo kaum übersteigt. Außer den in der Tabelle enthaltenen Daten gab es größere Ansammlungen nur an der Talsperre Pirk, wo am 13.10. 380 Ex. notiert wurden (Ern, Tho). Wintersüber an den größeren Flüssen nur vereinzelte Ex.

Mo/Dek.	Großhartm.	Limbach	Schloß.KMStad	Talsp.Pöhl
Jan. I			16 Sae	140 Cz, Ern
II			16 Sae	
III			19 Sae	
Febr. I			23 Sae	
II			24 Sae	1 Cz
III			24 Sae	
März I			20 Sae	
II			19 Sae	
III			3 Sae	
Sept. I				
II			1 Sae	10 Wo
III	250 Lie	125 Sae	1 Sae	60 Wo
Okt. I	400 Lie		7 Sae	
II	200 Wer	54 Sae	3 Sae	
III			4 Sae	400 Ern, Tho
Nov. I			10 Sae	300 Wo
II		33 Sae	13 Sae	250 Cz
III			15 Hol	750 Cz
Dez. I			10 Sae	200 Ern, Tho
II			13 Sae	780 Cz
III			17 Sae	

135. Großtrappe - Otis tarda

Leipzig: Es liegen nur wenige Meldungen vor. Es ist sehr bedauerlich, daß wir über den Bestand dieser vom Aussterben bedrohten Art nur sehr dürftig unterrichtet sind!

Gebiet Wolteritz:	13.4.	1,0 F8
Gebiet Llemehna:	13.4.	6,6 F8
Gebiet Krensitz:	13.4.	1,3 F8
Gebiet Krostitz- Mocherwitz:	27.4.	0,1 Wei
Gebiet Krippenhna:	3.2.	2 J.Fie, 3.11. 12 F8,G.

138. Austernfischer - Haematopus ostralegus

Leipzig: Erd 1 Ex. am 18.4. am Elsterflutbett.

140. Kiebitz - Vanellus - vanellus

Leipzig: Die Bestandsangaben für 1968:

Kreis	Gebiete	Paare	Brutplätze
Torgau	3	22	Melpitzer Wiesen 15 (F8), Gehegeteich 3 (Tu), Neumühlteich 4 (Tu,Leh)
Eilenburg	2	2	Zadlitzbruch 1 (Tu), Wildenhainer Bruch 1 (Tu)
Wurzen	4	14	Falkenhain 9 (Kop), Müglenz 1 (Kop), Mühl- teich Mühlbach 1 (Tu), Macherteiche 3 (Stro), Döbritz 4 (Grö), Tresen SO 1 (Grö)
Oschatz	1	2	Horstsee (C.Feh)
Grimma	3	17-19	Göttwitzsee 10-12 (C.Feh, Wei), Müncherteich 1 (Erd), Rohrbach 6 (Tu,Oeh)
Borna	4	4	südl. Borna 1 (F8), Dreiskau 1 (F8), Olschau 1 (F8), Rötha 1 (F8)
Geithain	1	3	Eschefeld 3 (Wei,F8 u.a.)
Altenburg	2	8	Sp.Wind. 6 (G,F8), Häselbach 1 (F8), Monstaber Teich 1 (Karg)

Leipzig 17 ca 45-50 Kulkwitz 9 (Wei, Fö; Grö traf im Mai am Dorf Kulkwitz nur 2 Paare, 1 Gelege gemessen; in der Grube ebenfalls nur 2 Paare), Elsterstausee 0 2 (Fö, Hoy, Grö), Prödel 1 (Fö), Lindenthal 8 (Brut ?) (Wb), Papitz 4 (Wb), Dölitz 15 (Erd), Dösen 2 (Erd), Wachau 1 (Erd), Kleinpösa 1 (Erd), Kolberg 1 (Erd), Zweenfurt 3-4 (Stro), Klärbecken Leipzig 1 (Hey, Grö), Rückmarsdorf-Schönau 5 (Grö), Knautnaundorf 1 (Grö), Maslau 3 (Grö).

Zweifellos wurde nur ein Teil des tatsächlichen Brutbestandes erfaßt, die sehr dürftigen Angaben für den Kreis Delitzsch sind nicht mit aufgeführt, um das Bild nicht zu sehr zu verfälschen. Andererseits ist Vorsicht geboten, eine Sichtbeobachtung reicht nicht aus, um als Brutnachweis gewertet zu werden. Sicher sind nur Gelegefunde, verwertbar sonst nur Maibeobachtungen!

Durchzug:

Mo/Dek.	Sp.	Wind.	Kläranl.	N.	Elsterst.	Groß.	T.	sämtl. Beobachtungen		
								p	n	max
Februar	I							1	50	50
März	I	3	Fö, G		51	Wei, Fö		8	295	90
	II	150	Fö		16	Hoy	2 Tu	9	844	500
	III	81	G	2 Grö	24	Wei	37 Fö	7	212	81
Apr.	I									
	II				5	Hoy				
	III	15	Fö					2	45	30
Mai	I									
	II	9	G	21 Wb				3	47	21
	III							2	74	72
Juni	I							2	42	35
	II	103	Fö					2	124	103
	III			150 Wb				7	368	150
Juli	I			95 Grö	4	Fö		4	139	95
	II	140	Fö	100 Grö				4	376	140
	III	25	Fö	167 Erd	100	Hoy		11	1101	380

Mo/Dek.	Sp.Wind.	KlÄranl.N.	Elsterst.	Großt.T.	sämtl. Beobacht.		
					p	n	max
Aug. I		389 Grö			7	871	389
II	1 Fö	15 Grö			5	40	15
III	279 Fö	183 Grö	9 Hoy		6	551	279
Sept. I	130 Wei	664 Grö	70 Hoy		6	987	664
II	2 Fö	70 Wb			6	141	70
III	48 G	160 Grö			6	544	150
Okt. I	63 Fö	685 Grö	61 Hoy	36 Fö	13	1566	685
II	134 G	800 Grö	162 Hoy	110 Tu	12	2347	800
III	46 G	480 Grö	122 JS		11	1268	480
Nov. I	45 G	5 Grö	70 Hoy	1000 Leh	7	1343	1000
II							
III				170 Leh	3	176	170
Dez. I				35 Leh	1	35	35

KMStadt: Der Brutbestand verteilte sich 1968 wie folgt:

Kreis	Gebiet	Paare	Beobachter
Brand-Erbisd.	Neuhausen (700 m NN)	BV 1	Gey
	Groß. Großhartm.	BV 1	Ihle, Lie, Wer
Freiberg	Berthelsdorf	3-4	Kut, Lie, Wer
	Weißborn ("Rosine")	2	Wer
	Kleinwaltersdorf	BV 1	Bähr
Marienbergl	Satzung (800 m NN)	1-2	C. Feh, Sae, Nest
Flöha	Breitenau/Gahlenz	mind. 3	Dr. Hey
Hainichen	Schönborn-Dreiwerden	3-5	A. Ha
Annaberg	Scheibenerberger Teiche 11.5.	4 Ex.	später keine C. Feh
Zschopau	Drebach (420 m NN)	1	Mel
	nördl. Venusberg/Gelenau	2	Gö
	Obergelenau/Thum	3	Gö
	südl. Venusberg	2-3	Gö
KMStadt-Land	Wittgensdorf	11	Sa
	Limbacher Teichgeb.	5-7	Sae, J. Frö
	Auerswäld	2	Sa
	Mittelbach	3	J. Frö
KMStadt-Stadt	KlÄranlage	10-11	Lom, Sa, Sae
	Rabenstein	2-3	Sae
	Adelsberg	BV 1	Rin
Glauchau	Schlunzig	4-5	Ho. Fri
Auerbach	Reumtengrün	7	Hum, G. Schö

Oelsnitz	Schönberger Teiche	2-3	Gon
Plauen	Helmsgrün (Talsperre Pöhl)	10-15	? FG Auerbach
	Plauen-Neundorf	3	Schub
Reichenbach	Waschteich Reuth	1	Cz

Das ergibt 80-100 Paare im Jahre 1968, aus 6 Kreisen lagen keine Meldungen vor.

Den Durchzug für das Berichtsgebiet veranschaulicht die Tabelle.

Begrenzende Daten: Frühjahr: 12.3.-27.4.,

Herbst: 31.5.-11.11.

(inbegriffen sommerl. Zwischenzug)

Mo/Dek.	p	n	max.	Mo/Dek.	p	n	max.
März	I						
	II	15	162				
	III	7	240				
April	I	2	31	30	Aug.	I	2 112 75
	II	1	2	2		II	1 14 14
	III	1	1	1		III	2 51 50
May	I				Sept.	I	4 187 110
	II					II	1 1 1
	III	2	7	6		III	2 400 300
Juni	I	3	10	8	Okt.	I	3 74 60
	II					II	1 41 41
	III	4	67	28		III	1 40 40
Juli	I	4	87	60	Nov.	I	
	II	2	34	29		II	1 28 28
	III	3	8	6			

141. Sandregenpfeifer - Charadrius hiaticula

Leipzig: Aus dem Frühjahr nur 3 Daten:

26.3.	Speicherb.Wind.	1	Wei
12.5.	Speicherb.Wind.	8	G
13.6.	Speicherb.Wind.	4	Frie

Auch der Herbstzug war wenig auffällig:

Mo/Dek.	Kläranl. N.	Speicherb.Wind.	Groß.T.	p	n	max.
Juli	III		1 F8	1	1	1
Aug.	I			1	1	1
	II					
	III	2 Gr8		1	2	2
Sept.	I	1 Gr8		1	1	1
	II	5 Gr8		1	17	10
	III	1 Gr8	4 F8	4	10	4
Okt.	I	2 Wb, Gr8	6 F8, G	6	32	9
	II	1 Gr8	5 G	3	12	5
	III					

KMStadt: Wie im Vorjahr nur Herbstzügler, allerdings von verschiedenen Rastplätzen

16.8.	Muldenberg	1 Ex. Ern
29.8.	Lengenfeld/Reichenbach	2 Ex. Ern.The
31.8.	Großhartmannsdorf	1 Ex. Kiek
14.9.	Großhartmannsdorf	1 Ex. Ihle
16.9.	Großhartmannsdorf	1 Ex. Kiek
28.9.	Großhartmannsdorf	1 Ex. Ihle
6.10.	Großhartmannsdorf	4 Ex. Kiek
9.10.	Limbacher Teiche	5 Ex. J.Fr8
11.10.	Limbacher Teiche	2 Ex. J.Fr8

#### 142. Flußregenpfeifer - Charadrius dubius

Leipzig: Zur Brutzeit angetroffen in folgenden Gebieten:

Kreis Torgau:	Gehegeteich Torgau	1 P. Tu
	Neumühlteich	1 P. Tu, Leh
	Kuhteich Torgau	1 P. Leh
Kreis Wurzen:	Holzberg Collmen-Böhlitz	1 P. Joiko
	Tresen NO Teich	1 P. Gr8
Kreis Grimma:	Göttwitzsee	1 P. Erd
Kreis Borna:	nördl. Rötha	1 P. F8
	Grube Witznitz	2 P. F8

Kreis Leipzig:	Tagebau Kulkwitz	4 P.	Do, Gr8
	Kulkwitz Wiesenlachen	1 P.	Gr8
	Papitzer Lachen	1 P.	JS
	Tongrube Liebertwolkwitz	1 P.	Erd
	Elsterstausee	1 P.	Hoy, F8
	Grube Großstädteln	1 P.	F8
	Schönaü Lachen	1 P.	Gr8
	Rückmarsdorf Grube	2 P.	Gr8

Durchzugsnotizen:

Mo/Dek.	Elsterst.	Sp.Wind.	Kläranl.N.	p	n	max.	
März	III	1 F8		5	6	2	
April	I						
	II	4 F8		6	13	4	
	III		2 G	4	7	2	
Mai	I			1	2	2	
	II		8 G	2	10	8	
	III						
Juni	I						
	II	2 F8	3 F8	6 Gr8	4	12	6
	III		14 Gr8	2 Wb	2	16	14
Juli	I			5 Gr8	2	6	5
	II		16 F8		5	36	16
	III	12 F8	5 F8	8 Gr8	9	40	12
Aug.	I	8 F8	8 F8	3 Gr8	6	26	8
	II		3 F8	1 Gr8	3	5	3
	III		1 F8	1 Gr8	3	6	4
Sept.	I		4 F8	4 Gr8	3	9	4
	II		2 F8	3 Gr8	4	8	2
	III				1	1	1
Okt.	I		4 F8		1	4	4

KMStad: Angaben über das Brutvorkommen liegen aus folgenden Gebieten vor:

Freiberg:	Speicherb. "Rosine"	3 BP ohne Erfolg Wer
Brand-B.:	Hüttenteich Berthelsdorf	1-2 BP (1 BP m. Erf.) Wer
	Talsp. Rauschenbach	1 Ex. (DZ?)
	4 Beob. v. Großhartmannsdorf	lassen Brut vermuten
		Ihle/Kiek

Klingenthal:	Talsp. Muldenberg	5 BP (27.4.-25.7.) Ern
Auerbach:	Klärteiche Pechtelsgrün	4 BP (7.4.-29.8.) max. 21 Ex. Tho, Krei, Ern
	Schlammteich Langenfeld	8 Ex. (4 BP?) H. Meyer
Oelsnitz:	Talsperre Pirk	1 BP Gon
Aue:	Schlema und Aue	2 BP Neuk
Glauchau:	Schafteich Glauchau	1 BP, Ho. Fri
KMStad:	KMStad-Siegmär	2 ad. (BV?) J. Frö
KMStad-Land:	Schimmelteiche Limbach-O.l P.	(BV) J. Frö

146. Mornellenregenpfeifer - Eudromias morinellus

Leipzig: Am 31.3. Götzwitzsee 1 Wei.

Beobachtungen in unserem Gebiet sind selten, dies gilt besonders für das Frühjahr.

147. Kiebitzregenpfeifer - Pluvialis squatarola

Leipzig: Nur wenige Daten!

5.10.	Speicherb. Wind.	1	G
	Großteich Torgau	1	F8
6.10.	Götzwitzsee	1	Kop, C. Feh, Ha u.a.
7.10.	Speicherb. Wind.	3	F8
13.10.	Speicherb. Wind.	3	G
20.10.	Horstsee	2	G. Feh, Bi
	Speicherb. Wind.	1	F8
27.10.	Speicherb. Wind.	1	G
2.11.	Großteich Torgau	2	F8

148. Goldregenpfeifer - Pluvialis apricaria

Leipzig: Die Art kommt zwar noch regelmäßig vor, aber die Zahlen sind wesentlich geringer als in den vergangenen Jahren.

11.8.	Speicherb. Wind.	1	G (im Brutkleid)
15.9.	Götzwitzsee	4	G./C. Feh, Verständig
7.10.	Krippenhna-Zschepplin	1	G

12.10.	Gerbisdorf	1 Kre
27.10.	Falkenhain	2 Kop
28.10.	Mutzschlehna	23 Grö
2.11.	Großteich Torgau	9 Fö
9.11.	Klärbecken N	1 Grö

KMStadt: 2 Ex. am 20.10. auf Flur Garnsdorf, Krs. KMStadt-  
land He.Fri, F.Uhlich, W.Weil.

151. Bekassine - Gallinago gallinago

Leipzig: Nur aus zwei Gebieten liegen Beobachtungen zur Brut-  
zeit vor: Großteich Torgau (Leh) und Wildenhainer Bruch (G,Tu).  
Die Art kommt sicher an weiteren Plätzen vor!

Im Winter sah nur Do am 6.2. 1 Stück im Hafen Leipzig.

Übersicht des Durchzuges:

Mo/Dek.	Sp.Wind.	Groß.T.	Klärarl.N	Göttwitzsee	p	n	max.
März	I						
	II	1 Fö	1 Tu			2 2	1
	III	3 Fö	16 Fö		5 Wei	5 27	16
Apr.	I					1 3	3
	II				3 C.Feh	2 10	7
	III				4 C.Feh	2 8	4
Juli	I						
	II					1 1	1
	III	5 Fö		12 Grö	2 C.Feh	3 19	12
Aug.	I	22 Fö		70 Grö		9 104	70
	II	11 Fö		29 Grö		7 63	29
	III	7 Fö		26 Grö		5 37	26
Sept.	I	35 Fö		135 Grö		8 179	135
	II	38 Fö	50 Tu	150 Grö	3 Ha, C.Feh	8 263	150
	III	32 Fö		150 Grö		7 239	150
Okt.	I	80 Fö	1 Fö	80 Grö	35 Ha, C.Feh	5 223	80
	II	110 G	110 Fö	145 Grö	5 C.Feh	7 454	145
	III	43 G		20 Zö		6 127	60

Mo/Dek.	Sp.Wind.	Groß.T.	Klärarl.	N Göttwitzsee	p	n	max.
Nov.	I	62 F8	118 F8	3 Grö	6	227	118
	II	3 G			6	8	3
	III						

KMStadt: Die 1968 zahlreicher als im Vorjahr eingegangenen Brutzeitfeststellungen bedeuten keine Bestandsvergrößerung, sondern lediglich eine vollständigere Erfassung der vermutlichen und sicheren Brutplätze.

Kreis	Gebiet	Paare	Beobachter
Brand-Erbisd.	Groß. Großhartm.	Balz 1 ♂	Iie, Kiek
Marienberg	Hochmoor	Satzung 2	Sae
Annaberg	Dörfeler Moor	11.5. 1 Ex.	C.Feh
	Scheibenberger Teiche	Balz 2 ♂♂	C.Feh
Schwarzenberg	"Halbe Meile"	17.6. 1 Ex.	C.Feh
	Tellerhäuser	15.6. 1 Ex.	C.Feh
Auerbach	Teiche Pechtelsgrün	BV 1	Krei
	Ellefeld/Falkenstein	Balz 1 ♂	G.Schö
	Teiche Unterlauterbach	2	Ern
Oelsnitz	Teiche Schönberg	2-3	Gon
Geithain (Leipzig)	Narsdorf/Ossa	1-2	T.MU

Durchzug: Frühjahr 9.3.-7.4., Herbst 6.7.-10.11. Haupttrastplätze waren der Großteich Großhartmannsdorf und die Limbacher Teiche. Die Tabelle bringt den Zug im Gesamtgebiet:

Mo/Dek.	p	n	max.	Mo/Dek.	p	n	max.
März	I	2	2	1	Sept.	I	1 3 3
	II	3	10	4		II	5 23 16
	III	2	3	2		III	5 25 13
Apr.	I	2	7	5	Okt.	I	3 4 2
Jul	I	1	1	1		II	3 13 7
	II	2	19	16		III	
	III				Nov.	I	1 3 3
Aug.	I	2	17	15			
	II	4	40	30			
	III	4	19	11			

153. Zwergschnepfe - *Lymnocyptes minimus*

---

Leipzig: Auffallend viele Beobachtungen, davon aber nur 2 aus dem Frühjahr.

Frühjahr:	17.2.	Speicherb. Wind.	2 F8
	16.3.	Speicherb. Wind.	2 Fr8
Herbst:	21.9.	Lossener Teich	1 Karg.
	28.9.	Speicherb. Wind.	1 F8
	29.9.	Hafen Leipzig	1 Do
	5.10.	Speicherb. Wind.	1 G
	6.10.	Eschefeld	1 Stre
	7.10.	Speicherb. Wind.	5 F8
	13.10.	Speicherb. Wind.	6 G
	20.10.	Speicherb. Wind.	5 F8
		Eschefeld	3 Stre
	21.10.	Kläranlagen N	1 Z8
	26.10.	Eschefeld	5 Stre
	27.10.	Elsterstausee	10 F8
		Speicherb. Wind.	12 G
	2.11.	Speicherb. Wind.	17 G
		Elsterstausee	3 Hoy
	3.11.	Elsterstausee	5 Hoy
	9.11.	Elsterstausee	4 G
		Speicherb. Wind.	19 F8
	10.11.	Speicherb. Wind.	11 G
		Eschefeld	3 Stre
	16.11.	Eschefeld	3 G
		Speicherb. Wind.	9 G
	17.11.	Elsterstausee	1 Wei, Hoy
		Speicherb. Wind.	9 G
	23.11.	Elsterstausee	1 Hoy
	24.11.	Speicherb. Wind.	5 F8
		Eschefeld	2 Stre
1.12.	Elsterstausee	2 Hoy	
7.12.	Speicherb. Wind.	2 G	

Auffallend sind die hohen Zahlen zusammen angetroffener Vögel.

KMStadt: Folgende Durchzügler wurden gemeldet: (je 1 Ex.)

23.3.	KMStadt-KlÄranlage	Sae
27.3.	KMStadt-KlÄranlage	Lom, Sa
6.4.	KMStadt-Adelsberg	Neu
14.4.	Claußnitz	He. Fri

154. Waldschnepfe - Scelopax rusticola

Leipzig: Nur eine Beobachtung läßt auf Brut schließen:

6.6. 1 bei Ochsenaal (Kop).

Zugfeststellungen:

3.8.	Schmannewitz	1 Gug
6.10.	Witznitz	1 F8
	Liemehna	1 Wb
26.10.	Wildenhainer Bruch	2-3 Kop
	Dahlen	1 L8
3.11.	Gruna	1 F8
	Wildenhainer Bruch	1 J. Fie

KMStadt: Neben 7 Beobachtungen mit insgesamt 11 Ex. max. 3 aus den Zugzeiten 17.2.-27.3. und 6.10.-8.11. stellte Ihle einen Vogel dieser Art balzend am 20.4. und am 18.5. bei Bad Einsiedel/Seiffen fest.

156. Großer Brachvogel - Numenius arquata

Leipzig: In den Graditzer Elbwiesen hielt sich ein Brutpaar auf (Mar). Der Durchzug zeigte sich recht deutlich an den KlÄranlagen N:

Mo/Dek.	KlÄranl. N	p	n	max.
Juli III	1 Erd	3	3	1
Aug. I				
	II	1	4	4
	III 9 Gr8	4	25	14

		Kläranl. N	p	n	max.
Sept.	I		2	3	2
	II	7 Wb	2	29	22
	III	18 Wb	2	21	18
Okt.	I	17 Grö	2	33	17
	II	8a Tu	3	163	8a
	III	17 Zö	2	18	17
Nov.	I	19 Grö	2	92	73

KMStad: Nur drei Feststellungen dieser Art:

19.3.	Siebenlehn	1 Ex. nach N	Lie
20./27.	Hirtstein/Satzung	1 Ex. rastend Nest, Blum, Schiefer	
10.8.	Limbacher Teiche	1 Ex. J.Frö	

158. Regenbrachvogel - Numenius phaeopus

Leipzig: Zöhe sprach am 31.10. an den Kläranlagen N 1 Ex. als Regenbrachvogel an, der sich zusammen mit 17 Großen Brachvögeln hielt. Ein auffallend spätes Beobachtungsdatum.

159. Uferschnepfe - Limosa limosa

Leipzig: Im Frühjahr gelangen Beobachtungen an drei verschiedenen Stellen innerhalb der bekannten Zugzeit, im Herbst nur 1 Feststellung

6.4.	Kulkwitz	1	Wei
12.4.	Eschefeld	1	Ger
13.4.	Eschefeld	4	G
1.5.	Eschefeld	1	Lindner, Donner
2.5.	Speicherb. Wind.	1	Frie
28.7.-4.8.	Speicherb. Wind.	1	Fö, Ki, Web, Ger u.a.

KMStad: 28.3. 1 Paar Kiek, desgl. 30.3.  
31.3. 2 Ex. Ihle, - 24.7. 1 Ex. Ihle

Alle Beobachtungen stammen vom Großteich Großhartmannsdorf.

160. Pfuhlschnepfe - Limosa lapponica

Leipzig: Erd gibt für den 19.9. 1 Ex. für das Elsterflutbecken an. Grö beobachtete 1 Ex. am 6.10. an den Kläranlagen N, daß sich zu Brachvögeln hielt.

161. Dunkler Wasserläufer - *Tringa erythropus*

Leipzig: Wie alle Limikolen im Jahr 1968 auffallend spärlich!

Frühjahr:	28.4.	Speicherb.Wind.	2 G
	2.5.	Haseibach	2 Frie
	4.5.	Göttwitzsee	1 C.Feh
	5.5.	Kulkwitz	4 F8
	18.5.	Göttwitzsee	3 Erd, Ha, Wolf
Sommer:	3.6.	Göttwitzsee	2 C.Feh
	29.6.	Rückmarsdorf Grube	1 Brutkleid Gr8
	30.6.	Windisch-Leuba	1 Brutkleid Gr8

Herbztzug:

Mo/Dek.	Sp.Wind.	Kläranl. N.	GroSt.T.	p	n	max.
Juli	III	2 Erd		1	2	2
Aug.	I					
	II			1	1	1
	III	1 F8	9 Gr8	5	17	9
Sept.	I		11 Gr8	1	11	11
	II	6 F8	7 Gr8	2 Tu	4	17
	III	2 Frie	6 Gr8	3	9	6
Okt.	I		1 Gr8	3	5	2
	II			2 Tu	1	2
	III					
Nov.	I			1 F8	2	2

KMStadt: Übersicht über den Durchzug (F. 23.-28.4./H.30.7.-14.9.)

Mo/Dek.	p	n	max.
Apr.	III	2	8
Juli	III	1	1
Aug.	I	1	1
	II	1	5
	III	2	20
Sept.	I	1	5
	II	1	2

Beob.: Ihle, Kiek, Lie, Wer (Großhartm. Teiche)  
J.Fr8 (Limbacher Teiche)

162. Rotschenkel - *Tringa totanus*

Leipzig: 1968 zahlreicher als im Vorjahr:

Im Frühjahr zwischen 17.3. und 1.6. 11 Beobachtungen und im Herbst zwischen 13.7. und 6.10. 9 Beobachtungen:

Frühjahr:	17.3.	Pleißestausee	1 F8
	25.3.	Kuhtsich Torgau	1 Leh
	6.4.	Kulkwitz	2 Wei
	14.4.	Speicherb.Wind.	3 F8
	21.4.	Speicherb.Wind.	2 F8
		Göttwitzsee	1 C.Beh
	2.5.	Döbern	1 Leh
	4.5.	Göttwitzsee	3 C.Feh
	12.5.	Speicherb.Wind.	1 Frie
	18.5.	Kulkwitz	1 Gr8
	1.6.	Göttwitzsee	1 C.Feh
Herbst:	13.7.	Speicherb.Wind.	3 F8
	19.-21.7.	Kläranlagen N	1-2 Gr8
	28.7.	Göttwitzsee	1-3 Ha, C.Beh
	3.8.	Speicherb.Wind.	1 F8
	17.8.	Speicherb.Wind.	1 G
	3.9.	Eschefelder Teiche	2 Fei
	4.9.	Lauer Leipzig	1 F8
	7.9.	Rötha	1 F8
	17.9.-6.10.	Klärbecken N	1 Wb, Gr8, Wg
	6.10.	Göttwitzsee	1 Ha, Wolf, G.Feh u.a.

KMStadt: Übersicht über den Durchzug (F:21.4.-1.6./H:18.7.-28.9.)

Mo/Dek.	p	n	max.
April	III	2	7
Mai	II	2	1
	III	1	1
Juni	I	1	1
Juli	II	1	1
	III	1	1
Sept.	III	1	2

Orte: Großhartmannsdorf, Pöhl, "Rosine", Limbach-O.

Beobachter: Ern. J.Frö, Kiek, Wer, Wo

163. Grünschenkel - *Tringa nebularia*

Leipzig: Im Frühjahr zwischen 12.4. und 19.5. und im Herbst bis 3.11. angetroffen.

Übersicht der Beobachtungen:

Mo/Dek.	Kläranl.N	Speicherb.W.	n	p	max.
Apr. II			1	1	1
		3 G	2	8	8
Mai I			5	6	2
	1 Wb	2 Fö	3	6	3
Juli I					
		2 Fö	2	3	2
	3 Erd	2 Fö	4	7	3
Aug. I		2 G	3	4	2
		2 Fö	2	3	2
	1 Grö		3	4	2
Sept. I		1 Fö	7	17	5
		1 Fö	4	9	4
	3 Wb, Grö		1	3	3
Okt. I	4 Wg, Grö	2 Fö	5	11	4
	2 Grö		1	2	2
	1 Zö, Grö		1	1	1
Nov. I			1	1	1

KMStad: Übersicht über den Durchzug (F: 21.4.-1.5./H: 9.7.-6.10.)

Mo/Dek.	p	n	max.	
Apr. III	1	1	1	
Mai I	1	1	1	
Juli I	1	1	1	
	2	2	1	
	2	10	9	
Aug. I	2	9	6	Sieben Beob.-Orte
	2	5	4	16 Beobachter
	4	15	9	
Sept. I	2	8	6	
	3	5	2	
	1	2	2	
Okt. I	1	2	2	

164. Waldwasserläufer - *Tringa ochropus*

Leipzig: Wie alle Limikolen 1968 nicht sehr zahlreich!

Übersicht:

Mo/Dek.	Speicherb.W.	Kläranl. N	Elsterst.	n	p	max.
März	I					
	II			1	1	1
	III			1	1	1
Apr.	I		1 Hoy	4	4	1
	II	2 Fö	1 Fö, Wei	2	3	2
	III	1 Fö		2	2	1
Mai	I					
	II			3	3	1
	III					
Juni	I					
	II	1 Fö		2	2	1
	III	5 Grö		2	6	5
Juli	I		1 Grö	2	2	1
	II	2 Fö	2 Grö	6	13	3
	III	3 Fö	2 Erd, Grö	4	6	2
Aug.	I	2 Fö	1 Grö	5	6	2
	II	1 Fö		1	1	1
	III			1	1	1
Sept.	I	2 Fö		3	4	2
	II		2 Grö	4	5	2
	III					
Okt.	I	1 G		2	3	2
	II	1 Fö		6	9	3
	III					
Nov.	I			2	3	2
	II					
	III			1	2	2
Dez.	I			1	1	1

Die Frühjahrsdaten liegen zwischen dem 16.3. und 18.5.

KMStadt: Übersicht über den Durchzug (F:6.4.-20.5./H:17.6.-15.9.)

Mo/Dek.	p	n	max.
Apr. I	1	1	1
II	1	1	1
Mai II	1	4	4

Juni	II	1	1	1	
	III	1	1	1	Acht Beob.-Orte
Juli	II	1	4	4	Acht Beobachter (Ern,
	III	2	4	2	He.Fri, J.Frö, Kiek,
Aug.	I	1	1	1	Krei, Sa, Schi, Wo)
	II	1	2	2	
Sept.	I	3	3	1	
	II	1	1	1	

165. Bruchwasserläufer - *Tringa glareola*

Leipzig: Im Frühjahr ab 21.-29.4. (Fö, G, Tu) und im Herbst bis 13.10. (G, Tu, Grö) festgestellt.

Übersicht:

Mo/Dek.	Speicherb.W.	Kläranl. N	n	p	max.
Apr. III	6 G		4	11	6
May I			5	13	5
	II	23 Fö	7	39	23
	III				
Juli I					
	II	1 Fö	1	1	1
	III	7 Grö	2	8	7
Juli I		22 Grö	3	36	22
	II	79 Fö	4	105	79
	III	27 Fö	11	153	69
Aug. I	54 Fö	42 Grö	13	149	54
	II	19 Fö	8	70	36
	III	2 Fö	5	31	22
Sept. I	9 Fö	18 Grö	4	34	18
	II	11 Grö	3	14	11
	III	2 Fö	2	4	2
Okt. I	2 Fö		2	3	2
	II	1 G	3	5	3

KMStad: Übersicht über den Durchzug (F:4.-26.5./H:29.6.-14.9.)

Mo/Dek.	p	n	max.
May I	3	4	2
	II	2	4
	III	1	1

Juni	III	2	4	3	
Juli	I	2	11	10	
	II	3	28	25	Neun Beob.-Orte
	III	2	31	30	16 Beobachter
Aug.	I	4	39	30	
	II	6	33	25	
	III	5	21	6	
Sept.	I	3	7	5	
	II	1	1	1	

167. Flußuferläufer - Tringa hypoleucos

Leipzig: Die ersten Ex. sah F8 am 20.4., die letzten Hoy am 13.10.. Seit einigen Jahre ist die Bedeutung der Leipziger Kläranlagen als Durchzugsgebiet sehr zurückgegangen.

Über Bruten liegen keine Angaben vor.

Übersicht:

Mo/Dek.	Kläranl.N	Elsterfl./Kl	Sp.Wind.	Elsterst.	n	p	max.	n
Apr.	II				2	2	1	
	III		2 G		5	6	2	
Mai	I	1 Erd			6	7	2	
	II	1 Erd,Grö	1 F8		7	7	1	
Juni	III		3 Grö		1	3	3	
Juli	I	1 Grö		1 F8	4	8	4	
	II	9 Grö	9 Grö	2 F8	10	36	10	
	III	21 Grö	26 Erd	3 F8	8	83	26	
Aug.	I	13 Grö	25 Tu	4 F8	7	115	27	
	II	13 Grö	15 Erd	5 G	6	47	15	
	III	8 Grö	7 Erd		12	57	26	
Sept.	I	8 Grö	3 Erd	1 F8	7	16	8	
	II	1 Grö	4 Erd	2 Frie	2	12	4	
	III				1	5	3	
					1	5	3	
Okt.	I	1 Wg		1 F8	3	3	1	
	II				1	2	1	
						2	1	

KMStad: Übersicht über den Durchzug (F: 27.4.-8.6./H:30.6.-5.10.)

Mo/Dek.	p	n	max.
Apr.	III	3	1
Mai	I	3	14
	II	5	11
			5

Mo/Dek.	p	n	max.	
Mai III	1	1	1	
Juni I	1	1	1	
III	3	3	1	
Juli I	2	2	1	16 Beob.-Orte
II	2	2	1	15 Beobachter
III	4	27	12	
Aug. I	9	74	25	
II	9	54	20	
III	10	30	8	
Sept. I	4	14	5	
II	2	7	6	
III	2	3	2	
Okt. I	1	1	1	

170. Knutt - Calidris canutus

Leipzig:

Vom 27.10.-2.11. hielt sich 1 Ex. am Speicherb.Wind. auf.

Das Datum der Beobachtung liegt auffallend spät.

KMStadt: Auch wie im Vorjahr nur eine Herbstbeobachtung:

Kiek sah am 24.7. 1 Ex. im Prachtkleid in Großhartmannsdorf.

171. Zwergstrandläufer - Calidris minuta

Leipzig: Bereits im Juli wurden an zwei Stellen je 1 Ex. im Brutkleid angetroffen:

20.-27.7. Schönau (Grö) und

26.-28.7. Kläranlagen N (Grö, Erd)

Die weiteren Beobachtungen liegen in der normalen Zugzeit.

Die Zahl der Feststellungen war auffallend gering.

Mo/Dek.	Kläranl. N.	Speicherb.Wind.
Sept. I		
II		1 F8
III		1 F8
Okt. I		1 G, F8
II	1 Grö	1 G
III		
Nov. I		1 G

KlStadt: Im Gegensatz zum Vorjahr nur eine Herbstbeobachtung:  
Kiek sah am 21.7. 1 Ex. am Großteich Großhartmannsdorf.

172. Temminckstrandläufer - Calidris temminckii

Leipzig: Im Frühjahr gelang nur 1 Nachweis, Karg fing am 9.5.  
am Lossener Teich/Altenburg 1 Ex.

Übersicht des Herbstzuges:

21.7.	Speicherb.Wind.	1 F8
8.-10.8.	KlÄranl. N	2 Gr8
17.8.	Speicherb.Wind.	1 G
18.8.	Speicherb.Wind.	2 F8
24.8.	KlÄranlagen N	1 Gr8
29.8.	KlÄranlagen N	3 Gr8
1.9.	KlÄranlagen N	5 Gr8
8.9.	KlÄranlagen N	2 F8
15.9.	Gehegeteich Torgau	1 Tu
12.10.	KlÄranl. N	1 Gr8 (spätes Datum!)

KlStadt: 20.5. Talsperre Pühl 4 Ex. Wo  
20.7. und 24.8. je 1 Ex. Großteich Großhartm. Kiek, Lie

174. Graubruststrandläufer - Calidris melanotos

Leipzig: Am KlÄrbecken N hielt sich am 8.8. 1 Ex. auf und  
konnte unter günstigen Bedingungen längere Zeit beobachtet  
werden (Gr8).

176. Alpenstrandläufer - Calidris alpina

Leipzig: Im Frühjahr traf nur Wei am 19.5. bei Kulkwitz 1  
schlichtfarbenedes Stück an.

Übersicht des Herbstzuges:

Bereits im Juli an zwei Stellen Ex. im Brutkleid (vgl. auch  
Zwergstrandläufer)

4.7.	KlÄranlagen N	1 Gr8
20.7.	Schönau	1 Gr8
26.7.	KlÄranl. N	2 Gr8
27.7.	Schönau	2 Gr8
28.7.	KlÄranl. N	1 Gr8

Mo/Dek.	Sp.Wind.	Kläranl.N.	n	p	max
Aug. III	4 Erd	2 Grö	2	6	4
Sept. I		4 Grö	1	4	4
	II 1 Frie		3	19	15
	III	3 Grö	2	4	3
Okt. I	25 G	10 Grö	4	113	50
	II 8 G	6 Grö	4	26	8
	III 1 G		1	1	1
Nov. I	1 G		2	4	3
	II 1 G		2	2	1

Die letzte Beobachtung gelang am 17.11. (G).

KMStadt: Im Jahr 1968 erfolgte ein ungewöhnlich schwacher Durchzug. Während das Vorjahr 203 Durchzügler brachte, wurden 1968 nur 15 Ex. beobachtet! Sie verteilen sich vom 20.7.-11.10. und stammen aus Großhartmannsdorf und Limbach-O. (Kiek, J.Frö, Sae).

177. Sichelstrandläufer - Calidris ferruginea

(Leipzig siehe Nachtrag)

KMStadt: Kiek und Ihle sahen vom 18.-25.7. 1 Ex. am Großteich Großhartmannsdorf.

178. Sanderling - Calidris alba

Leipzig: Ein Nachweis: 22.9. Dölitzer Lachen 1 (Erd).

181. Kampfläufer - Philomachus pugnax

Leipzig: Die Frühjahrsdaten reichen vom 9.3. (Fö) bis 19.5. (Wei), die Herbstvorkommen vom 30.6. (Grö) bis 2.11. (Fö).

Übersicht:

Mo/Dek.	Kläranl.N	Sp.Wind.	n	p	max.
März I			1	1	1
		13 Fö	3	20	13
April I			1	1	1
		2 Wei	3	32	19
		21 G	6	65	21

Mo/Dek.	KlÄranl. N	Sp.Wind.	n	p	max.
MaI	I		2	25	22
	II	11 F8	3	13	11
	III				
Juni	I				
	II	5 F8	1	5	5
	III	1 Gr8	1	1	1
Juli	I	19 Gr8	4	28	19
	II	33 Gr8	4	52	33
	III	32 Gr8	5	63	32
Aug.	I	26 Gr8	2	46	26
	II	16 Gr8	2	28	16
	III	56 Gr8	2	72	56
Sept.	I	74 Gr8	2	79	74
	II	40 Gr8	3	50	40
	III	19 Gr8	2	33	19
Okt.	I	23 Gr8	2	37	23
	II	1 Gr8	2	7	6
	III	1 Gr8	1	1	1
Nov.	I		1	2	2

KMStadt: Übersicht über den Durchzug (F:30.3.-25.5. -  
H:6.7.-27.10.)

Mo/Dek.	p	n	max		
März	III	2	4	2	
Apr.	III	4	20	11	
MaI	I	1	2	2	
	III	1	3	3	
Juli	I	1	5	5	
	II	2	12	9	
	III	2	14	9	Fünf Beob.-Orte
Aug.	I	1	4	4	Elf Beobachter
	III	2	5	3	
Sept.	I	2	9	7	
	II	2	6	5	
	III	2	17	15	
Okt.	II	1	3	3	
	III	1	2	2	

185. Odinhühnchen - Phalaropus lobatus

Leipzig: Ein Ex. hielt sich am 3./4.8. am Speicherb.Wind.  
auf (F8, Ger, Web, Ki).

186. Triel - Barhinus oedionemus

Leipzig: Am 25.7. hörte Leh bei Weßnig/Torgau Rufe, die er  
dieser Art zuschrieb. In diesem Gebiet hat die Art früher  
gebrütet!

194. Heringsmöwe - Larus fuscus

Leipzig: Zwei Nachweise: G sah einen Altvogel am 5.10.  
am Speicherb.Wind. Einen Jungvogel, den JS am 17.12. am  
Elsterflutbett sah, bezieht er auf diese Art.

195. Silbermöwe - Larus argentatus

Leipzig: Ein Jungvogel hielt sich vom 28.-31.12. am Leip-  
ziger Elsterflutbett auf (Grö, Tu). Ein diesjähriger Jung-  
vogel, der am 31.10. auf der Grube Rückmarsdorf rastete,  
war vermutlich auch diese Art (Grö).

KMStadt: Am Großteich Großhartmannsdorf sahen Di, Kiek und Lie  
vom 7.-18.8. ein imm.Ex.

196. Sturmmöwe - Larus canus

Leipzig: Im Vergleich zum Vorjahr wesentlich weniger Beob-  
achtungen. Über Bruten liegen keine Angaben vor:

Übersicht:

Mo/Dek.	Elsterfl.	Witznitz	n	p	max.	ad : juv
Jan. I	10 Grö		1	10	10	3 : 7
II	1 Grö		2	2	1	0 : 1
III			1	1	1	0 : 1
Febr. I	1 Wg		1	1	1	0 : 1
II						
III						

Mo/Dek.	Elsterfl.	Witznitz	n	p	max.	ad : juv	
März	I		1	2	2	2 : 0	
	II	2 Gr8	1 F8	2	3	2	2 : 1
	III		1	1	1	1 : 0	
Apr.	I						
	II		1	2	2	0 : 2	
	III		2	2	1	1 : 1	
Mai	I						
	II	1 Erd	2	2	1	1 : 1	
	III						
Juni	I	1 Erd	1	1	1	0 : 1	
	II		1	1	1	1 : 0	
	III						
Juli	I						
	II		1 F8	1	1	1	1 : 0
	III		3 F8	1	3	3	2 : 1
Aug.	I	1 Erd	1	1	1	0 : 1	
	II						
	III						
Sept.	I						
	II	1 Erd	1	1	1	0 : 1	
	III						
Okt.	I		2	2	1	0 : 1	
	II	2 Tu	3	7	4	1 : 1	
	III	2 Wg	1 F8	3	4	2	1 : 1
Nov.	I		1	1	1	1 : 0	
	II		2	2	1	1 : 1	
	III	1 Gr8	2	2	1	1 : 1	
Dez.	I	1 G	1	1	1	0 : 1	
	II						
	III	8 Gr8	1	8	8	2 : 6	

KMStädt: Vier Beobachtungen, davon 1 Ex. ad.:

25.3.	Falkenstein/V.	1 ad. Ex.	G.Schön
4.5.	P8hl	1 imm. Ex.	G.Schön
28.9.	P8hl	1 imm. Ex.	Wo
30.10.	Limbacher Teiche	2 imm. Ex.	J.Fr8

199. Schwarzkopfmöwe - Larus melanocephalus

Leipzig: Wiederum 2 Nachweise: Am 11.8. 1 Jungvogel am Speicherb.Wind. (G,F8) und am 28.9. 1 ad am Klärbecken N (Gr8).

200. Lachmöwe - Larus ridibundus

Leipzig: Am Göttwitzsee nach C.Feh nur noch höchstens 2 Brutpaare. Die Kolonie scheint wieder zu erlöschen. An den Eschefelder Teichen waren Mitte April 750 (G) und Ende April etwa 1450 Vögel (G) anwesend. Gebrütet haben aber nur reichlich 100 Paare (Fei). Mitte Mai zählte F8 immerhin noch 600. Wahrscheinlich ist die Brutpaarzahl zu niedrig angegeben. In der Grube Rückmarsdorf brüteten etwa 100 Paare (Gr8), viele Gelege wurden zerstört, trotzdem konnte Høy 27 juv. beringen, Gr8 zählte am 6.7. nur 39 juv. und 8 pulli.

Übersicht des Zugesehens:

Mo/Dek.	Elsterst.	Elsterfl.	Sp.Wind.	GroßT.	Witznitz	
Jan.	I	1 F8	580 Tu			
	II	3 F8	250 Eb			
	III		200 Gr8			
Febr.	I		361 Erd			
	II		424 JS			
	III		205 Gr8			
März	I	2 F8	411 JS	48 Wei		
	II	2500 F8	1300 Gr8	177 F8	26 Tu	
	III	48 F8	80 Gr8			
Apr.	I	290 F8	416 Erd			
	II		480 Tu			
	III		52 Erd	100 F8		
Mai	I		3 Erd			
	II		9 Erd			
	III		36 Erd			
Juni	I		30 Erd			
	II		56 Gr8	37 F8		
	III		84 Erd		6 F8	
Juli	I	1 F8	132 Gr8	46 Tu		
	II		105 Gr8	450 F8	328 Tu	23 F8
	III		61 Erd	260 F8	350 Tu	236 F8

Mo/Dek.	Elsterst.	Elsterfl.	Sp.Wind.	Groß.T.	Witznitz
Aug. I		327 Tu	300 F8		350 F8
II		256 Gr8	1000 F8		
III		235 Erd	196 F8		45 F8
Sept. I		132 Erd	240 F8		31 F8
II		322 Erd	38 F8	73 Tu	
III		166 Gr8	376 F8		81 F8
Okt. I		500 Erd	190 F8		
II		372 Erd	173 G	38 F8	106 F8
III	1815 F8	360 Tu			11 F8
Nov. I	1000 Erd	600 Erd	131 G	750 Leh	
II		350 Erd	46 F8	19 Tu	
III	94 F8	650 Erd		160 Leh	
Dez. I		250 Gr8		230 Leh	
II	12 F8	257 JS		16 Tu	5 F8
III		312 Tu		68 Leh	

KMStad: Auch 1968 im Bezirk nur 1 Brutplatz.

Krs. Brand-Erbisd. Großhartmannsd. GroßT. 30-35 P.lie, Wer  
Den Durchzug im Bezirk sollen die Werte aus zwei Gebieten  
umreißen, leider lagen die entsprechenden Angaben vom  
Stausee Glauchau und den Schlammteichen Helmsdorf, zwei  
wichtigen Rastplätzen, nicht vor.

Regelmäßigen Sommeraufenthalt zum Zwecke der Nahrungssuche  
gab es wieder im oberen Erzgebirge und Vogtland, besonders  
in den östlichen Kreisen.

Mo/Dek.	KMStad	Talsp.Pöhl
Jan. I		7 Cz
II	3 Lom, Sae	
III	5 Sae	
Febr. I	1 Sae	
II		
III	1 Sae	
März I	35 Lom, Sae	
II	260 Lom, Sae	
III	29 J. Fr8, Lom, Sae	25 Wo
Apr. I	8 Lom	10 Wo
II		4 Ern
III	2 Sae	80 Wo

Mo/Dek.	KMStadt	Talsp. Pöhl
Mai I	3 Sae	60 G. Schö
II	15 Sae	100 Wo
III		150 Cz, Ern
Juni I		100 Wo
II		
III		180 Wo
Juli I		100 Wo
II		
III		50 Wo
Aug. I		
II		
III		
Sept. I		
II		
III		8 Wo
Okt. I		
II		28 Cz
III	13 Sae	12 Ern, Tho
Nov. I	1 Sae	5 Wo
II		2 Cz
III		30 Wo
Dez. I		5 Wo

201. Zwergmöwe - Larus minutus

Leipzig: Wieder einige recht späte Daten. Dafür fehlen Angaben über den Frühjahrszug völlig.

Herbst:	26.7.	Großteich Torgau	1 juv	Tu
	7./8.8.	Elsterstausee	2 juv	F8
	6.10.	Pleißestausee	1 juv	F8
	13.10.	Pleißestausee	1 juv	F8
	11.11.	Elsterflutbett	1	Erd.

KMStadt: 1968 in beiden Zugzeiten je ein Nachweis

13.5.	Großteich Großhartmannsdorf	1 immat	Ihle, Kiek
17.11.	Schwanenteich Zwickau	1 ad, 1 immat	Sieb.

204. Dreizehennöwe - Rissa tridaactyla

Leipzig: Erd meldet 1968 gleich zwei Feststellungen:  
Er sah am 20.1. 1 juv am Elsterflutbett und am  
9.11. 1 ad am Elsterstausee.

205. Trauerseeschwalbe - Chlidonias niger

Leipzig: Die ersten Vögel im Frühjahr sah C.Feh am 18.4.,  
die letzten im Herbst Fö, Ger am 8.9..

Zugübersicht:

Mo/Dek.	Elsterst.	Sp.Wind.	Großt.T.	Bschef.T.	n	p	max.
Apr.	I			1 Fei	2	3	2
	III	1 Fö		5 Fö	2	6	5
Mai	I	8 Hoy, Fö	17 Tu	35 Gerst	5	72	35
	II	20 G		20 Fö	7	60	20
	III	6 Hoy			1	6	6
Juni	I			6 J.Fie	1	6	6
	II	1 Fö		10 Frie	2	11	10
	III		1 G		4	7	3
Juli	I						
	II		7 Tu		1	7	7
	III		1 Fö	10 Tu	2	11	10
Aug.	I	5 Fö		6 Fei	2	11	6
	II						
	III	15 Wei	9 Fö		3	25	15
Sept.	I	13 Ger	5 Wei	9 Leh	6 Frie	7	44
	II						

KMStad: Der Durchzug im Jahre 1968 wird durch folgende  
Tabelle veranschaulicht, beide Zugzeiten sind nicht deut-  
lich zu trennen (21.4.-29.9.):

Mo/Dek.	Großhartm.	Pöhl	St.Glauchau	Limb.T.	Talsp.Pirk
Apr.	I				
	II				
	III	3 Kiek	6 Wo		4 J.Frö
Mai	I	10 Kiek	5 G.Schö	50 Ho.Fri	
	II	4 Kiek	12 Wo	3 Ho.Fri	
	III	4 Kiek		2 Ho.Fri	

Mo/Dek.	Großhartm.	Pöhl	St.Glauchau	Limb.T.	Talsp.Pirk
Juni I	3 Lie	1 Wo	1 Ho.Fri		
II			2 Ho.Fri		
III	3 Kiek		1 Ho.Fri		
Juli I	1 Kiek				
II	6 Kiek				
III	2 Kiek				
Aug. I	2 Kiek, Lie			1 J.Frö	
II					
III	1 Kiek			1 J.Frö	
Sept. I					
II					
III					2 Tho

206. Weißflügelseeschwalbe - Chlidonias leucopterus

Leipzig: Kop beobachtete ein ausgefärbtes Stück am 23.4. an den Stolpenteichen bei Heyda. Das Beobachtungsdatum liegt sehr früh.

209. Raubseeschwalbe - Hydroprogne caspia

Leipzig: 1968 gelangen zwei Nachweise: 24.8. Grube Großzüssen 1 ad Fö und 10.9. Eschefelder Teiche 2 Fei.

KMStad: Am 13.5. beobachteten Kiek und Ihle ein ad. Ex. am Großteich Großhartmannsdorf.

210. Flußseeschwalbe - Sterna hirundo

Leipzig: 3 Beobachtungen:

25.4.	Elsterstausee	1 Fö
31.8.	Eschefelder Teiche	3 Urban/Schubert lt. Fei
15.9.	Großteich Torgau	1 juv Tu.

KMStad: Vier Beobachtungen verteilen sich gleichmäßig auf beide Zugzeiten:

23.4.	Großteich Großhartmannsdorf	1 Ex. Kiek
26.4.	Limbacher Teiche	1 Ex. J.Frö
6.7.	Großteich Großhartmannsdorf	1 Ex. Kiek
26.8.	Talsperre Pöhl	1 Ex. Wo

214. Zwergseeschwalbe - Sterna albifrons

Leipzig: Fö sah einen Altvogel am 28.9. an den Eschefelder Teichen.

225. Hohltaube - Columba oenas

Leipzig: Beobachtungsnotizen aus der Brutzeit liegen für folgende Gebiete vor: Thümmnitzwald (Ha), Frauwalde (1 Paar ? Kop), Pannaforst (2 Paare G, Fö), Kemmerforst (2 Paare G), bei Lucka beringte Tre am 30.6. 1 und am 7.9. 2 juv; Zweininger Grund/Döbeln (2 Paare G.Frost). Weitere Brutvorkommen sind in den Kreisen Grimma, Geithain und Döbeln zu erwarten.

226. Ringeltaube - Columba palumbus

KMStadt: Recht eindrucksvolle Beobachtungen von Ern, Ihle, E.Mö, Sae, G.Schö und W.Weil geben einen Einblick in das Herbstzugeschehen, das vom 26.9. bis zum 16.10. beobachtet wurde.

Mo/Dek.	p	n	max.
Sept. III	11	3190	1000
Okt. I	11	5475	2000
II	2	360	325

227. Turteltaube - Streptopelia turtur

Leipzig: Trotz einer ganzen Reihe von Brutzeitmeldungen bleibt unsere Kenntnis von der Art noch sehr lückenhaft!

Kreis Torgau:	Forst Pflückuff mind. 8 (Tu)		
Kreis Eilenburg:	Wildenhainer Bruch (G).		
Kreis Oschatz:	Lampertswalde (Kel), Mühl- und Grasteich Dahlen mind. Dahlen Nord		7 (Kel) (LÖ)
Kreis Wurzen:	Falkenhain	zahlreich	(Kop)

Kreis Grimma: Thümmelitzwald 3 (Ha), Müncherholz 2 (Ha),  
Haubitz mit juv. (Ha), Glastener Forst (Fö),  
Otterwisch-Ost (Fö), Bernbruch 3 (Fö), Bahren  
(C.Feh), Mutzschen (C.Feh), Rohrbach 2 (Oeh),

Kreis Borna: Witznitz (Fö)

Kreis

Geithain: Eschefeld (Fö,G),

Kreis

Altenburg: Fahnaforst (Fö), Kammerforst (G).

### 232. Schleiereule - Tyto alba

Leipzig: Nur für wenige Lokalitäten angegeben: Falkenhain  
(Sept./Okt. Kop) und Knauthain (12.9. 1 G), Lucka (15.7. 4 juv  
Tre), Lödla (19.3. 1 Oeler), Eilenburg (9.6. Nikolaikirche  
5 juv. Schulze, Feldscheune bei Eilenburg 12. und 18.12.  
je 1 ad. Schulze)

KMStadt: 1968 wurden mindestens 12 Brutpaare gemeldet, leider  
fehlen entsprechende Angaben aus den nördlichen Kreisen:

<u>Kreis</u>	<u>Ort</u>	<u>Paare</u>	<u>juv.</u>	<u>Beob.</u>
Brand-Erbisd.	Kirche Brand-Erbisd.	1	?	Wer
KMStadt-Land	Kirche Niederfrohna	1	4	J.Frö
	Kirche Röhrsdorf	1	4	J.Frö
	Kirche Wittgensdorf	1	4	J.Frö
	Kirche Rußdorf	1	4	J.Frö
Zwickau	VEB Sachsenring mögl.	1		Sieb
Oelsnitz	Burg Voigtberg	1	4	Schub
Plauen	Kirche Kürbitz	1	?	Schub
Reichenbach	Kirchen im Kreisgeb.	5	?	Cz

### 234. Uhu - Bubo bubo

KMStadt: 1968 wurde in einem Habichtkorb an einer Fasanerie  
im Vogtland 1 juv. Ex. gefangen, das an den Verletzungen  
starb.

Im Frühjahr 1968 kam 1 verletztes Ex. in den Zool.Garten  
Dresden und stammte aus dem Kreis Freiberg (H.Braun, Wer)

237. Sperlingskauz - Glaucoedidium passerinum

KMStad: 1968 ein Brutnachweis, einziges Vorkommen in diesem Jahr: NSG "Gr.Kranichsee" 1 BP, 5 juv. Ern, Krei, E.Mö, Tho Dr. Schönn

238. Steinkauz - Athene noctua

Leipzig: Bei Treben wurde die Art ständig angetroffen (bis 4 Ex. im August) G, Fö.

Nördlich Schkeuditz beringte Gro am 5.7. 1 juv; für Canitz/Mulde meldet Li 1 Brutpaar.

KMStad: 1968 wurde nur 1 Brutvorkommen bekannt. Auf diese Art ist unbedingt zu achten. Alle Angaben über ehemalige bzw. letzte Vorkommen sowie Neuansiedlungen sind außerordentlich wichtig. Bitte alle Fakten an uns schicken!

Krs. Plauen zwischen Syrau und Mehlteuer 1 BP, 5 juv. Brut in künstl. Nisthöhle, wahrscheinlich vom Marder geplündert (Schub).

239. Waldkauz - Strix aluco

Leipzig: Brutvogel im Stadtgebiet Leipzig (Stro, Grö), Dübener Heide (Tu, G), Park Taucha (J, Fie), Auengebiete (Hey, Grö, Erd, JS), Oberholz (Blü), Park Torgau und Elbaue (Len), Kohlenberg/Brandis (Grö). Zweifellos nur ein sehr kleiner Bruchteil des tatsächlichen Brutbestandes.

KMStad: Die leider sehr unvollständigen Meldungen aus dem Jahre 1968 weisen folgende Fakten aus:

Kreis	Ort	Paare	juv	Beob.
Brand-Erb.	Neuhausen und Seiffen	2	?	Ihle
Freiberg	Freiberg	1	3	Wer
Annaberg	Annaberg	1	?	C.Feh
Zschopau	Kreisgebiet	mind. 4	2/2/1/0	Ung
Flöha	Augustsburg und Mörbitz	3	?	Sae, Stö
KMStad	Stadtgebiet	7-10	2/2/3/3/?	J.Frö, Sae
KMStad-Land	Grüna	2	3/?	J.Frö
	Burkhardttsdorf und Kemtau	2	?	J.Frö

Stollberg	Thalheim	1	4	J.Frö
Glauchau	Niederlungwitz	1	4	Wieg
Aue	Zschorlau	1	?	R.Mö
Plauen	Stadt	2	4/0	Schub.

242. Waldohreule Asio otus

Leipzig: Wenige Brutangaben: Bei Lucka 21.5. 4 juv. (Tre);  
Schönau Park 26.5. 2 juv. (Hey). Eine Kontrolle der Winter-  
rastplätze ergab (röm. Zahlen entsprechen den Monatsdekaden):

	Januar		Februar	
Park Rötha	II 12 Fö	I 8 Fö,	II 8 Fö	
	II 15 Rosenkranz			
	III 24 Weidner,Wb			
Hafen Leipzig	III 8 Hilgers	I 6 Hilgers		
Prendel-Allee/ Leipzig	III 5 Stelzner (1.12.	7 Grö)		
Knauthain	II 16 Hey	I 10 Zö		
S-Friedhof Lpz.	I 8 Erd	I 20 Vogel, II 20 Wg III 22 Wg		
Eythra		II 8 Büttner		
Schkeuditz	I 13 Wb	I 11 Wb,	II 8 Prochno	
Bienitz		II 40 JS		
Dahlen Hospitalhütte	III 20 Lö			

In Böhlitz-Ehrenberg wurden keine Eulen angetroffen! An dieser  
Stelle hielten sich Ende November 15 und Anfang Dezember 18  
auf (JS). Sicher gibt es noch eine Reihe weiterer Über-  
winterungsplätze.

KMStadt: 1968 war ein schlechtes Eulenjahr. Wohl infolge  
Nahrungsmangel starben Mitte Mai in einigen Nestern die  
Jungen (siehe nachfolgende Tabelle):

Kreis	Ort	Paare	Eier	juv.	Beob.
Marienberg	Ansprung	1	5	keine	T.Löschner
KMStadt-Land	Burkhardtsdorf	2	6/6	juv tot	Kraj.
Stollberg	Adorf	1	4	3	Kraj.
Aue	Zschorlau	1	?	?	R.Mö
Glauchau	Ebersbacher Wald	1	?	2	Wieg

<u>Kreis</u>	<u>Ort</u>	<u>Paare</u>	<u>Eier</u>	<u>juv.</u>	<u>Beob.</u>
Oelsnitz	Schönbrunn	1	?	2	Schub
Plauen	Neundorf	1	?	4	Schub

An einem Schlafplatz am Kuhberg bei Netzschkau (Krs. Reichenbach) zählte Cz am 5.2. 20-25 Ex.

243. Sumpfhöhreule - Asio flammeus

Leipzig: Drei Beobachtungen, davon liegt die Herbstfeststellung auffallend zeitig!

14.1. Witznitz 2 Fö, 31.3. Kulkwitz 1 Do.

Im Beobachtungsbericht Eschefelder Teichgebiet 1968 wird eine Beobachtung Salzmann's für den 25.8. aufgeführt.

244. Rauhfußkauz - Aegolius funereus

KMStad: Die im Actitis 5 veröffentlichte Zusammenstellung, die bis zum Jahre 1970 reicht, kann um folgende Angaben aus dem Jahre 1968 und 1967 ergänzt werden. Alle weiteren Ergänzungen (1969-71) werden im nächsten Jahresbericht zusammengefaßt.

Krs. Marienberg: Bad Einsiedel/Seiffen (750-800 m NN) 1967 2 ständig besetzte Rufplätze, 1968 ebenda nur 1 Rufplatz ständig besetzt Ihle (Fundort Nr. 1)

Krs. Klingenthal: Gr. Kranichsee 9.5. 1 ad 2 ♂♂ Balzruf  
Krei (Nr. 20)

Krs. Auerbach: Rev. Schnarrtanne 1968 eine Brut Cz (Nr.31).

245. Nachtschwalbe - Caprimulgus europaeus

Leipzig: Wieder für die bekannten Brutgebiete in der Dübener und Dahleener Heide angegeben:

Rothes Haus - Wöllnau 4 balzend G, Wildenhainer Bruch G, Forst Pflückuff mind. 3 balzend Tu u.a., Dahlen 2 Paare Lö, Gug und Ochsenaal 1 balzt Kop, Tresenwald 1 Paar (Ii).

KMStad: Von Mitte September bis 7.10. hielt sich ein Ex. dieser Art in einem Hausgarten in Wittgendorf/KMStad auf. Der Hauseigentümer gab an, den Vogel bereits im Vorjahr beobachtet zu haben, z.T. auf dem gleichen Sitzplatz. (He.Fri) u.a.

247. Mauersegler - Apus apus

KMStad: Hier ein Überblick über die Beobachtungen nach dem 31.7.:

Mo/Dek.	p	n	max.	nur KMStad (Rin/Sae)
Aug. I	14	335	90	
II	6	49	20	
III	3	8	4	
Sept. I	1 (9.9.)	1	1	

249. Eisvogel - Alcedo atthis

Leipzig: Der Bestand nimmt weiter zu! Bei Böhlen/Grimma waren lt. C.Feh 2 Paare. Brutversuche meldet Kö vom Horstsee und Hartsteich Grethen. Eine Brut fand am Dokorteeich statt (Kop, C.Feh). Kop stellte Eisvögel außerdem an den Stolpenteichen bei Heyda fest. Im Streitwald brütete er ebenfalls (Alletter, Kahl, Frie). Pö traf die Art regelmäßig im Mai im südlichen Auengebiet an. Weitere Bruten sind möglicherweise übersehen worden.

Herbstvorkommen:	n	p	max.
Juli III	1	1	1
Aug. I			
II	2	2	1
III	8	8	1
Sept. I	4	5	2
II	8	8	1
III	3	3	1
Okt. I	7	8	2
II	6	7	2
III	4	4	1
Nov. I	8	10	3
II	5	5	1
III	5	5	1
Dez. I	2	2	1
II	7	9	2
III	7	9	2

KMStadt: Von zwei Stellen werden Bruten gemeldet:

Jocketa/Plauen 1 BP, juv. 17.6. ausgeflogen CZ - Hohenfichte/  
Flöha 1 BP, zwei Bruten, Sa.

Von 12 Beobachtern wurden Zugdaten genannt, sie verteilen  
sich wie folgt auf die Monate: Januar 1 Ex. (2 Beob.)

März	1 Ex.	Oktober	19 Ex.
Juli	1 Ex.	November	9 Ex.
August	6 Ex.	Dezember	5 Ex.
September	9 Ex.		

#### 252. Wiedehopf - *Upupa epops*

Leipzig: Keine Hinweise auf Bruten. Alle Beobachtungsdaten fal-  
len in die Zugzeit, auch jene aus ehemaligen Brutgebieten.

13.4. bei Doberschütz 1 JS; 12. und 15.4. Forst Pflückuff 1  
Hüfig/Lt. Leh; 29.7. Wildenhainer Bruch 1 C.Feh; 6.8. Am  
Hotel Deutschland/Leipzig 1! Grö; 24.8. Wildenhainer Bruch  
1 Leh VIII/IX 1 Totfund bei Dahlen (J.Mühlbauer).

KMStadt: Fünf Zugdaten wie im Vorjahr, alles einzelne Ex.

14.4.	Claußnitz	W.Weil (am 16.4. ein Ex. tot ebenda)
15.4.	Lauterbach	H.Weil
18.4.	Venusberg	Gö
29.4.	Bad Brambach	Gon
14.8.	Niederwiesa	Sae
7.9.	Lauterbach	R.Schönherr

#### 254. Grauspecht - *Picus canus*

Leipzig: Brutzeitmeldungen von Frohburg (G), Pannaforst (Fö,  
G) und Hainholz/Elsterstausee (Fö). Siehe dazu G.Erdmann im  
Heft 4 S. 68/69.

Ferner 4 Winterbeobachtungen: 6.1. Markkleeberg 0,1 (Fö),  
27.10. Rötha 1 (Fö), 23.11. Böhlen 1,0 (Fö) und 30.11. bei  
Zwenkau Rufe (Fö).

KMStadt: Eine zusammenfassende Darstellung der Brutverbrei-  
tung im Bezirk erscheint demnächst von Hol.

255. Schwarzspecht - Dryocopus martius

Leipzig: Unsere Kenntnis der Verbreitung ist noch unvollständig. 1968 wurden bekannt:

- Kreis Torgau: Forst Pflückuff (Tu,Mar),  
südlich Lausa (13.6. 2 juv.) L8
- Kreis Eilenburg: Gruna Bruch (JS), Battaune (JS)
- Kreis Oschatz: Dahlen 2 Paare (Kel, L8),  
Schmannewitz 1 Paar (L8, Gug),  
Lausa 1 Paar (L8),  
Luppa 1 Paar (Hei)
- Kreis Wurzen: Thammenhain 1 Paar (Kop),  
Falkenhain 2 Paare (Kop),  
Dokortteich 1 Paar (Kop)  
Tresenwald 1 Paar (Li)
- Kreis Grimma: Glastener Forst (F8)
- Kreis Leipzig: Domholz 1 Paar (Wb)
- Kreis Altenburg: Pannaforst (F8, G)  
Lucka (15.5. 4 juv.) Tre,  
Kammerforst 8 km W Altenburg (23.5. 4 juv.)  
Karg

257. Mittelspecht - Dendrocopos medius

Leipzig: Siehe die Zusammenstellung von Erdmann im Heft 4.

Nachzutragen ist eine Beobachtung von F8, am 27.4. ein balzrufendes Stück im Glastener Forst.

Folgende Beobachtungen außerhalb der regelmäßigen Brutgebiete wurden 1968 bekannt: 14.-27.1. bei Rüdigsdorf (Frie), 14.2. Rohrbach 1 (Oeh) und 22.12. Deutsches Holz 1 (F8). Feldgehölz bei Lemsel 7.4. (Gr8).

KMStad: Die Suche nach dieser Art in den nördlichen Flußtalern des Bezirkes erscheint durch einen Nachtrag aus dem Jahre 1967 erfolversprechend:

22.2.67 Rochlitzer Bergwald 1 ♂ F. Müller FG Rochlitz

259. Kleinspecht - Dendrocopos minor

Leipzig: Brutplätze 1968: Park Torgau (Tu), Neumühlteich (Leh), Dahlen (L8), Falkenhain Birkholz (Kop), Stolpenteiche (Kop),

Dornreichenbach (Kop), Hohburg Kleiner Berg (Kop), Grechwitz (Ha), Bröhßen (Ha), Leutzscher Holz Leipzig (Wb), Domholz und Papitz (JS,Grö), südl. Aue (Erd) und Pannaforst (G), Wiederitzsch (Grö), Rosental/Leipzig (Opp, Grö), Schkeuditz (Gro), Kammerforst Altenburg (K1), Groitzsch/Borna (Krug)

261. Wendehals - Jynx torquilla

Leipzig: In den westlichen Teilen des Bezirkes als Brutvogel verschwunden. Zur Brutzeit von Li bei Kossen und Groitzsch/Eilenburg angetroffen. Im östlichen Teil noch erfreulich zahlreich: W.Kunze beringte in der Dübener Heide (Laußig, Pressel, Gruna, Wöllnau) 19 Bruten ( 1x2; 1x3; 1x4; 3x5; 1x6; 6x7; 3x8; 1x9; 3x10 juv.); Schulze bei Eilenburg 1 Brut mit 7 juv; Löscher in der Dahleener Heide (Dahlen, Schmannewitz, Lausa) 4 Bruten (1x2; 1x3; 2x6 juv.).

Im Kreis Altenburg Tre 8 juv. am 22.6. im Pannaforst.

KMStadt: Von dieser mehr und mehr schwindenden Art lagen 1968 nachstehend aufgeführte Brutnachweise und -verdachte vor:

Kreis	Ort	Paare	Beob.
Freiberg	Kleinwaltersdorf	1	Wer
	Weißborn ("Rosine")	2	Wer
Flöha	Augustsburg/Mörbitz	3	Sae
Werdau	Crimmitschau	1	P.Baumann
KMStadt	Altohemnitz Wasserwerkspark	1	D.Schiffner
Auerbach	Ellefeld/Falkenstein Balz	3	G.Schö
Oelsnitz	Adorf BV	1	H.Franke

267. Ohrenlerche - Eremophila alpestris

Leipzig: Im Berichtsjahr gelangen nur wenige Beobachtungen:

7.1.	Markkleeberg - Zöbiger	13 Do
	Knautnaundorf	17 Wei
13.1.	Knautnaundorf	5 Wei
14.1.	Mulde Bad Döben	4 G
9.5.	Hohenprießnitz	50 Fö
28./29.12.	Falkenhain	24 bzw. 25 Kop

KMStad: Vier Beobachtungen mit z.T. beachtlichen Stückzahlen:

7.1.	Claußnitz			3 Ex. W. Wei
	KMStad-Nord	1/35/14	Ex. Zug "	Sae
24.1.	Zwickau ca. 80	zus. m.	200-250	Feldlerchen Wink
24.11.	KMStad-Adelsberg-Euba			5 Ex. Neu, Rin, Sae

268. Heidelerche - Lullula arborea

Leipzig: Zur Brutzeit nur in der Dübener Heide (Forst Pflückuff Tu), dem Randgebiet der Dahleener Heide (Thammenhain und 2 weitere Stellen Kop), und im Kammerforst/Altenburg (Ki).  
F8 traf 1 Stück noch am 28.12. im Park Machern an.

Zugübersicht:

Mo/Dek.	n	p	max.	Mo/Dek.	n	p	max.
März	I			Sept.	I		
	II	4	8	4		II	
	III	2	2	1		III	3 148 100
					Okt.	I	6 297 174
						II	4 190 100
						III	

KMStad: R. Wenzel meldet vom 19.5. aus dem Rumpfwald bei Glauchau ein sing. Ex. aus junger Kultur, Brutverdacht.  
Zusammenfassung der Meldungen vom Herbstzug (Krei, E.M8, Rin, G.Schö, Tho), die Zeit vom 5.-26.10. umfassend:

Mo/Dek.	p	n	max.
Okt.	I	8	104 25
	II	11	250 200
	III	1	25 25

269. Haubenlerche - Galerida cristata

KMStad: Brutpaarangaben liegen aus folgenden Orten vor:

Plauen	10-12 BP	K. Schubert
KMStad	1-2 BP	Sae
Crimmitschau	mind. 1-2 BP	P. Baumann

Zwei Beobachtungen betreffen durchziehende Ex.:

23.3.	Rempesgrün Krs. Auerbach	2 Ex. Tho
20.10.	Falkenstein/V.	1 Ex. G. Dressel

271. Uferschwalbe - Riparia riparia

Leipzig: Nur für wenige Kolonien liegen Angaben vor: Zwetha (Mar), Schildau (Löh), Klitzschen 18 Röhren besetzt (Leh), Döbern nur 5 ad (Leh), Kobershain 40-50 Paare (Kop), Markkleeberg-Großstädteln 40 Röhren, meist befliegen (Fö), Machern (Grö), Windischleuba (Grö). Do meldet von Groitzsch-Eilenburg keine Brut! Schulze beringte jedoch südlich Eilenburg 32 juv. Li meldet für Groitzsch 30 befliegene Röhren, für Lübschütz weitere 100 befliegene Röhren und stellte an der Mulde bei Kollau wenige Paare, sowie nahe Püchau 100 befliegene Röhren fest. An der nördlichen Mulde bei Laußig beringte Hey 60 ad. und juv.

Am Elsterflutbecken Leipzig in der 2. Maidekade lebhafter Durchzug, z.B. am 18.5. 580 (Grö).

KMStadt: Neun Beobachter (Di, Hol, Ern, M. Hum, J. Frö, Lie, E. MÖ, Sae, Tho) berichten von Durchzügler.

Frühjahr: 29.4.-11.6., Herbst nur eine Beobachtung von 5 Ex. (31.8.).

Mo/Dek.	p	n	max.
Apr. III	1	2	2
MaI II	1	350	350 (Holu 16.5. Geyersche T.)
III	5	30	10
Juni I	1	1	1
II	1	1	1

276. Schafstelze - Motacilla flav~~a~~

KMStadt: Über Brutverbreitung und Siedlungsdichte dieser Art wissen wir noch sehr wenig. In einem Gebiet von 12 km<sup>2</sup> (Clausnitz, Röllingshain, Altmittweida) NE KMStadt stellte W. Wei 8 Paare fest, vor allem in Leguminosen-Gemenge. Weitere Brutmeldungen aus dem Gebiet der oberen vertikalen Verbreitungsgrenze:

Kreis	Ort	Paare	Beob.
Flöha	Niederwiesa/Ebersdorf	1	Sa
KMStadt-Land	Wittgensdorf	1	Sa
	Auerswalde	1	Sa
	Limbacher Teiche	1-2	Sae

Kreis	Ort	Paare	Beob.
KMStadt-Stadt	Kläranlage	2	Lom, Sa, Sae
Auerbach	Pechtelsgrün/Lengenfeld BV	1	Tho
Durchzug vor allem im Herbst (28.8.-6.10.), siehe Tabelle:			
Mo/Dek.	p	n	max.
Aug.	III	4	72
Sept.	I	9	16
	II	4	16
	III		
Okt.	I	7	16

276. a Nordische Wiesenstelze - Motacilla flava thunbergi

Leipzig: Nur Wei beobachtete am 19.5. am Elsterstausee 1 Ex.

KMStadt: 16.5. Liegewiese am Geyerschen Teich 1 Hol

278. Gebirgsstelze - Motacilla cinerea

Leipzig: Nur an drei Lokalitäten zur Brutzeit angetroffen: Bleckmühlteich Trossin (Tu), Hohburg (Kop) und Döben (C.Feh). Trotz eindeutigen Rückgang des Bestandes bestehen sicher noch weitere Brutplätze, besonders in den Kreisen Geithain und Döbeln.

280. Spornpieper - Anthus novaeseelandiae richardi

KMStadt: Ein Ex. bei Markersdorf/Chtzl. am 19.10. W.Weil

Siehe auch "Beitrag z.V." 17, S. 167!

281. Brachpieper - Anthus campestris

Leipzig: Nur für 5 Gebiete liegen Beobachtungsnotizen aus der Brutzeit vor: Böhlen (Fö), Kulkwitz Grube 2 Paare (Do), Dölitz (Erd), Tongrube Liebertwolkwitz (Erd) und Göbschelwitz (Erd).

KMStadt: Vier Zugdaten, davon nur eine Frühjahrsfeststellung:

21.4. Reumtengrün, Krs. Auerbach 3 Ex. S. Hum

20.8. Altmittweida, Krs. Hainichen 2 kl. Trupps F.Uhlich,  
W.Weil

- 23.8. Claußnitz, Krs. KMStadt-Land etwa 20 Ex. H. End, W. Wei  
 25.8. Claußnitz, Krs. KMStadt-Land 3-5 Ex. W. Wei

284. Wiesenpieper - Anthus pratensis

Leipzig: Brütet die Art noch in den Kreisen Borna und Altenburg?  
 Brutplätze 1968: Bockwitz (Leh), Schildau Neumühlteich 1 P.  
 (Kop), Falkenhain 2 P. (Kop), Börlin 1 P. (Kop), Heyda 1 P.  
 (Kop), Dornreichenbach 2 P. (Kop), Göttwitzsee 2 P. (Erd),  
 Horstsee 1 P. (Erd) und bei Ölzschau 1 P. (Oeh).

Übersicht des Durchzuges:

Mo/Dek.	n	p	max.	Mo/Dek.	n	p	max.
Febr. I	1	1	1	Sept. I			
II	2	6	4	II			
III				III	4	27	15
März I	3	15	9	Okt. I	4	254	200
II	3	23	9	II	8	138	60
III	8	79	50	III	10	128	59
Apr. I	4	68	25	Nov. I	6	74	45
II	3	19	15	II	3	6	3
III	3	8	5	III	3	41	23
				Dez. I			
				II			
				III	4	86	81

285. Rotkehlpieper - Anthus cervinus

Leipzig: Am 4.5. konnte 1 Ex. an den Eschefelder Teichen beobachtet werden (Gerst, Hoy).

286. Wasserpieper - Anthus spinoletta

Leipzig: Regelmäßig beobachtet, besonders am Elsterstausee, Speicherb. Wind. und am Elsterflutbett.

Übersicht:

Mo/Dek.	n	p	max.	Mo/Dek.	n	p	max.
Jan. I	4	9	4	Sept. I			
II	3	3	1	II			
III	2	4	3	III	1	1	1
Febr. I	1	3	3	Okt. I	1	2	2
II	4	12	9	II	6	8	2

Mo/Dek.	n	p	max.	Mo/Dek.	n	p	max.	
Febr. III	2	2	1	Okt. III	3	10	5	
März I	2	2	1	Nov. I	9	22	10	
	II	3	10	7	II	6	7	2
	III	3	7	3	III	3	8	4
Apr. I				Bez. I	3	5	2	
	II	1	1	1	II	3	6	3
					III	4	16	9

Ferner traf Grö am 4.5. 1 Ex. im Brutkleid bei Dölitz an.

290. Raubwürger - *Lanius excubitor*

Leipzig: Auch bei dieser Art ist die Brutverbreitung nur lückenhaft bekannt. Brutplätze 1968: Schmannewitz/Dahlen (L8), Stolpen/Heyda (Kop), Börlin (Kop), Frauwalde (Kop), Falkenhain 2 Paare (Kop), Burkartshain (Kop), Püchau (Li), Tresenwald (Li), Höfgen (Ha), Haubitz (Ha), Grechwitz (C.Feh), Wiederitzsch (Wb), Treben (G), Eschefelder Teiche (F8,G u.a.) und Böhlen (P8), Gotha Fasanerie (Li), Drescha 2 km W Altenburg (5 juv. beringt)Tre, Schafteich Windisch-Leuba 6 und 7 juv. (Tre), Melpitz/Torgau (Grö).

Übersicht über das Wintervorkommen:

Mo/Dek.	n	p	max.	Mo/Dek.	n	p	max.	
Jan. I	3	3	1	Aug. I	1	1	1	
	II	6	6	1	II	1	1	1
	III	5	6	2	III	1	1	1
Febr. I	4	7	3	Sept. I	2	2	1	
	II	7	7	1	II	3	4	2
	III	6	7	2	III	3	3	1
März I	10	14	3	Okt. I	6	8	3	
	II	6	6	1	II	7	7	1
	III	1	1	1	III	4	4	1
Apr. I	4	5	2	Nov. I	11	15	5	
	II	1	1	1	II	7	10	4
	III	1	1	1	III	5	5	1
				Dez. I	4	4	1	
					II	5	5	1
					III	6	7	2

KMStadt: Siehe Zusammenstellung von Holupirek in "Veröff.d. Mus.f.Nat. KMStadt" 61

291. Seidenschwanz - Bombycilla garrulus

Leipzig: Im Jahre 1968 nur geringer Einfall.

Winter 1967/68:	1.1.	Elsterflutbett	3 Erd
	7./8.2.	Falkenhain	1 bez.2 Kop
	2.3.	Gruna Fähre	1 G
	9.3.	Gruna Fähre	2 Fö
Winter 1968/69:	17.11.	Torgau	11 Tu
	28.11.	Park Torgau	5 Leh
	3.12.	Park Torgau	16 Leh
	15.12.	Park Torgau	11 Leh

KMStadt: Folgende Feststellungen wurden gemeldet:

20.1.	Ellefeld/V.	36 Ex. Tho
29.1.	Auerbach/V.	1 Ex. S.Hum
6.-9.2.	KMStadt-Adelsberg	6 M.Werner
26.3.	KMStadt-Glösa	2 Ex. Sa
	Bad Brambach	2 Ex. Gon
27.-29.3.	KMStadt-Glösa	2 Ex. Sa
31.3.-		
1.4.	südl. Gelenau	15 Ex. GÖ
20.-21.4.	Claußnitz	1 Ex. He.Fri
23.11.	bei KMStadt	20 Ex. P.Beyer

292. Wasseramsel - Cinclus cinclus aquaticus

KMStadt: Zusammenfassende Übersicht demnächst von Cz zu erwarten.

296. Heckenbraunelle - Prunella modularis

Leipzig: Zur Brutzeit angetroffen: Belgerner Heide (G.Feh), Schildau (G.Feh), Forst Pflückuff (Tu), Brüche Dübener Heide (Tu), Wermsdorfer Forst (C.Feh), Döben (C.Feh), Glastener Forst (Fö), Naunhofer Wald (Fö), Falkenhain und Umgebung (Kop), südliche Aue (Fö,Grö), Pannaforst (Fö), Lemsel (Grö),

Schkeuditz (Grö), Burgau (Grö), Lucka (Tre), Kammerforst/  
Altenburg N (K1), Groitzsch/Borna (K1)Dahlen (L8), Schöna  
(L8). Herbstzug und Winterorkommen sind durch Sichtbeob-  
achtungen nur zu einem sehr geringen Teil nachweisbar.  
Aussagekräftiger sind die Ergebnisse der Beringer: Okt.-Nov.  
82 Ex. (Tre,Opp,Gro), L8 fing am 28.12. noch 16 Ex., auch  
Januarden sind nicht selten (9 gefangen).

298. Rohrschwirl - Locustella luscinioides

Leipzig: G verhörte am 27.4. 1 Stück am Nobitzer Teich/  
Haselbach.

299. Schlagschwirl - Locustella fluviatilis

Leipzig: Vom 6.5. bis 27.5. hielt sich ein singendes Stück  
im Park Lützschena auf (JS,Wb).

KMStad: Rin stellte 1 durchziehendes Ex. am 8.9. in einem  
Saubohnenschlag bei KMStad-Adelsberg fest.

300. Feldschwirl - Locustella naevia

Leipzig: Für folgende Gebiete wurden Feststellungen aus der  
Brutzeit bekannt: Dübener Heide (Brüche, Wöllnau u.a. G),  
Großteich Torgau (Tu,Leh), Benkenteich/Forst Pflückuff (Leh),  
Dahlen Wiesengrund (Kel), Tresenwald 2-3 (L1), Elsterstausee,  
Speicherb. Wind., Markkleeberg-W und Cröbern (Fö), Lauer (Grö),  
Schkeuditz (Grö,Gro).

KMStad: Auch 1968 gab es wieder mehrere Brutzeitfeststellungen,  
die sicher nicht nur späte Durchzügler betreffen. Die Suche  
nach Nestern ist sehr wichtig!

Kreis	Ort	Beobachtungen		Beob.
Freiberg	Kleinwaltersdorf	10. und 13.7.	2 ♂♂	Her, Wer
Flöha	Oederan	13.6.	1 ♂	Dr. Hey
	südl. Flöha	26.5.	1 ♂	Sae
Annaberg	SE-Hang Pöhlberg (680 m NN)	16.6. - 6.8.	2 Ex.	Di, C. Feh
		4.8.	1 flügg. juv.	Di

Kreis	Ort	Beobachtungen	Beob.
	Buchholzer Wald	6.5.-20.6.	1 ♂ Di
	E.Hang Bärenstein	7.7.	1 ♂ Di
KMStad-Land	Grünaer Wald	8.5.-Juli	3 ♂♂ J.Frö
	Auerswalder Flur	Mai-Juli	1 ♂ Sa
Stollberg	Umgebung der Stadt	27.5.	1 ♂ W.Richter

Die Angabe ♂ bezieht sich auf Gesang!

#### 304. Schilfrohrsänger - Acrocephalus schoenebaenus

Leipzig: Aus dem Bezirk liegen folgende Brutzeitdaten vor:  
 Eschefelder Teiche 2 singende Stücke (Fö), Elsterstausee 1  
 singend (Fö), außerdem Göttwitzsee 1 singend (Ha, Erd, u. a.),  
 Kulkwitz Feidlachen 1 singend (Grö), s. auch Zugtabelle.

#### 305. Seggenrohrsänger - Acrocephalus paludicola

Leipzig: Am 29.8. konnte Ki 2 an den Eschefelder Teichen  
 fangen und beringen.

#### 308. Teichrohrsänger - Acrocephalus scirpaceus

KMStad: Singende Ex. wurden gemeldet:

23.5.	Großt. Großhartm.	1	(Di, Holu)
26.5.	zwischen Annaberg-B. und Schlettau	1	(C. Feh)
1.6.	Großt. Großhartm.	2	(Lie, Wer)
8.6.	Großt. Großhartm.	1	(Lie, Wer)
15.6.	Unterlauterbach Schafteich	2	(Ern)
25.6.	hier noch 1 Ex. Ern		
24.7.	Großt. Großhartm.	1	(Ihle)

#### 309. Drosselrohrsänger - Acrocephalus arundinaceus

KMStad: Singende Ex. wurden gemeldet:

6.5.	Großt. Großhartm.	1	Lie
4.6.	Auerbach Göltzschufer	2	E.Mö, Tho
4.8.	Limbacher Teiche	1	J.Frö

Übersicht des Rohrsängerzuges im Bezirk Leipzig nach den  
 Fangergebnissen der Beringer Tre, Do, Opp, Hey, Lö, Karg, Oeler,  
 Gro, Zscho und besonders Ki:

Monatsdekade	Schilf-	Teich-	Sumpf-Rohrsänger
Apr. II	1		
III	13	1	
Mai I	1	1	1
II	2	6	
III			
Juni I			
II		8	3
III		11	1
Juli I		18	9
II	2	26	2
III	11	40	19
Aug. I	5	32	3
II	19	62	15
III	80	132	7
Sept. I	2	10	3
II		8	
III	1	5	1
Okt. I		11	
II		1	

320. Sperbergrasmücke - Sylvia nisoria

Leipzig: An den Rohrbacher Teichen stellte sie Oeh an 3 Stellen fest. Tu fand sie wieder am Großteich Torgau. Am 9.7. sah LÖ 2 bei Schmannewitz, bei Luppä (Kleiner Kuhberg) beringte er 6 juv. am 15.6. Erd beobachtete sie am 13.6. an den Leipziger Kläranlagen. Gro stellte 3 Bruten bei Schkeuditz fest.

331. Wintergoldhähnchen - Regulus regulus

Leipzig: Im Glastener Forst traf Fö am 7.7. auf 1 Altvogel mit 2 flüggen Jungen. Weiterhin wurde die Art singend bzw. zur Brutzeit beobachtet durch Kop bei Weltewitz, Falkenhain, Hohburger Berge, Reichenbacher Berg, G bzw. Fö im Pannaforst und Kammerforst, Naunhofer Forst (Grö). Es ist anzunehmen, daß in den Fichtenrevieren in den Kreisen Grimma und Geithain noch weitere Brutvorkommen zu finden sind.

Durchzug:

Mo/Dek.	n	p	max.	Mo/Dek.	n	p	max.
Jan. I	1	7	7	Sept. I	2	4	3
II				II	1	1	1
III	1	2	2	III	3	5	3
Febr. I	1	1	1	Okt. I	1	1	1
II	1	1	1	II	4	20	8
III	1	1	1	III	2	5	3
März I	4	12	6	Nov. I	2	2	1
II				II	3	8	5
III	5	21	7	III	3	7	5
Apr. I	3	5	3	Dez. I			
II	4	9	3	II	6	24	10
III				III			

332. Sommergoldhähnchen - Regulus ignicapillus

Leipzig: Auch diese Art kann im Bezirk Leipzig als Brutvogel vorkommen. Allerdings fehlen sichere Hinweise!  
1968 wurde die Art recht oft gesehen:

27.3.	Rosental/Leipzig	1,0	Grö
31.3.	Fleißestausee	1	Fö
6.4.	Kammerforst/Altenburg	0,1	Ki
7.4.	Pahnaforst	1	singend G
14.4.	Pahnaforst	1	singend G
15.4.	Dahlen N	1,0	Lö
19.4.	Eschefelder Teiche	1	Pontius
19.4.	Wiesenmühle/Altenburg	1	Karg
4.5.	Kirchenteich Wernsdorf	1	singend C.Feh
23.8.	Leipzig 705	1	Wg
28.8.	Lödla/Altenburg	1	Karg
1.9.	Colditzer Forst	1	Fö
2.9.	Prödel	1	Fö
15.9.	Lützschena	2	Erd
22.9.	Colditzer Forst	1	Fö
	Pahnaforst	1	G
5.10.	Speicherb.Wind.	1	G
11.10.	Lödla/Altenburg	0,2	Oeler
15.10.	Lucka	1,0	Tre

334. Trauerschnäpper - Ficedula hypoleuca

Leipzig: L8 beringte im Dahlemer Raum in der Zeit vom 30.5.-23.6. 129 Bruten (5x2; 12x3; 15x4; 23x5; 41x6; 30x7; 3x8 juv.). Eine erstaunliche Brutdichte. Im westlichen Teil des Bezirkes brütet die Art nur noch in mäßiger Anzahl.

338. Braunkehlchen - Saxicola rubetra

Leipzig: Nur von wenigen Stellen gemeldet: Neumühlteich Schildau (Kop), Großteich Torgau (Leh,Mar,Tu,Richter), Dahlen (Kel), Kollau (Li), Papitz (Wb) und Eschefeld (F8).

342. Nachtigall - Luscinia megarhynchos

Leipzig: Außerhalb der bekannten Brutgebiete wurden 1968 Nachtigallen notiert: Im Dahlemer Gebiet an 6 verschiedenen Stellen (Kal,L8), am Stolpenteich 1 singendes Ex. vom 3.-20.5. (Kop), an den Rohrbacher Teichen 3 (Oeh), Borsdorf (Stro), Belgern (G.Feh), Seegeritz (Gr8), Machern (Gr8), Melpitz (Gr8).

KMStadt: Zwei singende Ex. wurden 1968 gemeldet:

26.4.	KMStadt, Kappler Hang	1 R. und B. Lehmann
1.6.	Burkhardtsdorf	1 J.Fr8
4.8.	Schimmelteiche Limbach-O.	1 J.Fr8 (DZ)

344. Blaukehlchen - Luscinia svecica cyaneoula

Leipzig: Wenigen Frühjahrsdaten aus dem Zeitraum vom 24.3. bis 5.5. (Oeh,F8,G,Frie,Wei), maximal 5 am 12.4. in Eschefeld (G), stehen 12 Herbstdaten über 16 Ex. gegenüber, sie reichen vom 14.8.-26.9. (Do,F8,Ki,Karg,Gro). Bei den Herbstbeobachtungen handelt es sich meist um Jungvögel.

KMStadt: Durchziehende Ex. wurden gemeldet:

10.8.	KMStadt-Kläranlage	1 Sae
5.9.	Lauterbach, Kr. Marienberg	1 ♂ H.Weil
16.9.	Großteich Großhartm.	1 ♀ Kiek.

346. Steinschmätzer - Oenanthe oenanthe

Leipzig: Die Brutplätze liegen meist in zwei Biotopgruppen:  
1. Auf Kiefernkahlschlägen, z.B. 1968 Wildenhainer Bruch (Tu),  
Forst Pflückuff (Tu), und 2. Schuttplätze, Grubengelände, z.B.  
Steinbruch Collmen-Böhlitz 3 P. (Joiko), Kulkwitz 11 P. (Do),  
Eutritzsch 1 P. (Stro), Dornreichenbach (Kop), Tongrube  
Liebertwolkwitz (Erd), Sandgrube Göbschelwitz 2 P. (Erd),  
Dögnitz (Li) und Ölzschau (Oeh). Wir sind sehr an der Meldung  
weiterer Brutplätze interessiert!

KMStadt: Die in Heft 5, S. 59 unter Misteldrossel angegebenen  
Fakten beziehen sich auf den Steinschmätzer (Bez. KMStadt)!!  
1968 wurden von dieser Art nur wenige Paare gemeldet:  
Halden nördlich Freiberg 3-4 (Wer), Halde Frohnau Krs. Annaberg  
1 (C.Feh), Lauta Krs. Marienberg 1, mind. 3 juv. (S. Biedermann),  
Riedelsfels Breitenbrunn Krs. Schwarzenberg vermutl. 1 (C.Feh),  
Schuttplatz Auerbach/Vogtl. vermutl. 1 (Hum), KMStadt-Stadt  
1 (Sae). Durchzug wurde bis auf eine Beobachtung vom 15.9.  
(Helb) nur im Frühjahr vom 27.3.-11.5. registriert.

358. Misteldrossel - Turdus viscivorus

Leipzig: Zur Brutzeit in der Dübener- (G, Tu), Dahleiner Heide  
(Kop) und dem Glastener Forst (Fö) angetroffen. Am 14.1. sah  
G 2 an der Mulde bei Gruna. Winterdaten sind bei uns nicht  
häufig.

359. Wacholderdrossel - Turdus pilaris

Leipzig: Brutvorkommen wurden bekannt aus den Kreisen

Grimma: Grechwitz/Bröhsen, Pöhnitz und Naundorf  
Ha, C.Feh, Erd, H. Wolf

Altenburg: Im Gebiet Lödla, Altenburg,  
Monstaber Kippe beringte Karg 55 juv.  
Im Raum Windisch-Leuba, Poeschwitz,  
Gardschütz, Mockern, Lütischütz,  
Drescha Trenkmann 60 juv. von 13 Brutten

Borna: Groitzsch (Ki).

Durchzug:

Mo/Dek.	n	p	max.	Mo/Dek.	n	p	max.
Jan. I	6	36	20	Sept. I	2	6	5
II	8	175	150	II	2	5	4
III	1	7	7	III			
Febr. I	1	1	1	Okt. I	5	60	50
II	3	107	48	II	2	8	5
III	4	20	16	III	9	181	100
März I	4	6	2	Nov. I	11	492	150
II	3	17	15	II	6	67	38
III	5	10	5	III	5	186	35
Apr. I	3	14	9	Dez. I	2	77	76
II	2	2	1	II	5	126	80
III				III	12	73	19

364. Rotdrossel - Turdus musicus (illiaous)

Leipzig: Übersicht über Zug:

Mo/Dek.	n	p	max.	Mo/Dek.	n	p	max.
Jan. I				Sept. I			
II	1	1	1	II	1	4	4
III				III			
Febr. I				Okt. I	5	47	20
II				II	11	150	30
III				III	13	353	90
März I				Nov. I	9	129	38
II	6	326	200	II	5	10	5
III	14	199	55	III	4	16	7
Apr. I	2	5	4	Dez. I	1	1	1
II	1	1	1	II			
III	1	2	2	III			

Die Rotdrossel ist im Bezirk Leipzig Durchzügler. Schulze teilt mit, er habe bereits am 21.8. 1 Ex. bei Hainichen/Eilenburg und am 2.9. bei Eilenburg 4 Ex. gefangen.

KMStad: Am 7.1. sah V. Geyer ca. 5 Ex. an einer Winterfütterung.

Übersicht über den Durchzug der Art: (F: 21.3.-14.4./  
H: 5.10.-20.11.)

Mo/Dek.		p	n	max.	
MRrz	III	11	108	25	
Apr.	I	3	13	6	
	II	4	18	11	Beobachter: Ern, Ihle,
Okt.	I	12	227	70	E.Mö, Lie, Lom, G. Schö,
	II	10	197	70	W. Richter, Rin, Sae, Wer
	III	5	31	10	
Nov.	I	1	5	5	
	II	1	2	2	

366. Ringdrossel - Turdus torquatus

Leipzig: 4 Nachweise, von denen einer aus dem Rahmen fällt:  
 18.1. Zoo Leipzig 1 Be. Die weiteren Meldungen liegen in den  
 bekannten Zugzeiten: 13.4. Krenitz 1 F8 und 6.10. Grube  
 Witznitz 1 F8, 11.11. Lödla/Altenburg 1 (Oeler).

KMStad: 28.4. zwischen Burkhardtsdorf und Meinersdorf  
 1 ♂. D. Schiffner

16.10. Helsdorf b. Burgstädt 1 Ex. H. End, Joh. Richter

21.10. Oederan 4-5 Ex. Dr. Hey

371. Beutelmeise - Remiz pendulinus

Leipzig: Nur am Großteich Torgau fanden Bruten statt. Es wurden  
 3 Nester gefunden (Mar, Richter, Tu).

Durchzugsdaten:

18.4.	Eschefelder Teiche	1 Olz
28.4.	Frödeler Lachen	1 F8
27.7.	Großzüssen	5 juv. F8
3.8.	Eschefelder Teiche	1 G
10.8.	Speicherb. Wind.	1 G
28.9.	Eschefelder Teiche	2 F8
5.10.	Großteich Torgau	Rufe F8
6.10.	Eschefelder Teiche	2 Stre.

KMStad: 28.9. Großteich Großhartm. ca. 5-10 Ex. Ihle, Lie

5.10. Großteich Großhartm. ca. 20 Ex. Lie

6.10. KMStad Kläranlage 9 (oder 10?) Ex. Sae.

374. Weidenmeise - Parus montanus

Leipzig: Wie im Vorjahr mehrfach beobachtet: 12.4. Eschefelder, Teiche 1 (G,Ki,Ger), 29.6. Grube Witznitz 1 F8, 1. und 22.9. Colditzer Forst 1 F8, 5., 19.10. und 2.11. 1 bzw. 2 am Großteich Torgau (F8) und 30.11. Zwenkauer Lachen 1 F8.

Aus dem Rahmen fällt die Junibeobachtung von F8.

Die Art erscheint bei uns als durchstreicher Gast ziemlich regelmäßig.

383. Grauammer - Emberiza calandra

KMStadt: Einige vertikal bemerkenswerte Brutzeitbeobachtungen:

- 23.5. zwischen Breitenbrunn und Rittergrün  
(780 m über NN) 1 ♂ singend C.Feh - kein Brutverdacht.  
16.5. Lautengrund/Marienberg 1 Ex. singend Za  
24.7. Großteich Großhartm. 2 Ex. singend Ihle.

387. Gartenammer - Emberiza hortulana

Leipzig: Der Rückgang des Brutbestandes ist weiter deutlich bemerkbar, deshalb ist auf diese Art besonders zu achten. Für 1968 wurden folgende Brutzeitbeobachtungen bekannt: Belgerner Heide (G,Feh), Teiche Klitzschen (Tu), Thammenhain 3 juv. (Kop), Heyda (Kop), Falkenhain (Kop), Haubitz, Böhlen, Schkorditz, Golzern, Deditz, Bröhsen, Kaditzsch (Ha), Kleinzössen (F8), südl. Zwenkau (F8), Litzschens-Radefeld (Wb) und Oberholz (Op), Plagwitz/Bilenburg (Li,Gr8).

KMStadt: 21.4. Cämmerwalde 1 ♂ singend, später nicht mehr, Ihle. Za verhörte am 5.5. und 6.6. je 1 Ex. bei Marienberg. Noch am 14.7. sang 1 Ex. bei Cranzahl, Di.

Die Vorkommen im Kreis Rochlitz wurden 1968 nicht kontrolliert, W.Weil.

396. Schneeammer - Plectrophenax nivalis

Leipzig: Auffallend viele Nachweise!

- |      |                      |     |     |
|------|----------------------|-----|-----|
| 3.1. | Falkenhain           | 1,0 | Kop |
| 6.1. | Lauer                | 1   | F8  |
| 7.1. | Markkleeberg-Zöbiger | 3   | Do  |

13.1.	Feld Lauer	3 Wei
24.2.	Knautnaundorf	8 F8
9.11.	Elsterstausee	1 G
27.12.	SO Plei8estausee	3 F8.

KMStadt: 17.2. Wei8enborn-Lichtenberg mind. 1 Ex. K. Schmotz  
 18.2. ziehen bei Gro8schirma/Freiberg ca. 40 Ex.  
 von 3 nach NE, Her.

402. Bergfink - *Fringilla montifringilla*

Leipzig: Übersicht 1968:

Mo/Dek.	n	p	max.	Mo/Dek.	n	p	max.
Jan. I	6	39	20	Sept. I			
II	4	8	3	II	1	1	1
III	5	64	60	III	2	12	9
Febr. I	4	24	20	Okt. I	7	129	100
II	7	147	64	II	4	22	8
III	2	4	3	III	2	6	5
März I	3	11	7	Nov. I	2	12	10
II	6	43	30	II			
III	18	344	115	III	2	65	60
Apr. I	3	4	2	Dez. I			
II	2	31	30	II	3	53	32
III				III	4	303	300

KMStadt: Neben wenigen Winterdaten haben sich die Zugzeiten klar ab:

F: 16.3.-17.4./H: 28.9.-3.11.

Übersicht über den Durchzug und gemeldete Wintervorkommen:

Mo/Dek.	p	n	max.
Jan. II	1	3	3
III	2	73	70
Febr. I	3	38	27
II	4	8	4
III	2	6	5
März II	2	11	10
III	7	942	500

Apr.	I	5	10168	10000 (alles F.m.?, S.Schl)
	II	4	215	120
Sept.	III	1	3	3
Okt.	I	4	266	250
	II	16	837	500
	III	1	15	15
Nov.	I	1	3	3
Dez.	I	2	2	1
	III	4	31	25

Beobachter: Ern, Lom, E, Mö, Römisch, Sa, Sae, S, Schl, G, Schö, Za.

#### 404. Girlitz - Serinus serinus

Leipzig: Im Winter nur 2 Beobachtungen: 21.12. Großstädteln  
1 Fö, 14.2. Leutzsch 1 Grö-

#### 407. Erlenzeisig - Carduelis spinus

Leipzig: Wieder gibt es einige Hinweise auf etwaige Bruten:  
2.5. Falkenhain 1 (Kop), 23.6. Imnitz 1 (Fö), 20.7. Krumm-  
lampertswalde Rufe (Kop) und 24.7. Dokorterteich Wermsdorf  
Familie mit juv? (Kop).

Übersicht:

Mo/Dek.	n	p	max.	Mo/Dek.	n	p	max.		
Jan.	I	3	14	10	Sept.	I	1	12	12
	II	2	115	75		II	2	15	10
	III	3	170	70		III	7	132	70
Febr.	I	5	232	110	Okt.	I	3	126	125
	II	8	104	20		II	6	75	25
	III	1	85	85		III	4	92	35
März	I	8	405	150	Nov.	I	6	307	165
	II	5	243	62		II	2	150	100
	III	3	28	20		III	6	195	50
April	I	1	9	9	Dez.	I	3	152	80
	II	1	1	1		II	4	45	25
	III					III	4	79	40

#### 408. Birkenzeisig - Carduelis flammea

Leipzig: Nur Be meldet 2 bereits für den 27.9. aus dem Gebiet  
des Wildenhainer Bruches.

KMStadt: Nur vier Feststellungen aus den Zugzeiten:

29.3. Dorfchemnitz/Stollberg 1 ad ♂ S1

25.10. Klaffenbach, 4 aus N kommend, dav. 3 gefangen, Gü

3.11. Thalheim, Krs. Stollberg, 4 abfliegend nach NE, St  
Auerbach/V. am "Gründel" 15 - 20 Ex. E.Mö

410. Berghänfling - Carduelis flavirostris

Leipzig: Der Schlafplatz an der Leipziger Oper war wieder besetzt und wurde besonders durch G kontrolliert.

Übersicht:

Mo/Dek.	n	p	max.	Oper	Mo/Dek.	n	p	max.	Oper
Jan. I	8	92	40	325 G	Okt. I				
II	2	2	1	526 G	II				
III	2	8	4	737 G	III	3	40	26	22 G
Febr. I	1	14	14	754 G	Nov. I	2	10	6	83 Wg
II	2	100	60	883 G	II				185 G
III	2	67	60	1039 G	III	2	37	36	228 Erd
März I	3	21	200	1204 G	Dez. I				289 Grö
II	2	104	100	1348 G	II	1	9	9	453 G
III				424 G	III	4	112	100	733 G
Apr. I				17 G					

Die Zusammenstellung zeigt deutlich, wie wenig wir über die Nahrungsplätze der Art wissen.

KMStadt: Anfang Februar Freiberg 35 Ex. Schmi (Siehe auch Beitr.z.V." 14, S. 4571)

7.3.-19.3. Freiberg max. 50 Ex.

27.12. KMStadt 4 Ex. Rin/Sae

415. Fichtenkreuzschnabel - Loxia curvirostra

Leipzig: Auch 1968 wurde die Art in größerer Zahl gesehen:

11.2.	Markkleeberg-West	1 Fö
24.2.	Lauer	6 Fö
3.3.	Pahnaforst	6 Fö,G
23.3.	Imnitz/Zwenkau	1 Fö
20.6.	Markkleeberg	2 Wei
30.6.	Pahnaforst	2 Fö
13.7.	Haselbacher Teiche	1 Fö
14.7.	PleiBestausee	3 G
23.7.	Großteich Torgau	15 Tu
24.7.	Döben	8 C.Feh

11.8.	Zadlitzbruch	1 Wei
18.8.	Deutsches Holz	2 F8
	Dübener Heide	2 Be
28.8.	Leipzig	1 Erd
15.11.	Dahlen	3 Gug
17.11.	Pahnaforst	1 G

KMStad: Solange wir über die Brutverbreitung, Siedlungsdichte und Populationsdynamik im Erzgebirge nicht besser Bescheid wissen als zum gegenwärtigen Zeitpunkt, müssen wir jedem Hinweis auf Brut volle Beachtung schenken. 1968 lagen diesbezüglich folgende Meldungen vor:

27.3.	Breitenbrunn, Krs. Schwarzenberg	1 Ex.	
	ebenda am 9.4.	2 juv. Ex.	C.Feh
30.3./	Heinzewald Großolbersdorf Krs. Marienberg		
13.4.	1 Ex.		Za
16.3.	Pöhlberg Krs. Annaberg	1-2 Ex.	Di
31.3.	Beerheide/Breitenstein Krs. Klingenthal		
	2 ♂♂ singend	2 Ex. mit Nistmaterial	E.M8, Tho
27.4.	im gleichen Gebiet	1 Paar	Krei
9.4./	Rabenberg Krs. Schwarzenberg		
23.4.	offensichtl. am Brutplatz	1 Paar	C.Feh
13.4.	Auerbach Krs. Stollberg	1 Paar,	
	♀ mit Nistmaterial		Silb
27.4.	Ellefeld Krs. Auerbach in Garten	1 Paar	G.Sch8
18.8.	Muldenberg Krs. Auerbach	Fütterung	
	ca. 12 juv.		E.M8, Tho
6.6.	Hirtstein/Satzung Krs. Marienberg		
	mehrere Ex.		Ihle

Die übrigen Meldungen deuteten einen schwachen Einflug, möglicherweise aus südlichen Gebieten, an (siehe Tabelle), denn W.Weil registrierte am 23.6., 1.7., 8.8. nach N bzw. NE fliegende Trupps bei Claußnitz nördlich KMStad.

Mo/Dek.	p	n	max.	Mo/Dek.	p	n	max.
Jan. I	1	3	3	Juli I	4	22	15
II				II	7	40	15
III				III	5	30	10
Febr. I	3	8	4	Aug. I	7	21	6
II				II	6	28	12
III	2	20	15	III	6	20	6

Mo/Dek.	p	n	max.	Mo/Dek.	p	n	max.
März I	1	15	15	Sept. I	3	15	7
II	1	2	2	II	2	11	6
III	5	9	4	III	2	7	4
Apr. I	6	26	15	Okt. I	1	3	3
II	2	7	5	II	3	17	10
III	4	11	5	III	4	26	15
Mai I	5	12	4	Nov. I	3	27	15
II				II	3	8	4
III	2	7	4	III	2	31	30
Juni I	10	56	10	Dez. I	1	10	10
II	3	35	20	II			
III	6	67	23	III	2	8	5

418. Gimpel - Pyrrhula pyrrhula

Leipzig: Kop traf bei Falkenhain zur Brutzeit an 3 Stellen Gimpel z.T. mit Jungvögeln. Eine weitere Brut nach C.Feh am Dokorterteich Wermsdorf. Ki fing noch am 20.4. 1 ♀ im Kammerforst/Altenburg.

Übersicht:

Mo/Dek.	n	p	max.	♂♂ : ♀♀
Jan. I	9	17	6	7 : 3
II	10	33	10	9 : 10
III	6	22	8	3 : 3
Febr. I	5	17	7	2 : 1
II	10	31	8	16 : 9
III	2	6	3	2 : 2
März I	8	51	20	16 : 20
II	2	4	3	3 : 1
III	2	14	12	3 : 6
Okt. I				
II	1	2	2	
III	6	23	10	2 : 7
Nov. I	10	43	8	1 : 19
II	8	35		7 : 21
III	7	17	6	1 : 4
Dez. I	2	6	4	
II	5	29	9	2 : 5
III	7	40	11	7 : 24

428. Tannenhäher - Nucifraga caryocatactes

Leipzig: Die Invasion 1968 machte sich auch im Bezirk Leipzig deutlich merkbar. Die Beobachtungen wurden durch Erd gesammelt. Hier soll nur eine Übersicht gegeben werden.

Die ersten Vögel wurden von Ki am 24.7. gesehen. Die meisten Beobachtungen gelangen in den südlichen und östlichen Teilen des Bezirkes. In Klammern sind die n Werte der zentralen Zusammenstellung, die z.T. sehr stark von den uns vorliegenden Werten abweichen.

Übersicht:

Mo/Dek.		n	p	max.
Juli	III	1 (1)	1	1
Aug.	I	4 (6)	7	3
	II	25 (47)	41	6
	III	26 (81)	62	10
Sept.	I	29 (66)	55	8
	II	22 (26)	29	6
	III	3 (5)	4	2
Okt.	I	3 (4)	15	11
	II	3 (3)	3	1
	III	1 (1)	1	1
Nov.	I	1 (3)	3	3
	II	2 (6)	6	4
	III	(1)		
Dez.	I	(1)		

KMStadt: Bis zum Einsetzen der Invasion Anfang August (4. bzw. 8.8.) müssen alle Nachweise der Art der heimischen Rasse macrorhynchos zugeordnet werden, wobei einige Funde auf Brut deuten (siehe unten).

Namentlich im Vogtland dürften auch "Dickschnäbel" in die Invasionstabelle eingegangen sein.

Hinweise auf Brut der Rasse macrorhynchos lagen 1968 aus folgenden Gebieten vor:

- 31.3.-20.7. Scheibenberg Krs. Annaberg wiederholt  
2 Ex. möglicherweise gestörte Brut? D1
- 18.5. Kätchenstein westl. Annaberg 1 Ex. D1

- 27.2.-6.4. Forst Hammerbrücke Krs. Klingenthal,  
1 km vom vorjähr. Brutplatz entfernt  
1 Ex., dieses am 28.2. singend Ern
- Jan.-Aug. bei Eliefeld, Falkenstein, Mühlgrün  
im Krs. Auerbach wiederholt 1-2 Ex.  
(BV) G.Schö,  
E.Mö, Tho

Nachstehende Tabelle kennzeichnet den Invasionsverlauf. Bei einem Vergleich mit den Zahlen von PIECHOCKI (1971): Falke 18 fallen teilweise erhebliche Abweichungen auf, die aus der Tatsache resultieren, daß einige Beobachter zwar für die zentrale Auswertung, nicht aber an uns gemeldet haben. Umgekehrt erhielten nur wir Meldungen, allerdings verspätet, so daß sie der zentralen Auswertung nicht zugeleitet werden konnten. Die n-Werte von Piechocki werden deshalb in () angeführt. Von 98 Beobachtern lagen uns 319 Meldungen vor!

Mo/Dek.	p	n	max.
Aug. I	2	5 ( 4 )	4
II	26	53 (79)	5
III	55	195 (234)	30
Sept. I	34	71 (128)	8
II	27	63 (63)	8
III	28	44 (62)	6
Okt. I	37	75 (35)	23
II	35	61 (49)	15
III	21	27 (39)	3
Nov. I	18	30 (19)	8
II	9	9 (12)	1
III	8	33 (36)	21
Dez. I	8	14 (16)	5
II	4	5 ( 4 )	2
III	11	12 ( 7 )	2

432. Saatkrähe - Corvus frugilegus

Leipzig: Aus dem Stadtgebiet Leipzig wurde nur ein Brutplatz bekannt: Melcher-/Schönbachstr. 2 Paare (G).

434. Kolkkrabe - Corvus corax

KMStad: Unter zahlreichen anderen Krähenvögeln sah J.Frö am 28.2. an Abfällen nahe dem Tierpark-Gelände in KMStad 2 E-

Nachtrag

177. Sichelstrandläufer - *Calidris ferruginea*

Leipzig: Nur sehr wenige Feststellungen:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 27.7. Kippe Großröda | 1 Karg          |
| 31.7. Kläranlage N   | 1 (Brutkl.) Grö |
| 7.-11.9. Kläranl. N  | 1 Grö           |