

A c t i t i s

Avifaunistische Mitteilungen aus den Bezirken
Leipzig und Karl-Marx-Stadt

Im Auftrag der Bezirksfachausschüsse Ornithologie
im Kulturbund der DDR und der Naturschutzorgane
beider Bezirke

Redaktion des Heftes:

Kurt Größler Leipzig
Klaus Tuchscherer Leipzig

Heft 13

Leipzig September 1977

- Als Manuskript gedruckt -

Anschriften der Herausgeber dieses Heftes:

Kurt Größler, 701 Leipzig, Perthesstraße 5

Klaus Tuchscherer, 701 Leipzig, Waldstraße 13

Zu beziehen durch das Sekretariat des Kulturbundes der DDR
Leipzig

701 Leipzig, Käthe-Kollwitz-Straße 115

und

"Museum für Jagdtier- und Vogelkunde"
9383 Augustusburg, Schloß

Inhaltsverzeichnis

Größler, K. und Tuchscherer, K.

Beobachtungsbericht für die Jahre
1969 - 1972

Teil II

63. Tafelente - Aythya ferina

Der Brutbestand und die Durchzugszahlen der Tafelenten haben sich weiter sehr positiv entwickelt. Es werden immer mehr Teiche besiedelt. Die Übersicht beruht vor allem auf Angaben von jungeführenden Weibchen, die Gesamtzahl der Brutpaare ist höher anzusetzen.

Übersicht der Brutvorkommen:

	1969	1970	1971	1972
LT	3 Tu	4 Tu	BV Tu	BV Tu
STT			BV Tu	1 Le
FMT			2 Tu	BV Tu
BMT			BV Tu	
GTT	39 Tu	37 Tu	23 Tu	28 Le
KuT	7 Tu			
Gehet		3 Tu	6 Tu	4 Tu
BeT	6 Tu	2 Tu	5 Tu	2 Le
KlT				2 Mar
DoTW		2 Tu	2 Le	
DrTW				2 An, Le
KiTW		1 Tu	1 Tu	
HtW			1 Tu	
HoS			6 Le	8 Le
GSS		6 Tu	40 Le	7 Le
LRS			1 Le	
GtFr				6 Mi
GtK			2 Tu	BV Tu
MtMb	1 Tu	BV Tu		BV Tu
KlBTr			2 Le	
SchTr			2 Le	1 Le
HS		1 Tu	5 Tu	
StG	3 Li	4 Li	3 Li, Tu	1 Le, Li
TGP	4 Li	6 Li	7 Li	7 Le
StM				2 Le, Li
DL	1 Tu	3 Tu	2 Le, Tu	3 Le
KbBr			BV Tu	BV Tu
AS			1 Tu	BV Tu
KitGr				BV Tu
HtGr		1 Tu	1 Tu	

	1969	1970	1971	1972
MUT			3 Tu	
Rb	1 Grö,Oeh	3 Rnd,Oeh	10 Oeh	3 Fö,Tu
IL	1 Fö			1 Fö
GrR+LaSch	5 Grö	3 Grö,Zi	7 Grö	7 Grö
ET	26 EB	34 EB	26-30 EB	5 EB
Schw				2 Le
SpW	25 Kä,St	5 Fö	?	62 Fö,Le
Fleiße Treben				2 Fö
Hast	6 Fö	53 Fö	?	60 Fö
Erligt			1 EB	

Der Gesamtbestand ergibt, geschätzt für die einzelnen Jahre, folgende Zahlen

1960	ca 130 Paare
1970	ca 210 Paare
1971	ca 270 Paare
1972	ca 225 Paare

Über den Bruterfolg geben die folgenden Zahlen einen Überblick:

Jungenzahlen	1969	1970	1971	1972
1	9	10	8	14
2	13	6	16	27
3	29	21	20	23
4	17	17	22	31
5	15	20	24	41
6	16	22	30	26
7	7	17	16	16
8	5	8	5	13
9	2	7	2	9
10		3	4	5
11	3	1	1	3
12	1	2	2	
13	3	1	1	
14				1
15			1	1
16		1		1
Mittel	4,65	5,33	4,52	4,77

Über die Brutzeit fehlen leider Angaben aus dem Jahre 1970 fast völlig

Jungef. Weibchen	1969	1970	1971	1972
Juni II		2	6	11
III	1		7	56
Jul I	4	1	53	98
II	72		9	184
III	35		41	83
Aug. I	9		23	13
II			35	1
III	2			

Durchzug in einigen ausgewählten Gebieten:

1969:	BS	Pl	GTT	Fl	RT	SpW	HoS/GöS
Jan. I				5 Grö			
III			1 Le	2 Grö			
Febr. I	5 Hoy	15 Fö		4 JS		50 Kä, St	
II				16 Grö			
III				4 Wg			
März I				76 Grö		227 Frie	
II	8 Fö	101 Fö		151 Grö		450 Kä, St	
III	135 G	141 Fö		178 Grö	275 RB	591 Kä, St	
Apr. I	29 Grö			11 Grö	335 RB	338 Frie	50 Do
II	6 Hoy	36 Fö		1 Grö	57 G	271 Frie	
III	12 Fö					300 Kä, St	
Mai I						157 Fö	27 Tu
II	1 Hoy					10 G	
III	3 Fö		139 Tu		238 Fö	213 Kä, St	7 Tu
Juni I	4 Fö					46 Kä, St	
II	2 Fö					258 Kä, St	
III	2 Fö				405 Fö	62 Kä, St	

	ES	Pl	GTT	Fl	ET	SpW	HoS/GöS
Juli I			130 Tu		139 EB	66 Kä, St	
II	8 Fö	2 Fö	120 Tu	2 Grö	133 EB	87 Kä, St	
III			230 Tu		61 EB	117 Kä, St	
Aug. I		3 Fö	85 Tu		42 EB	60 Kä, St	
II		44 Fö	250 Tu	2 Tu		5 Kä, St	
III				2 Grö	170 EB	200 Kä, St	8 Tu
Sept. I	1 Fö	392 Fö		6 JS	80 EB	130 Kä, St	
II	3 Hoy	178 Fö	80 Tu		70 EB	200 Kä, St	
III	1 Wei			14 Kri	144 Fö	60 Kä, St	
Okt. I		288 Fö	86 Fö	49 JS		110 Kä, St	
II	1 Hoy	267 Fö	32 Fö	46 Grö		70 Kä, St	
III		250 Fö	65 Leh	42 Tu		250 Kä, St	
Nov. I		272 Fö		1 Grö		280 Wei	
II		117 Fö	2 Leh			60 Kä, St	2 Wei
III				10 Kri		30 Kä, St	
Dez. I		6 Fö		7 Grö		30 Kä, St	
II	14 Hoy	2 Fö		16 Grö		1 G	
III		1 Fö		1 Le			
<u>1970:</u>							
Jan. I				2 JS			
II		2 Fö		2 G			
III		2 Fö		2 Grö			
Febr. I				2 JS			
II				2 Tu		2 Kä, St	
III	5 Fö			31 Grö		62 Kä, St	

	ES	PL	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/G88
März I		2 Fö		35 Grö		57 KÄ, St	
II		10 Fö		160 PS		286 KÄ, St	
III	81 Hoy	175 Grö	100 Tu	171 Grö		500 G	175 Tu
Apr. I	60 Fö			25 JS	101 G	315 KÄ, St	
II	1 Hoy		227 Tu	19 Grö	169 G	295 KÄ, St	
III	4 Fö				177 Fö	193 KÄ, St	
Mai I	3 Fö		235 Tu	4 Grö	162 G	123 KÄ, St	72 Tu
II	4 Fö		150 Tu	5 Grö		135 KÄ, St	
III		3 Fö	83 Tu	3 Grö		110 KÄ, St	176 Tu
Juni I	1 Fö				222 G	119 KÄ, St	
II			261 Tu	2 Grö		73 KÄ, St	
III	3 Hoy				294 G	58 KÄ, St	423 Tu
Juli I		23 Fö			280 Fö	300 KI, Web	167 Tu
II			624 Tu		106 Fö	36 KÄ, St	
III		21 Fö	254 Tu			36 KÄ, St	
Aug. I		15 Fö	196 Tu	3 WW	62 G	46 KÄ, St	
II		56 Grö	186 Tu	1 PS		300 Ang, Kr	128 Hei
III		189 Fö	398 Tu	3 Tu	168 Brd	64 KÄ, St	113 Tu
Sept. I	1 Fö	262 Fö	370 Tu	2 Grö		117 KÄ, St	165 KÖ
II	2 Hoy		150 Tu	4 Tu	37 G	324 KÄ, St	45 KÖ
III	10 Hoy	261 Fö	76 Tu	30 Tu		305 KÄ, St	370 KÖ

	ES	PL	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/GöS
Okt. I	27 Fö		45 Tu	40 PS		411 Kä, St	
II	159 Hoy	151 Fö	40 Tu	112 Grö		148 Kä, St	250 K8
III	111 Fö		29 Tu	140 Erd	89 Fö	183 Kä, St	112 K8
Nov. I	5 Hoy	261 Fö	8 Tu	4 PS		280 Wei	160 An, Le
II		158 Wei	1 Tu	5 WW		421 Kä, St	13 K8
III		201 Fö		20 An		912 Kä, St	
Dez. I			2 Tu	1 Grö		284 Kä, St	9 K8
II		6 Fö		28 JS		346 Kä, St	
III		73 Fö		9 Grö		362 Ka, St	7 Tu
<u>1971:</u>	ES	PL	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/GöS
Jan. I				15 Grö			
II				12 Grö			
III				9 Grö			
Febr. I				18 An			1 Le
II		39 Fö		59 Tu	20 BB		94 Le
III	9 Hoy			177 PS	20 BB	420 Le	96 Le
März I				236 Grö			
II	109 Hoy		23 Le	60 Kr1	150 BB		282 Le
III	156 Hoy		86 Le	13 PS	150 BB		
Apr. I	78 Hoy		132 Tu	4 Grö	542 BB		297 Le
II				4 Grö			283 Tu
III				7 PS			
Mai I			56 Tu	14 Grö	200 BB		211 Le
II						46 Grö	181 Le
III			168 Tu				226 Le
Juni I			202 Tu	5 PS			506 Tu
II							229 Le
III			308 Tu	11 PS	60 Grö		116 K8
Juli I							303 Tu
II				1 Grö			
III	1 Hoy						60 Le

	BS	Pl	GTT	Fl	ET	SpW	HoS/GöS
Aug. I			131 Tu	2 Erd			
II			287 Tu	1 PS		71 Le	172 Tu
III	11 Hoy	263 Le		5 Tu		85 Le	298 Le
Sept. I		232 Le	852 Tu	45 Grö		98 Le	
II	39 Hoy			125 Tu			59 Le
III	59 Hoy		250 Tu	148 Grö			207 Le
Okt. I	3 Hoy		27 Tu	270 JS	124 EB		6 Le
II	10 Hoy	111 Le	93 Tu	253 Erd	129 EB		11 Le
III	44 Hoy		76 Le	62 Grö	17 EB		8 Le
Nov. I		297 Le		14 An	3 EB		
II				8 JS	1 EB		2 Le
III	2 Hoy	173 Le		1 JS			
Dez. I	6 Hoy			11 Le		32 Le	
II	6 Hoy			12 PS			1 Le
III	4 Le	43 Le		1 Tu		65 Le	1 Le
<u>1972:</u>	BS	Pl	GTT	Fl	ET	SpW	HoS/GöS
Jan. I	3 Hoy	4 Fö		33 PS		65 Le, Fö	1 Le
II		1 Fö		31 Grö			
III				35 An, Le			
Febr. I				42 Grö			
II				50 Le		5 Fö	
III		36 Fö	15 Le	165 Ger			
März I	26 Hoy		70 Le	241 Ger	13 EB	215 Fö	
II	102 PS	164 Fö		182 Grö	466 Fö	564 Fö	370 Le
III	5 Grö		243 Le	104 Grö	330 EB	450 Le	
Apr. I	29 Fö		300 Le	1 Grö		500 Le	201 An, Le
II	20 Fö		265 Fö	4 Grö	280 Fö	227 Fö	207 An, Le
III	51 PS		435 An, Le	3 PS			280 Le
Mai I	15 Fö		410 Le	9 Ger	173 Fö	235 Fö	260 An, Le
II	23 Hoy		259 Tu	4 Grö	250 EB		
III	8 Fö			2 Ger	80 Fö	70 Olz	180 Le

	BS	Pl	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/GöS
Juni I	21 Fö		265 Le	2 Ger	38 Fö		
II					132 Fö	315 Fö	1300 G.Feh
III	1 Fö			1 PS		135 Fö	
Juli I		19 Fö	380 Le			42 Fö	151 An
II	2 Fö				70 Fö	18 Fö	217 Le
III		62 Fö		5 Le		3 Fö	
Aug. I	1 Fö	216 An	195 Tu		53 Fö	120 Fö	120 Le
II		72 Fö	315 Le		136 Fö	193 Fö	180 Le
III	5 Hoy	110 Le		1 Grö	40 Le		
Sept. I	1 Fö	206 Fö		3 PS		73 Fö	158 An
II	26 Hoy	186 Fö		14 Grö			32 An
III	7 Hoy	166 Grö	115 J. Fie	18 Ger		227 Fö	
Oct. I	47 Hoy	120 Fö	2 Fö	139 Tu	3 Fö	170 Fö	
II	2 Hoy	164 Fö	20 Tu	84 PS		267 Fö	
III	3 An	184 An	5 Fö	91 Tu			
Nov. I		115 An		28 Ger	1 KB	149 Fö	
II	32 Hoy	181 Fö		9 Tu		76 An	
III	15 Hoy			11 Tu		116 Fö	
Dez. I	1 Hoy			9 Grö			
II		155 Fö		18 Tu		157 Fö	
III		2 Fö		50 Tu			

64. Moorente - *Aythya nyroca*

Es liegen zahlreiche Beobachtungen vor, die nicht einzeln aufgeführt werden können. Bevorzugte Gebiete sind GTT, GöS, BT und SpW. Als Hauptzugzeiten deuten sich an; im Frühjahr Ende März - Mitte Mai, im Herbst Mitte August - Anfang November.

Übersicht:	1969		1970		1971		1972	
	n	p	n	p	n	p	n	p
Febr. II							1	1
III							1	1
März I							3	3
II							3	4
III	1	1	1	1	1	1		

		1969		1970		1971		1972	
		n	p	n	p	n	p	n	p
Apr.	I	1	2						
	II	2	3			2	3		
	III	1	1					1	1
Mai	I			1	1	1	1	1	2
	II	2	3	2	5				
Juli	II			2	3				
	III			1	2				
Aug.	II			1	1	1	1	1	1
	III							1	2
Sept.	I	2	4			1	1		
	II	2	2						
	III			2	2	1	1	1	1
Okt.	II	2	2	3	3	1	1		
	III			1	2	4	5	2	3
Nov.	I			3	3	2	2		
	III					1	1		
Dez.	II					3	4		
	III					3	6		

65. Reiherente - Aythya fuligula

Die Reiherente gehört zu dem festen Brutvogelbestand unseres Bezirkes und besiedelte weitere Gewässer. Es fällt auf, daß alle Brutorte bisher in den südlichen und mittleren Kreisen des Bezirkes Leipzig liegen, während sie im Nordteil noch völlig fehlt.

Die ersten junggeführten Weibchen erscheinen 2-3 Wochen später als bei der Tafelente. Als Beispiel sollen die Zahlen für 1972 angeführt sein: Juli I 5, II 9, III 6, Aug. I 10, II 1.

Übersicht des Brutbestandes:

	1969	1970	1971	1972
BT	7 KB	12 KB	22 KB	0 KB ⁺
Hast				1 Fö
SpW				26 Fö, Le u.a.
SchW				1 Fö, Le
Pl				1 Fö, Le
GrR	2 Grö, Erd	2 Grö	3 Grö	1 Grö, Le

Gesamt 9 14 25 30

+) An den Eschefelder Teichen waren 1972 ungünstige Wasser-
verhältnisse.

Bruterfolg:	juv:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mittel
1969:	n	1	1		1	2	2	2				4,77
1970:	n	1	3	4		3		2	1			4,00
1971:	n	2	4	3	4	4	3	2	1	1	1	4,56
1972:	n	3	5	3	2	3	5	1	1	2	3	4,92

Mit dem Ansteigen des Brutbestandes nahmen auch die Durchzugszahlen
stark zu. Hierbei ist ebenfalls ein Nord-Süd-Gefälle recht deutlich.

1969:	ES	Pl	GTT	Fl	RT	SpW	HoS/G8S
Jan. I				1 G			
II				4 Grö			
III				1 Grö			
Febr. II				1 Grö			
März I				2 Erd		3 Fö	
II				21 Wg			
III	2 Wei	10 Fö		14 Tu	6 EB	28 G	
Apr. I	5 Hoy		2 Leh	2 Erd	9 Fö	4 Fö	3 Do
II	1 Wei	12 Fö			10 EB	9 Fö	
III	7 Fö					4 Wei	
Mai I	3 Fö					13 G	1 Tu
II						8 G	
III					21 Fö	3 Grö	
Juni III	1 Fö				14 Fö	14 J.Fie	
Juli I					11 G	4 G	
II			13 Tu		2 G	11 G	
III			19 Tu		7 Fö	8 Fö	
Aug. I			8 Tu			9 Fö	
II		2 Fö		2 Erd		2 Fö	
III	2 Hoy			1 Grö	13 Fö		
Sept. I				3 Erd	9 EB	4 G	
II		4 Fö	3 Tu	4 Grö	4 EB		
III	1 Wei			7 Kri		2 Fö	

	BS	Pl	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/GöS
Okt. I		7 Fö	2 Fö	5 Kri		29 Fö	
II			2 Tu	3 Grö		21 G	
III		13 Fö	5 Leh	2 Grö	1 Fö	10 Erd	
Nov. I		30 Fö		3 Kri	2 BB	6 G	
II		25 Fö				5 Fo	
III		36 Fö				3 Le	
Dez. I				6 Grö			
II		2 Fö		10 Grö			
III				1 Grö			
<u>1970:</u>							
	BS	Pl	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/GöS
Jan. I				3 JS			
II		1 Fö		3 Kri			
III				3 Grö			
Febr. I				4 Grö			
II				1 Le			
III	1 Hoy			1 Tu		9 Kä,St	
März I				3 Grö		2 Kä,St	
II				1 Grö		17 Kä,St	
III		10 Fö	2 Tu	3 Grö	8 BB	27 Kä,St	29 Tu
Apr. I	2 Wei				12 BB	37 Kä,St	
II	2 Hoy		6 Tu		29 G	44 Kä,St	
III					42 Kä,St	24 Kä,St	
Mai I		2 Fö	2 Le,WW	1 Grö	116 BB	12 Kä,St	
II					34 BB	8 Kä,St	
III		2 Fö				22 Kä,St	7 Tu
Juni I	1 Fö				45 BB	45 G	
II						5 Kä,St	
III					23 BB	9 Kä,St	18 Hei,Le
Juli I	1 Fö				19 Fö	18 Ki,Web	6 Tu
II			15 Tu	2 Grö	15 BB	3 Kä,St	
III		5 Fö	20 Tu			2 Kä,St	

	ES	Pl	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/GöS
Aug. I			1o Tu		23 BB	3 Kā,St	
II			13 Tu		7 BB	4 Kā,St	
III	2 Fö	3 Fö	7 Tu	1 Tu		16 Kā,St	
Sept. I		15 Fö	8 Tu	1 Grö		6 Kā,St	
II			5 Tu	1 Grö	1o BB	23 Kā,St	
III		32 Fö		3 PS	17 BB	19 Kā,St	
Okt. I	2 Fö		1 Fö		5 BB	2o Kā,St	
II	4 Hoy	26 Le		4 Grö	8 BB	21 Kā,St	
III	4 Hoy			4 PS	11 BB	36 Kā,St	
Nov. I	2 Hoy	46 Fö		1 PS	5 BB	233 Kā,St	4 An, Le
II		1o Fö		1 Grö		231 Kā,St	
III		2 Le		1 Ger		216 Kā,St	
Dez. I					2 BB	175 Kā,St	
II		2 Fö		1 Grö	2 BB	117 Kā,St	
III		1 Le				65 Kā,St	3 Le, Tu
<u>1971:</u>							
	ES	Pl	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/GöS
Jan. I				2 Grö			
II				3 Grö			
III				4 Grö			
Febr. I				1 An		1 Fö	
II		1 Fö			1 BB		
März II	3 Hoy						
III	13 Grö	9 Fö			22 BB	14 Fö	
Apr. I	1o Fö		7 Tu	3 Grö	46 BB	14 Fö	8 Ger
II	4 Hoy				94 BB		24 Tu
Mai I	1 Fö		7 Tu		7o Fö	6 Fö	8 Wei
II					6o Fö		
III				1 Grö		1 Fö	4 Ver
Juni I			1 Tu	2 Ger			29 Tu
II			5 Tu		23 Fö	12 Fö	
III			4 Tu		56 Fö		
Juli I					36 Fö		3o Tu
II							22 Ver
III				2 Grö			

	ES	Pl	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/GöS
Aug. I			13 Tu	1 Brä	62 Fö	1 Fö	
II			9 Tu				2 Tu
III	6 Fö	8 Fö		1 PS	131 BB	2 Fö	
Sept. I			13 Tu	5 Grö		11 Fö	
II	7 Fö	15 Fö		7 Tu		14 Fö	
III				2 Grö		25 Fö	2 Ver
Okt. I		18 Fö	5 Tu	6 Wb		21 Fö	
II		6 Fö	8 Tu	4 Brä	30 BB		
III		25 Fö		3 PS	21 Fö	30 Fö	
Nov. I						38 Fö	
II	9 Hoy	39 Fö		4 Grö			
III		8 Fö		1 PS		8 Fö	
Dez. I				3 Le	5 BB	4 Fö	
II	3 Hoy	4 Fö		3 Le		7 Fö	
III						3 Fö	
<u>1972:</u>							
Jan. I	ES	Pl	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/GöS
II		10 Fö				7 Fö, Le	
III		3 Fö		8 JS			
Febr. I				9 Grö			
II				10 An, Grö			
III		3 Fö		3 Grö			
März I	2 Hoy			3 Grö			
II	8 Hoy	3 Fö		7 PS	12 BB	2 Fö	
III	1 An, Le			4 PS	86 BB	27 Fö	16 Le
Apr. I	13 PS		10 Tu	2 Grö	41 Le	80 Le	13 Le
II	7 Fö		11 Le		120 Le	40 Le	13 An
III	5 Hoy		3 Fö	4 Grö	180 BB	8 Fö	2 An
Mai I	1 Fö		13 An, Le				15 Le
II	10 Hoy		4 Le	5 PS	142 BB	70 Olz	4 An
III	2 Fö		1 Tu	2 PS			3 Le
Juni I	3 Fö			1 PS	36 BB		6 Le
II			1 Le		21 BB	20 Olz	9 G. Fö
III					23 Fö	71 Fö	40 Le
						43 Fö	

	BS	Pl	GTT	Fl	ET	SpW	HoS/GöS
Juli I		7 Fö	5 Le		27 EB	40 Olz	18 Le
II				1 Erd	54 Fö	16 Le	58 Le
III		29 Le		2 Tu	10 Le		14 Le
Aug. I		3 Fö	39 Tu		26 Fö	4 Fö	15 Le
II		12 Grö	8 Tu	1 Grö	2 Le	25 Fö	15 Le
III		7 Le		1 Tu	3 Le	15 An	
Sept. I		3 Fö				48 Fö	11 An
II	1 JS						2 An
III		24 Fö	25 J. Fie		2 Fö	14 Fö	
Okt. I	2 WG	18 Tu	1 Fö	1 Tu	9 Fö	13 Tu	
II	10 Hoy	44 Fö	21 Tu			29 Fö	
III	3 Hoy	37 Fö	2 Tu				
Nov. I		18 An		3 Tu		20 An	
II	15 Fö	40 An, Le		1 Tu		45 Le	
III	2 PS	30 Fö		9 Tu	2 EB	1 Fö	
Dez. I		21 Le		1 Grö			
II		18 Fö		2 Grö			
III				6 Tu			

66. Bergente - Aythya marila

Die zahlreichen Daten bestätigen das bekannte Zugbild.
1970 und 1971 gelangen wieder Maibeobachtungen.

Winter 1968/69: 12.1. Elbe südl. Torgau 1,0 (Leh)
und 7.4. SpW 1,0 (Hö).

Winter 1969/70: 2.-14.11. Fl 0,1 (Kri, Grö), 9.-17.11. ET 1 (EB),
ebendort 3.1. 0,2 (Kä, St), 27./28.2. SpW
0,1 (Kä, St), 15.-21.3. Fl, 1,0 (Grö, PS u.a.),
im Mai wahrscheinlich der gleiche Brpel an ver-
schiedenen Plätzen (Tu): 3.5. LMT, 9.5. StG
und 24.5. MtMb

Winter 1970/71: Ab 15.10. bis 23.12. regelmäßig 1-8 SpW (Kä, St),
Höchstzahlen am 7.11. 2,5 - 17.11. 1,7 -,
zeitweise an den ET: 10.11. 1,4 und 19.12.
0,1 (EB). 9.11. Fl 0,1 (PS).

Am 23.2. wieder 1,0 SpW (St), weiterhin 28.2. Fl 1,0 (PS), 27.4. G8S 1,1 (Lü) und am 12.5. ebendort 1,0 (K8).

Winter 1971/72: Ab 24.10. wieder SpW und GrPa: 24.10. 0,4 (Hö), 27.10. 1,0 (EB), 4.11. 2,1 (Kä,St), 19.11. 1,1 (Kä,St), 20.11. 0,1 (Kä,St), 27.11. 1,0 (G) und 30.12. 1,0 (Kä,St).
Vom 22.1. bis 20.2. Fl 0,1 (An,Ba,Grö,Le,PS, Tu u.a.).

Winter 1972/73: Sehr zeitiger Beginn! 15.-22.8. Pl 0,1 (Fö,Le) vom 22.10. bis 29.11. wieder regelmäßig SpW 1-8 (Frie,Kä,St u.a.), 19.11.-17.12. ES 0,1-0,2 (Fö,Hoy,PS) und 17.12. GrWi 2,0 (Fö).

67. Eiderente - Somateria mollissima

Die Art erscheint immer regelmäßiger.

1969:	8.12. Fl	0,1	Grö
1970:	7.11. Fl	2	Ger
	8.11. Pl	0,1	Le,Sch
	12.12. ET	0,1	EB
	15.12. SpW	1,0	St
1971:	9.10. Mulde Gruna	1,0	G
	10.10. GrWi	0,1	Wei
	16.10. SpW und GrPa	2,2	Kä,St
	23.10. SpW und GrPa	1,1	Kä,St
	24.10. SpW und GrPa	0,1	Fö u.a.
	4.11. Schw	0,1	St
	4.12. FL	1,1	PS, Grö
	5.12. GrPa	1,1	An
1972:	24.-28.11. NMT	0,1	Kop,Ver
	ab 11.12.		
	Mulde b. Grimma	1,0	G.Feh, Ha,K8 u.a.

71. Eisente - Clangula hyemalis

Der seit Mai 1966 am Elsterflutbett lebende Erpel hielt sich hier bis zum 2.6.1972 auf. Zeitweise besuchte er benachbarte Parkteiche (besonders im Mai/Juni).

Weitere Beobachtungen:

1970:	18.1.	Mulde Kleinbothen	1,0	K8, Fichtner
	21.6.	DoTW	1,0	Tu
	15.-23.12.	HoS	1,0	K8
1972:	12.-14.11.	GrPa	1	Ki, Web u.a.
	24.11.-10.12.	NMT	1	Kop, Ver
	25.11.-9.12.	Fl	0,1	An, J.Fie, Gr8 PS, Tu u.a.

72. Trauerente - Melanitta nigra

Fast alle Daten bestätigen die Hauptzugzeit November/Anfang Dezember. Erwähnenswert sind die zahlreichen Beobachtungen und die hohen Zahlen im Nov. 1970 (SpW)

1969:	6.10.	GrW1	3	F8
	26./27.10.	PL	0,1	Er8, F8
1970:	1.11.	SpW	0,1	K8, G, St
	3.11.	SpW	0,3	St
	4.11.	Fl	0,1	JS
	7.11.	SpW	0,15	K8, St, Wei
	8.11.	Pl	0,1	An, F8, Le, Wei
	8./9.11.	SpW	0,2	K8
	10.11.	SpW	1,1	K8, St
	2.11.	SpW	0,1	K8, St
1971:	9.-13.2.	SpW	1,0	Frie u.a.
	27.11.	SpW	0,3	K8, St
1972:	11.11.	GrPa	0,1	F8, K8, St
	12.11.	ET	0,1	Frie
	18./19.11.	Pl	0,1	An, F8
	25.11.	GrW1	0,9	F8
		PL	0,2	F8
	9.12.	SpW	0,1	K8, St

73. Samtente - *Melanitta fusca*

Die Daten bleiben im bisher bekannten Rahmen.

1969:	24.4.	ES	5,1	F8
	26.10.	Pl	0,1	Brd
	20.12.	Fl	0,1	Grö
1970:	19./20.12.	GrW1	0,1	Web,St,Kä
	27.12.	SpW	0,2	St
1971:	30.10.	Pl	2	F8
	19.11.	SpW	0,1	St
1972:	24.11.	SpW	0,4	Kä,St
	25.11.	GrW1	0,6	F8
	2.-20.12.	Fl	0,1	An,Grö,JS, PS,Tu u.a.
	12.12.	SpW	2,5	Kä,St
	13.12.	SpW	0,2	Kä,St

76. Schellente - *Bucephala clangula*

In vielen Gebieten regelmäßiger. 1969, 1971 und 1972 auch in den Sommermonaten angetroffen. Im Juli 1970/71 am Elsterflutbett bis 6 (Grö,PS) und im Juli 1972 1 (Grö,Le,Tu u.a.). Weitere Sommerdaten:

1969: 4.5. SpW 1,0 Kä,St; 11.5. SpW 1 G
 1971: 6.5. ES 0,1 F8; 20.6. SpW 1,0 F8, 30.6. GTT 1,0 Tu

Durchzug: ES Pl GTT Fl BT SpW HoS/G8S

1969:

Jan. I			2	G,Tu		
II			1	Grö		
III			1	Grö		
Febr. I			1	Brd, Grö		
II			1	Grö,Tu		
III			1	Grö,Wg		
März I			3	Brd		
II	1 Hoy Wei		4	JS,Wg		
III	7 G		4	PS	4 BB	1 Kä,St F8
Apr. II	1 F8,Hoy Wei	4 Tu				
Aug. III			1	Kr1		

	BS	Pl	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/G8S
Sept. I			1 Tu				
II				3 Grö			
III				3 Kri		1 Kä,St	
Okt. I				3 Kri, Le			
II				1 Kri, Le	1 BB		
III			1 Grö		2 BB		
Nov. I						3 Kä,St	
II						2 G,Kä,St	
III						7 Kä,St	
Dez. I				1 Kri			
II				9 Ger			
III				1 Ger, Grö			

<u>1970:</u>	BS	Pl	GTT	Fl	BT	SpW	HoS/G8S
Jan I				1 Grö, JS			
II		2 Fö		1 G,Grö			
III		2 Fö		1 Grö, JS			
Febr. I		4 Fö		1 Grö,Le			
II				1 Grö,Le		3 Kä,St	
III				1 Grö,Tu			
März I				2 Grö		1 Kä,St	
II				1 G,JS	3 BB	5 Kä,St	
III				1 Grö,Le	1 BB	10 Kä,St	
Apr. I					1 BB	9 Kä,St	
II				1 Grö		2 Kä,St	
Mai I			1 Le,WW	1 Grö			
Sept. III						3 Kä,St	
Okt. II					1 BB	3 Kä,St	
III					3 BB		
Nov. I		20 Fö			16 BB	62 Kä,St	
II		6 Fö			1 BB	53 Kä,St	
III		3 Fö		1 Grö, JS		72 Kä,St	
Dez. I				1 Ger,Le		24 Kä,St	
II				1 Brd,Grö	3 BB	18 Kä,St	

	BS	Pl	GTT	Fl	RT	SpW
Dez. III				1 Grö, WW		13 K _h ,St

1971:

Jan. II				1 Ger, Grö		
III				1 Grö		
Febr. I					1 EB	
II					2 EB	
III					3 EB	1 Fö
Apr. I	2 Hoy, Wei		5 Grö		1 EB	7 Fö
II	9 Fö				2 EB	
Aug. I				7 Grö,PS		
II			1 Tu	5 Grö		
III	3 Fö			3 Grö,JS		
Sept. I			1 Tu	3 Grö		
III			1 Tu			
Okt. I			1 Fö		2 EB	
III			1 Fö,Tu			
Nov. II	10 Fö			5 JS	13 EB	
III	1 Fö	4 Fö				
Dez. I	1 Hoy			1 Grö	2 EB	3 Fö
II	2 Fö	1 Fö	1 Tu	2 Grö,PS	2 EB	3 Fö
III				2 Ger, Grö	1 EB	

1972:

	BS	Pl	GTT	Fl	RT	SpW
Jan. I	1 Fö, Hoy			1 Grö, JS		1 An,Fö, Le
II				3 An,Le		
III				3 Le		
Febr. I				1 Ger		
II				1 Grö,Le		
III				3 Grö,Tu		
März I	1 Fö			5 An,JS		
II				1 Grö,Le		
III			5 Le	2 Ger, Grö	1 EB	

	ES	Pl	GTT	Fl	RT	SpW
Apr. I	1 Fö, PS		9 Le		1 Le	
II	1 PS		11 Fö		1 BB	1 Fö
III			12 An, Le		1 BB	
Aug. I			1 Tu	1 Grö, Tu		
II			1 Le, Tu		4 BB	
III				1 Grö, PS		
Sept. I				1 PS		1 Fö
II		1 Fö, PS				
III		3 Grö				1 Wg
Okt. I		2 Tu				
II		1 Fö	4 Tu			
III		4 Fö	1 Fö, Tu	1 Grö, Tu		
Nov. I				1 JS, Tu		
II	2 Hoy	4 Fö		1 Tu		5 Le
III		10 Fö			2 BB	2 Le
Dez. I		6 Le				3 Le
II		4 Fö		1 Grö		2 Olz
III				1 Tu		

Weitere Winterbeobachtungen besonders auf der Elbe bei Torgau.

z.B. 1972: Torgau-Domnitzsch: 16.1. o,2; 6.2. 11,23; 12.3.

3,4 An

77. Zwergsäger - Mergus albellus

Die Zahl der Beobachtungen hat im Berichtszeitraum wieder zugenommen.

Winter 1968/69: 12.1. Mulde Höfgen 3 (Ha) und Zschepplin o,1 (G),
24.1. Mühlgraben Rosenthal o,1 (Grö), 2.2. Pl o,6 (Fö, Kir),
ebendort am 8.3. o,1 (Kir), 12.3. Fl 1,1 (PS), 16. und
30.3. Pl o,2 (Fö).

Winter 1969/70: 19.11. SpW 1(St), 7.12. Mulde Kollau o,1 (Ver),
14.12. Fl o,1 (Ger, Grö), 25.-12.-10.1. Mulde Höfgen o,1 (Ha),
bei Groitzsch am 3.1. 1,0 und am 18.1. 1,1 (Ang, Kr), 18.1.
Elbe nördl. Torgau o,1 (Tu), am Pl am 15.2. 1. und 15.3. 1,0 (Fö).

Winter 1970/71: 17.-29.11. SpW o,1-o,2 (Kä,St), ebendort am 1. und 12.12. 1,o, 23.12. 1,1 27.12. o,3, 17.2. und 17.3. o,1 (Fö,Hö,Kä,St). Weiter in: 28./29.11. Pl o,1 (Fö,Hei,Le,Sch,Wei), 25.12. GrWi 2,1 (Fö) und 21.2. ET o,1 (KB).

Winter 1971/72: 20.11. GrWi o,2 (Fö), 18.12.-9.1. SpW o,1 (Fö,Hö,Kä,Le,St), 15.1. Pl 1,1 (Le PS), 6.2. Elbe südl. Torgau o,3 (An,Le), nördl. Torgau o,5 (An,Le), 13.2. Elbe südl. Torgau o,2 (An,Le), 23.2. Elbe Greudnitz o,1 (An,Le) und 26.2. Elbe südl. Dommitzsch o,3 (Le).

Winter 1972: 20.10.-22.12. SpW 1-4 am 11.11. 9 und am 13.11. 10 (Kä,St u.a.) 17.12. Pl o,1 (Fö) und 30.12. Elbe Torgau - Belgern o,2 (An).

78. Mittelsäger - Mergus serrator

Auffallend viele Beobachtungen bestätigen das bisherige Zugbild. Bemerkenswert ist eine Maifeststellung und Nachweise von Flußläufen im Winter.

1969:	8.4.	KS	1,1 JS
	6.12.	SpW	1,o Kä,St
	14.12.	Mulde Grimma	o,1 Ha
1970:	19.5.	SpW	o,2 Kä,St
	7.11.	SpW	o,7 Kä,St,Wei
	8. u.10.11.	ET	o,4 BB
	8.11.	Pl	1,5 Fö,Le,Sch,Wei
	8.11.	SpW	o,4 Kä,St
	9./10.11.	SpW	o,2 Kä,St
	14.11.	Pl	1,1 Wei
	15.11.	Pl	o,2 An,Fö,Le,Sch,WW
	21.11.	SpW	1,o Hö,Kä,St
1971:	13.11.	KS	o,4 Fö
	13./14.11.	SpW	o,4 G,Kä,St
	14.11.	KS	1,o Hoy
	11./12.12.	SpW	o,1 G,Kä,St
	31.12.	SpW	o,1 Hö,Kä,St
1972:	6.2.	Elbe nördl. Torgau	o,2 An,Le
	3.4.	SpW	1,5 St

8.-10.11.	SpW	2 Frie, St
25.11.	Pl	0,2 Fö

79. Gänsesäger - Mergus merganser

Trotz recht vieler Beobachtungen ist deutlich zu erkennen, daß die Zahlen etwas zurückgegangen sind. Konzentration gegenwärtig vor allem im Elbgebiet.

		1969		1970	
		GTT	Elbe Torgau	GTT	Elbe Torgau
Jan.	II		15 Leh		331 Leh
	III	39 Leh			
Febr.	I	40 Leh			
	II				81 Tu
März	II				51 Tu
	III			18 Tu	8 An,Le
Apr.	I	17 Leh			
	II			62 Tu	
Okt.	II			1 Fö,Tu	
Nov.	I			11 Tu	
	II			1 Leh	
		1971		1972	
		GTT	Elbe Torgau	GTT	Elbe Torgau
Jan.	II		183 Tu		19 An
	III				189 Le
Febr.	I				482 An,Le
	II		5 Tu		49 An,Le
	III				123 An,Le
März	I				10 Le
	II	2 Tu	11 Tu		5 Le
	III	2 Tu			

Beobachtungen aus anderen Gebieten:

		1969		1970		1971		1972	
		n	p	n	p	n	p	n	p
Jan.	I	1	1	1	1	-	-	-	-
	II	1	58	-	-	-	-	2	8
	III	-	-	-	-	-	-	3	4
Febr.	I	1	1	1	1	-	-	-	-
	II	1	1	1	1	-	-	1	2
	III	1	1	1	1	-	-	1	2
März	I	1	1	-	-	1	1	1	3
	II	2	6	1	2	-	-	1	2
	III	3	10	2	4	-	-	4	12
Apr.	I	1	2	1	1	1	1	-	-
	II	-	-	2	3	-	-	1	5
	III	-	-	-	-	-	-	1	2
letzte Ex.		2.4.		18.4.		9.4.		27.4.	
erste Ex.		2.11.		26.10.		13.11.		8.11.	
Okt.	III	-	-	1	3	-	-	-	-
Nov.	I	1	1	2	3	-	-	1	1
	II	-	-	-	-	1	2	2	2
	III	1	3	2	6	-	-	1	1
Dez.	I	-	-	2	4	-	-	-	-
	II	3	3	2	11	1	2	1	2
	III	1	1	2	2	-	-	-	-

Die meisten Beobachtungen stammen vom Elsterstausee, Pleißestausee, Speicherb. Windischleuba und der Mulde.

Zwei Sommerdaten gelangen im Berichtszeitraum:

21.6.1970 Dokortortich Wernsdorf 1,0 (Kop,Tu) und

4./5.6.1971 Speicherb. Wind. 1,0 (Kä,St).

89. Schreiadler - *Aquila pomarina*

Ein am 16.9.1972 über den KLN hoch überhinziehender Adler war vermutlich *pomarina* (Grö).

91. Mäusebussard - *Buteo buteo*

1972 mehrfach größere Ansammlungen in den Feldgebieten Delitzsch-S, z.B. 26.8. 44 Ex., 7.10. 95!; 29.10. 50; 16.12. 20 und 21 (Grö). Am 31.10. bei Borna Zugtrupp von 27 Ex. (Ur).

92. Rauhfußbussard - Buteo lagopus

Übersicht der Beobachtungen:

	1969		1970		1971		1972	
	p	n	p	n	p	n	p	n
I	3	5	5	8	3	3	3	4
II	3	5	3	3	2	2	3	3
III	1	1	2	2			4	7
IV			1	2	4	5	1	1
					8.5. Totfund (Grö)			
IX					2	2	2	2
X			4	6	7	11	4	7
XI	2	2	4	6	3	3	4	6
XII	10	11			1	1	11	16

94. Sperber - Accipiter nisus

Übersicht der Beobachtungen zur Brutzeit und Brutnachweise

1969:	11.5.	Colditz Kanal ♀ (Fö)
	15.6.	Kammerforst Wintersdorf 2 juv. (K1) Thümmelitzwald Brutpaar, Gelege zerstört! (Ha)
	31.8.	ET ♀ (Fö), vielleicht bereits Zügler
1970		Kammerforst Wintersdorf juv. abgestorben! (K1)
	19.7.	Langenleuba-Oberhain 1 (Si)
	5.5.	Dorf ♂ (Tu) Nimbschener Forst Brutversuch (Kö)
1971	9.5.	Wermsdorf Forst ♂ (Grö) Colditzer Forst (Le) Nimbschener Forst Brut (Kö)
	13.8.	Westewitz (Pog)

1972 Nimbschener Forst Brut (Kö)
Colditzer Forst 3 taube Eier (Le)
Colditzer Forst (anderes Revier
vermutlich ♀ ohne Partner (Grö)
18.8. Langenleuba-Oberhain 1 (Si)

Übersicht der Durchzugsdaten und Wintervorkommen

	1969		1970		1971		1972	
	p	n	p	n	p	n	p	n
I	9	9	5	5	9	13	6	6
II	4	4	12	12	9	10	9	10
III	10	11	9	9	10	11	10	11
IV	3	3	2	2	4	4	3	4
VIII	3	3	4	4	5	5	1	1
IX	3	3	1	1	5	6	1	1
X	11	15	12	13	15	18	2	2
XI	17	18	11	13	12	13	10	10
XII	13	14	11	12	6	7	9	9

95. Habicht - *Accipiter gentilis*

Übersicht der Brutzeitdaten und Brutnachweise, Zahlen in ()
kein Horstfund!

		1969	1970	1971	1972
Torgau:	Lausa				3 juv. (Lö)
	Kobershain	(1) Kop	3 juv. Kop	1 juv. Kop	1 juv. Kop
Oschatz	Wermsdorf N	(1) Fö		(1) Tu	(1) Kop, Le
	Schmannewitz			1 Kel	
	Reudnitz				4 juv. Lö
	Bucha				(1) Kel
	Luppa			(1) Grö	
	Frauwalde			2 juv. Kop	2 juv. Kop
	Horstsee			(1) Le	
Wurzen:	Meltewitz			1 juv. Kop	
	Thammenhain	o juv. Kop			
	Falkenhain	o juv. Kop	1 juv. Kop	2 juv. Kop	
	Sachsendorf	o juv. Kop			2 juv. Kop

	1969	1970	1971	1972
Tresenwald	(1) Li			(1) Grö, Le
Eilenburg:Kossen	(1) Li			
Grimma: Fuchshain	2 juv Blü	1 Blü	(1) Le	(1) Le
Großbothen			(1) KÖ	
Döben	1 G.Feh			
Naunhof		1 Blü		(1) Le
Müncherholz			(1) KÖ	
Gastewitz		(1) KÖ	(1) KÖ	
Glasten		(1) FÖ	(1) KÖ	
Otterwisch	(2) Blü	1 Blü		
Rohrbach	(1) Oeh	2 Blü		
Colditz O	(1) FÖ, Wei	(1) Wei	1 FÖ	
Geithain: Ballendorf	(1) FÖ	1 juv FÖ		
Bad Lausick O	(1) FÖ			
Langenleuba- Oberhain			3 j Si	2-3 j Si
Döbeln: Wendishain				(1) Le
Haßlau			(1) Le	
Schmölln: Nöbdenitz			(1) Le	
Leipzig: Leutzscher Holz			(1) Grö	
Burgau		(1) Wb		
Litzschena	(1) Grö	(1) Grö,Wb	1 Wb	(1) JS
Gundorf			(1) Le	(1) JS
Tannenwald			1 Wb	(1) Wb
Schkeuditz	(1) Gro		3 j Gro	3 j Gro
Cospuden	(1) FÖ,Grö			(1) Grö
Zöbiger	(1) FÖ	1 j FÖ		3 j Hoy
Connewitzer Holz	(1) FÖ	1 j FÖ		
Hainholz	1 FÖ	(1) FÖ	1 Grö	
Richholz	1 FÖ,Grö	(1) FÖ	1 Grö	
Bistum				(1) Grö
Eythra W	(1) Grö	(1) Grö	(1) Grö	1 Grö
Oberholz	1 Blü	4 Blü		
Pönitz	(1) Grö	(1) Grö		

	1969	1970	1971	1972
Borna:	Rötha (1) Fö			
	Altengroitzsch	Gelege Kru		
Altenburg:	Pahnaforst (1) Fö	(1) Fö,G		
	Kammerforst 2,2 j Ki	2,2,2 j Ki 1 j Ki		
	Deutsches Holz	(1) Fö,G		
erfaßter Bestand:	Paare 29	29	26	20

Die Übersicht ist zweifellos nicht vollständig, so fehlen z.B. Angaben für die Dübener Heide völlig!

96. Rotmilan - Milvus milvus

	1969	1970	1971	1972
Torgau:	Lausa		3 j Lö	
	Wohlau			2 j Teu
	Belgern			(1) Le
	Schildau		(1) Tu	(1) Le
	Pflückuff	(1) Tu	(1) Grö,Tu	(3) An,Le
	Elbaue Torgau		(1) Tu	
	Mittelheide		(1) Leh	
	Kobershain	3 j Kop		
Eilenburg:	Kämmereiforst		(1) Grö	(1) Grö
	Doberschütz			(1) Le
Oschatz:	Wermsdorf Forst	(2) Tu	(2) Le,Tu	(1) An,Le
	Schmannewitz 2 j Lö			1 j Lö
	Luppa		(1) Grö	
	Zeuckritz 2 j Lö	1 Lö	1 Lö	1 Lö
	Bucha			1 Lö
	Terpitz			1 j Teu
	Frauwalde		(1) Wb	(1) Kop

		1969	1970	1971	1972
Wurzen:	Püchau				(1) Grö
	Kollau	(1) Grö			
	Thammenhain	3,3,1 j Kop	1,3 j Kop	1,3,2 j Kop	3,3,3 j Kop
	Meltewitz	2,1 j Kop	2 j Kop	1 Kop	
	Sachsendorf		2-3 j Kop	2 j Kop	3 j Kop
	Stolpen	1 Kop			
	Dögnitz				(1) Grö
	Tresenwald	(1) Li		(1) Le	(2) Grö, Le
	Kühnitzsch		(1) Kop		
Leipzig:	Luppen-Aue	2 Gro	(3) Grö, Wb	(2) Grö, Wb	3 j Do
	Elster-Aue	(3) Fö, Grö		(1) Grö	(2) Grö, Hoy
	Oberholz	1 Blü		(1) Le	(2) Le
	Mölkau			BV Le	
	Tannenwalde		(1) Grö		1 Wb
Grimma:	Wernsdorf Forst			(1) Kō	
	Otterwisch		1 Blü		(1) Le
	Nimbschen	BV Kō			
	LRS			(1) Kō	
	Colditz Forst			(1) Le	
	Glasten			(1) Fö	
	Ammelshain	1 Blü			
	Naunhof Forst	1 Blü	2 Blü	1 Grö	(1) Le
	Thümlitzwald				(1) Le
	Albrechtshain			(1) Le	
	Fuchshain			(1) Le	
	Bohrbach		1 Blü	(1) Grö, Oeh	
Borna:	Audigast		Gelege Kru		
Geithain:	Jahnshain			(1) Si	
	Dolsenhain			(1) EB	
	Froburg			(1) EB	
	Streitwald		(1) Kō, St		

	1969	1970	1971	1972
Altenburg:Pahnaforst	(1) Fö	(1) G,Grö	(1) Fö,Grö	2 j Le
Kammerforst		2,2 j Ki		
Leina		(1) Kä,St		
erfaßter Brutbestand				
Paare:	20	23	33	31

97. Schwarzmilan - *Milvus migrans*

Übersicht der Brutvorkommen in den Jahren

	1969	1970	1971	1972
Torgau: Pflückuff			(2) Grö,Tu	(2) An,Le
Kobershain	2 j Kop	3 j Kop	2 j Kop	
Elbe Graditz		(1) Mar		
Oschatz: Wermsdorf		(2) Tu	(1) Le,Tu	(2) An,Le
Forst			(2) Kö,Le	(1) Le
Horstsee				
Wurzen: Sachsendorf		(1) Kop,Mü	2 j Kop	2 j Kop
Thammenhain		1 Kop	3 j Kop	
Tresenwald	(1) Li			
Grimma: Müncherholz		(1) Kö		
Fuchshain			(1) Le	
Colditz Forst			BV Kö	
Glasten			(1) Kö	(1) Le
Naunhof				(1) Le
Otterwisch	1 Blü	(1) Tu		(1) Tu
Rohrbach			(1) Le,Oeh	
Delitzsch:Lemsel				(1) Grö
Bilenburg:Kämmereiforst				(1) Grö
Leipzig: Luppensau	3 Gro,Grö	(3) Grö,Wb	2 Grö,Wb	(2) Le,Js
Elsteraue	(2-3) Fö,Grö	(3) Fö,Grö	(1) Fö,Grö	(3) Grö
Geithain: Langenleuba				(1?) Si
Altenburg:Pahnaforst	(2-3) Kä,St	(1) G	(1) BB	
Kammerforst	2 j Ki	2 j Ki	2 j Ki	
Leinaforst	(1) Kä,St			
erfaßter Brutbestand:	12-14	16	17	16-17

98. Seeadler - *Haliaeetus albicilla*

1969:	27.10.	GTT 1 juv. Grö
	16.11.	GTT 1 Leh
1970:	18.1.	Elbe km 168 1 juv. Tu
	5.5.	KitW 1 juv. Tu
1971:	20.10.	GTT 1 ad. Le
	12.12.	GTT 1 juv. Tu
	23.12.	DoTW 1 juv. Le
1972:	13.2.	Elbe Möckritz 1 ad. An
	12.3.	Elbe Möckritz 1 juv. An
	15.10.	GTT 1 juv. Tu

100. Wespenbussard - *Pernis apivorus*

Übersicht der vermutlichen Brutvorkommen, exakte Brutnachweise
gelingen nur selten.

Torgau	1969	Kobershain (Kop); 1970 Pflückuff (Tu)
Wurzen	1969	Heyda (Kop), DoTW (Kop), Thammenhain (Kop)
	1970	Hohburg (Kop), Burkartshain BV (Kop), Heyda (Kop)
	1971	Püchau (Le)
	1972	Heyda 1 j (Kop), Frauwalde 2 j (Kop)
Grimma	1970	Otterwisch (Tu)
	1971	Otterwisch (Tu), Horstsee (Le), Colditz (Fö)
	1972	Colditz (Grö)
Leipzig	1969	Imnitz (Wei), Oberholz (Blü), Luppenaue (Grö), Leutzscher Holz (Grö)
	1970	Luppenaue (Grö), Leutzscher Holz (Grö), Richholz (Grö), Oberholz (Grö)
	1971	Pönitz (Grö), Leutzscher Holz (Grö), Luppenaue 2 Paare (Grö), Richholz Horstfund (Grö)
	1972	Leutzscher Holz (Grö), Richholz (Grö)
Altenburg	1969	Pahnaforst (Wei)
	1970	Kammerforst (Grö,Kä,St), Luckaer Forst (Kä,St), Pahnaforst (G)

1970 beobachteten Hoy und Wei am 6.9. am BS durchziehende Truppe
von 3,39 und 22 Ex.!

101. Rohrweihe - *Circus aeruginosus*

Übersicht der Brutvorkommen (für 1969 dürften für mehrere Gebiete die Angaben fehlen). Anzahl der Brutpaare in den Jahren

	1969	1970	1971	1972
Wittenberg:LT		2 Tu	2 Tu	2 Tu
Torgau: "Elbaue"			2 Leh	
FMT		1 Tu	1 Tu	
GTT	5 Tu	5 Tu	7 Tu	8 Tu
Gehet		1 Tu	2 Tu	2 Le,Tu
BeT	2 Tu	3 Tu	2 Mar	1 Mar
KlT	1 Tu	1 Tu	1 Leh,Tu	1 Le,Tu
NMT	2 Kop	1 Tu	2 Kop	
GrMT	2 Kop		1 Kop	1 Tu
Oschatz: DMT	1 Kop	1 Kop	1 Kop	1 Kop
KitW		1 Tu		
HtW		1 Tu		1 Schö
HoS		2 Tu	1 Le,Tu	
Grimma: ZtFr				1 Kop,Ver
GöS		3 Tu	5 Do,Ver	3 Schö
LBS			1 Kö,Le	1 Le
SchTr			1 Le	1 Le
HS			1 Le	
MüT	1 Kö	1 Tu	2 Tu	
KitGr				1 Le
Ammelshain S				1 Do
Rb	1 Grö	2 Tu	3 Le,Oeh	2 Le
Bilenburg: Wbr	2 Be,Mer	1 Tu	1 Tu	2 Le,Tu
StG	1 Li,Tu		1 Schu	2 Grö
BH	1 J.Fie			
GaT				1 Ba
Wurzen: StTh	2 Kop	1 Kop	2 Kop	1 Kop
Hohburg	1 Kop	1 Kop		

	1969	1970	1971	1972
Falkenhain O				1 Kop
Nischwitz		1 Dörnig		1 Mü
GtK		1 Kop, Ver	2 Kop	1 Ver
StF	1 Kop		1 Kop	1 Kop
StH	1 Kop	1 Kop	2 Kop	
TS			1 Le	1 Tu
Röcknitz		1 Ver	1 Jo	1 Ver
MtM	1 Kop, Mb	1 Kop, Mb	2 Tu	
StTh	1 Kop	1 Kop	2 Kop	
Burkarts- hain W	1 Kop	1 Kop		
StDo			1 Kop	
TGP			1 Le	
Muglenz			1 Kop	
DL		1 Schr	2 Schr	2 Le
KrKo	1 Li			
Dögnitz	1 Grö, Li			1 Grö
MaT		1 Tu	2 Le, Tu	1 Le
KBr	1 Tu	1 Tu	1 Tu	
Delitzsch: TRei		1 Tu	4 Tu	1 An
Klitzschmar			1 Le	
Breitenfeld				
N	1 Grö	1 Grö	1 Grö	1 Grö, Wb
Wölkau Teich		1 Grö	1 Grö	
Leipzig: MoL	1 Gro	1 Gro	2 Gro	1 Gro
IL	1 Wei	1 Wei, Kru	1 Pö	1 Sy
TGU	1 Blü	1 Erd		1 Erd
Kulkwitz	2 Do, Wei			
Oberholz	1 Blü			
Holzhausen O			1 Do	1 Le
LaSchö				1 Grö
Borna: GrW1	1 Pö	1 Pö	1 Pö	
Großzössen			1 Pö	

	1969	1970	1971	1972
Geithain: ST	4 Ki	3 Ki	4-5 Ki	1 EB
SbT	1 G			
Altenburg: Meuselwitz	1 Ki	1 Ki	1 Ki	1 Ki
Kriebitzsch			1 Ka	2 Ka
SpW		1 Kä, St		1 Ki
HaT	1 Ki	2 Ki	4 Ki	3 Ki
Rositz		1 Ka		1 Ka

Übersicht des erfaßten Brutbestandes der Jahre

	1969	1970	1971	1972
Paare	45	53	82	58

Weitere Brutpaare sind in den Feldgebieten zu erwarten, die Nachweise sind jedoch schwer zu erbringen.

Die Anzahl der ausgeflogenen Jungvögel schwankt stark, notiert wurden 4 x 1; 13 x 2; 24 x 3; 23 x 4; 7 x 5; und 3 x 6 juv. pro Brut.

Im Herbst kann es zu Ansammlungen kommen, z.B. 1972 im südl. Teil des Kreises Delitzsch: 26.8. 8,5 + 15 juv., 2.9. 4,6 + 12 juv. und 9.9. 2,5 + 10 juv. (Grö).

102. Kornweihe - Circus cyaneus

Aus den Monaten Mai und Juni liegen nur wenige Daten vor, die nicht auf eine Brut im Gebiet schließen lassen.

Notiert wurden:

1969	9.6.	SpW 1,0 Kä, St
1970	9.5.	Liehmehna 0,1 Wei
1971	12.5.	GöS 0,1 Kö
1972	12.5.	Langenleuba 1,0 (spec. ?) Si

Übersicht der Vorkommen zur Zugzeit und im Winter
(Anzahl der beobachteten Exemplare):

Monat	1969	1970	1971	1972
I	3	2	2	14
II			5	25
III	1		4	8

Monat	1969	1970	1971	1972
IV		3	4	1
VII				1
VIII	1	1	4	3
IX	3	1	3	8
X	6	13	9	19
XI	4	4	12	16
XII	7	7	9	9

Geschlechtsangaben liegen vor für

Männchen	10	4	16	26
Weibchen	6	16	16	71

(Die hohen Zahlen 1972 beruhen auf intensivere Beobachtungstätigkeit in den Feldgebieten, besonders durch An, Le)

104. Wiesenweihe - Circus pygargus

Im Berichtszeitraum gelang kein Brutnachweis, die Beobachtungen 1972 lassen jedoch eine Brut in der näheren Umgebung vermuten.

1969 bei Audigast 9.5., 15.6. und 2.-3.9. je 1,0 Ang

1970 Nöthnitz/Groitzsch 23.-30.6. und 8.9. je 1,0 und am

18.8. 0,1 Ang, Kru, Frank; 1.8. Wildenhainer Bruch 1,0 Wei

1971 29.8. Fuchshain 1,0 Le

1972 13.5. Mutzschlena 1,0 Le

27.7. - 1.9. Raum Werbelin 1,1 und 1 juv. An, Grö, Kre, Le

29.8. Gottscheina-Mutzschlena 1 juv. (ev. selbe Ex.) An

10.9. Krenschitz-Mocherwitz 1 juv. (ev. selbe Ex.) An

106. Fischadler - Pandion haliaetus

Übersicht der Vorkommen (Doppelzählungen in einer Dekade sind ausgeschlossen, bei längerem Verweilen, in der folgenden möglich).
Maximal wurden in einem Gebiet 6 Ex. zusammen angetroffen.

	1969	1970	1971	1972
März I	-	1	1	-
II	1	1	-	4
III	5	4	7	3
April I	7	6	2	7
II	1	2	3	5
III	-	1	3	3
Mai I	1	-	-	-
II	3	-	-	1
III	-	-	1	-
Juni I	-	-	-	1
II	1	-	-	1
III	1	-	1	1
Juli I	1	-	1	-
II	2	2	2	-
III	4	4	3	2
Aug. I	1	4	2	4
II	3	11	5	1
III	7	7	10	18
Sept. I	8	14	4	14
II	8	5	8	7
III	6	2	1	3
Okt. I	2	1	2	-
II	1	-	-	-
III	1	-	-	1

Die Notizen beruhen auf Beobachtungen von An, Be, Dör, Ehr, J. Fie, G, Grö, Gug, Kel, Kop, Leh, Le, Lö, Mar, Mer, Mb, Mü, Oeh, Patze, Schr, Sei, Schö, Straßburg, Str, Syn, Tu, Ver, Vie, Web, Weg, Zil und den KB. Bevorzugte Rastgebiete sind: ET und GTT, jedoch werden auch oft kleinere Gewässer aufgesucht.

107. Baumfalk - Falco subbuteo

Übersicht der Brutvorkommen:	1969	1970	1971	1972
Kreis Torgau: Pflückuff	1 Le			2 Le
Dommitzsch W				BV Le
Bilenburg WBr	1 Be	1 Zil		1 Be, Ver
Noitzscher Heide				(1) An

		1969	1970	1971	1972
Wurzen	Thammenhain	1 Kop			
	Falkenhain		1 Kop	1 Kop	1 Kop
Leipzig	Rosental	1 Grö	1 Grö, JS	- !	BV Grö
	Südfriedhof	3j Grö			
	Connewitz, Holz			2j Fö	
Grimma	Großbothen NW				1 Le
	Thümlitzwald				1 Le
Geithain	Langenleuba			(1) Si	(1) Si
Borna	Großstolpen		2j Kru		
	Witznitz	(1?) Fö			
Altenburg	Kammerforst	2j Ki	2j Ki	1 Ki	
	Pahna	(1) G			
	Streitwald			1 Ki, Web	

Wenn auch nicht der gesamte Brutbestand erfaßt wurde, dürften jedoch kaum mehr als 10-12 Paare zu erwarten sein.

108. Wanderfalk - Falco peregrinus

Wenige Beobachtungen, Artbestimmung nicht immer völlig gesichert.

- 1969 21.1. SpW 1 ad. K&St
 1970 18.1. Elbe Stromkilometer 156 1,0 juv. Tu; 17.10. Pegau 1 Ang
 1971 19.9. Falkenhain 1 Kop; 26.10. Dahlen 1 Kel
 1972 8.9. WBr 1 JS; 27.10. SpW 1 (?) Wg

111. Merlin - Falco aesalon

Die wenigen Daten sollen alle aufgeführt werden, auffällig die frühen Meldungen bereits im September 1971!

- 1969 7. und 10.4. 0,1 Grö; 12.1. 1 Erd, 22.1. 1,0 Kel, 15.11. 1,0 Fö, 7.11. 1 Fö
 1970 11.1. 0,1 Kop, 5.1. 1,0 Kel; 24.10. 1,0 Fö, 7.11. 1,0 Fö, 28.11. 1 Fö, 27.12. 0,1 Kop, 27.12. 1 Kel
 1971 24.1. 1,0 Le, 30.1. 1 Leh; 12.9. 0,1 Ba, 26.9. 0,1 Ba, 22.10. 0,1 Le, 24.10. 1 Ba, 21.11. 1,0 Do, 21.11. 1 Kop, 22.11. 1 Mu
 1972 23.1. 1 An, 17.3. 1 Kop; 29.10. 1 An, 19.11. 0,1 Wb

Hauptbeobachtungsgebiete die Feldgebiete der Kreise Delitzsch, Eilenburg, jedoch auch Beobachtungen aus den Kreisen Wurzen, Oschatz und Leipzig.

112. Rotfußfalk - Falco vespertinus

1969 8.6. Schmannewitz 1 Gug
 1971 6.5. Hainholz 0,1 F8, 8.5. Seehausen 1,0 ad. Gr8
 1972 16.-21.8. Werbelin 0,1 juv. Le, 3.9. Freiroda 1 juv. Wb

123. Wachtel - Coturnix coturnix

Übersicht der ermittelten Vorkommen, meist nach rufenden Ex., die nicht alle im Gebiet brüten müssen. Brutnachweise gelangen 1969: bei Luppä, Kreis Oschatz ein Gelegefunde durch L8; Roda-Syhra/Kreis Geithain 5 juv. BB.

	Zahl der Rufplätze in den Kreisen			
	1969	1970	1971	1972
Torgau	2	1	2	12
Eilenburg	-	1	-	6
Delitzsch	3	-	1	5
Wurzen	2	2	3	5
Oschatz	1	-	-	1
Leipzig	5	5	4	3
Grimma	5	-	2	2
Borna	-	2	2	-
Geithain	1	1	1	2
Schmölln	-	-	3	-
Gesamtbezirk	19	12	18	36

Die hohe Zahl für das Jahr 1972 beruht auf intensiver Beobachtungstätigkeit (An und Le).

Rufzeit (Anzahl der rufenden Vögel):		1969	1970	1971	1972
Mai	I	1	-	-	-
	II	1	2	2	-
	III	-	2	6	2

		1969	1970	1971	1972
Juni	I	1	2	3	3
	II	2	2	-	7
	III	16	5	5	7
Juli	I	4	2	2	23
	II	-	2	2	5
	III	-	1	2	2
Aug.	I	-	1	3	2
	II	-	1	1	-
		25	20	26	51

124. Kranich - Grus grus

Aus den Brutgebieten in der Dübener Heide werden für 1969 3 und für 1972 3-4 Paare angegeben (Be, Han, Reinl, Le, Ver, Sei), für die Jahre 1970 und 1971 fehlen genaue Angaben, es fanden jedoch Bruten statt.

Übersicht des Durchzuges

Frühjahr:

1969: 10.-20.3. Oelzschau-Hainichen 10 Die; 29.3. Colditz x Fö
 1970: 15.3. Rötha 3 Fö
 1972: 19.3. SpW 2 ad. 1 juv Kä, St; 15.4. NMT 1 Ver;
 23.4. GÖS 1 Ver; 3.5. GTT 2 ad. 1 juv Le.

Herbst:

1969: 20.8. StH 2 Kop; 19.10. GTT 80 Leh, Richter; 19.10. Domholz 24 Wg; 28.10. Möckern 55 Kre; 5.11. Leipzig 38 Sperhake; 9.11. KLT 4 Dähnert, Leh; 14.11. SpW 7 Kä, St; 18.11. Wöllman, 150 Patze
 1970: 29.6. SpW 1 Kä, St; 24.8.-3.9. Taucha 1 Sei; 28.8. Rb 2 Köhring; 8.9. SpW 1 Kä, St; 17.10. Noitzsch-Krippehna 2 und 7 Grö; 7.11. Krippehna 53 Fö
 1971: 3.10. Bortewitz 11 Kel; 15.10. Wurzen 26 Mü; 26.10. Gerbisdorf 22 Kre; 31.10. Döbeln 58 Schö; 11.11. Döbrichau 70 Zil

1972: 8.9. Dahleener Heide 5 Mü; 8.10. Malkwitz 11 Kel;
20.10. Krippenhna 28 Sei; 22.11. Frohburg 20 EB;
24.11. Schildau 50 Wagner, Mü; 25.11. ES 75 G und
bei Zöbiger 84 Ehr (selbe Ex. ?); 25.11. SpW 29
Kä, St; 26.11. Gruna 7 An; 16.12. Miltitz 9 Sperhake;
17.12. Espenhain 31 Ur.

Rastgebiete in der Dübener Heide (1970 s. Actitis 7)

		1969	1971	1972
Sept.	I	3 Be		18 Be
	II	10 Be		
	III	7 Be, Patze	18 Sei	16 Be
Okt.	I		46 Ver	47 Be
	II	94 Wunderlich		
	III	164 Leh	140 Ver	110 JS
Nov.	I	219 Be	51 Tu	
	II	64 Tu		100 J. Fie
	III	172 Be		29 Be

127. Wasserralle - Rallus aquaticus

Die Brutverbreitung ist noch immer unzureichend bekannt,
gemeldet wurden:

GTT: 1972 Mar, Tu; BeT: 1972 Mar; WBr: 1969 Be, Patze;
1972 mind. 2 Le, Ver; ZBr: 1969 Be, Patze; GÖS: 1969 Ver;
1970 An, Le, Sch; 1971 4 Le, Ver; 1972 mind. 3 Schö; HS: 1971
1 Tu; PrL: 1969 Fö, 1970 Fö; ES: 1969 Brut Fö; 1970 Fö;
1971 Fö; 1972 Fö; IL: 1972 2 Paare, Fö, Sy; DöL: 1970 Erd;
Tongrube Holzhausen: 1969 Brut Erd; LaSchö: 1971 Le, Grö;
HL: 1969 Do; Rb: 1969 Erd; 1970 Oeh; 1971 Oeh; 1972 1 Paar Fö;
BT: 1969 BV EB; 1970 3 EB, Kä, St; 1971 BV EB; 1972 BV EB;
HasT: 1969 2-3 Paare Kä, St; 1970 5 Paare Kä, St; 1971 2 Paare
Fö; 1971 1 Paar Fö; SpW: 1969 2-3 Paare Kä, St; 1970 9 Paare
Kä, St; 1972 1 Paar Fö.

128. Tüpfelsumpfhuhn - Porzana porzana

Beobachtungen aus der Brutzeit:

ES: 26.5.1971 Rufe Fö; Pxl: 21.4. und 14.5.1969 1-2 Fö;
GrE: 23.5.1970 Rufe Grö; HasT: 1969 1 Paar Kä,St; 1970 2 Paare
Kä,St; SpW: 1969 1 Paar Kä,St; 1970 2-3 Paare Kä,St; ET:
29.6.1971 1 EB.

Zugdaten (Anzahl der Beobachtungen)

1969:	17.8.-14.9.	Aug.	II	1	Sept.	II	5 (7 Ex.)
			III	1			
1970:	25.7.-27.9.	Juli	III	1	Sept.	III	1
		Aug.	III	2			
1971:	22.7.-2.10.	Juli	III	2	Aug.	III	2
		Aug.	I	3	Sept.	I	2
		Aug.	II	3	Okt.	I	1
1972:	31.7.-3.9.	Juli	III	1	Sept.	I	1
		Aug.	II	3			

130. Kleines Sumpfhuhn - Porzana parva

Nur Zugdaten! Keine Hinweise auf Bruten!

1969: 24.8. ET 1 EB; 1970: 23.4. SpW 1 Kä,St; 1971: 30.8.
SpW 1 Kä; 1.9. Dahlen 1 verletzt Kel; 2.10. ET 1 EB.

131. Wachtelkönig - Crex crex

Viele Notizen aus der Brutzeit, bedingt durch intensivere
Beobachtungstätigkeit.

Torgau: Graditz, 1969: 1 Paar Leh, Mar; Eulenu, 26./27.5.
1969: 1 Mar; Elbe SW Dautzschen, 4.7.1972: 1 Le;

Eilenburg: westlich Eilenburg, 17.5.1972: 1 An;

- Wurzen: Großzscheпа 1969: 1 Paar Jo, Dietze; Falkenhain 1969: 1 Paar Rauppach, Kop; Thammenhain 21.7.1969: 1 Kop; Lüptitz-Zschorna 4.6.1972: 1 Le;
- Oschatz: Grasteich Dahlen 14.6.1970: 1 Schö;
- Leipzig: Großzschocher 21.-29.6.1969: 1 Ze, 23.5.-8.6.1970: 1-2 Hoy, Fö; 22.5.-10.6.1971: 1 Fö, Hoy; Elsterstausee 3./4.6.1970: 1 Fö; 24.5.-13.6.1972: 1 Fö, Hoy; Clara-Zetkin-Park 12.6.1971: 1 Hoy - sicher Zügler! Stahmeln Schießstand 26.4.-13.5.1969: 1-6 JS, Wb; Polenz 10.5.1969: 1 Wb; Holzhausen Juni 1970: 1 Le; Radefeld 17.5.1970: 1 Wb; Hainholz 25.5.1969: 1 Le, Sch; Imnitzer Lachen 28.6.1970: 1 Kru, Ang; Engelsdorf 18./19.6.1972 1 Le
- Grimma: nördl. Großbothen 1969: 1 Kö; 1970: 2 Kö; 1971: 2 Kö; 1972: 20.5. 1 Le; Forst Nimbschen 2.5.-18.6.1969: 1 Kö; südl. Fuchshain 19. und 27.6.1971: 1-2 Le; westl. Grimma 20.5.1972: 1 Le; SO Otterwisch 2.6.1972: 1 Le südl. Threna 2.6. und 7.6.1972: 1 Le;
- Borna: Nöthnitz 23. und 25.6.1970: 1-2 Kru, Ang; Saasdorf 2. und 12.6.1970: 1 Kru;
- Geithain: westl. Etzoldshain 24.6.1972: 1 Le; Langenleuba-Oberhain 15.5.-17.7.1970: 1 Si; 20.6.1971: 1 Si;
- Altenburg: SpW 15.6.-11.8.1970: 1 Kä, St; Treben 24.5.1970: 1 G.

133. Teichhuhn - Gallinula chloropus

Brutgebiete:	1969		1970		1971		1972	
	Geb.	Paare	Geb.	Paare	Geb.	Paare	Geb.	Paare
Torgau	5 (Leh, Kop, Tu)	14	4 (Tu)	5	5 (Kop, Tu)	6	6 (Leh, An, Mar, Tu)	7
Bilenburg	2 (Ver, Tu)	3	3 (Erd, Schu, Bornack, Tu)	3	2 (Le, Grö)	2	4 (Le, Schu, Tu)	6
Delitzsch			1 (Tu)	1	3 (Le, Grö)	8	4 (An, Le, Grö)	4

	1969		1970		1971		1972	
	Geb. Paare		Geb. Paare		Geb. Paare		Geb. Paare	
Wurzen	3	7	10	15	17	18	8	8
	(Kop, Tu, Grö)		(Erd, Schr, J, Dör, Grö)		(Mü, Le, Kop, Grö)		(Mü, Le, An, Mü, Grö)	
Oschatz	3	3	1	1	2	2	6	6
	(Lö, Kel)		(Tu)		(Le, Tu, Grö)		(An, Le, Lö, Kel)	
Leipzig	16	30	15	32	20	50	16	31
	(Erd, Do, JS, Die, Hb, Grö)		(Erd, Büttner, Gro, Die, Hb, Grö)		(Le, JS, Zi, Do, Erd, Die, Hb, Grö)		(JS, Le, Do, Hoy, Grö, Tu)	
Grimma	3	3	7	13	12	19	9	15
	(Tu)		(Oeh, K8, Tu)		(Le, K8, Oeh, Tu, Zil)		(Le, Tu, Zil, Grö)	
Berna	2	2	7	15	2	3	3	7
	(Erd)		(Erd, Urb, Ludwig, Tu)		(Le, Tu)		(Le, Tu)	
Geithain	1	2	3	6	2	4	1	2
	(EB)		(EB, Tu)		(EB, Tu)		(EB)	
Altenburg	2	26	4	"67"	2	5	2	9
	(K8, St)		(K8, ST, Ludwig)		(Grö)		(Le)	
Schmölln					5	5		
					(Le)			
Döbeln	1	1						
	(Schöd, Rei)							
<u>insg.</u>	38	91	54	(157)	72	122	59	95

(erfaßt wurde sicher nur ein Teil des tatsächlichen Bestandes, der sich auf 150-200 Paare belaufen dürfte)

134. Bleßhuhn - Fulica atra

Übersicht des Brutbestandes (erfaßt wurde nur ein Teil, vgl. Actitis 5 (1971), soweit möglich wurden die Nichtbrüter ausgeschlossen, die oft große Ansammlungen bilden, z.B. StG 1972 12 Brutpaare, 130 Nichtbrüter !)

Kreis	1969		1971		1972	
	Geb.	Paare	Geb.	Paare	Geb.	Paare
Torgau	9 (Tu)	120	14 (Mar,Tu)	148	15 (Le,Leh,Tu)	180
Eilenburg	2 (Tu)	22	8 (An,Le,Tu)	23	8 (An,Tu,Grö)	31
Delitzsch	3 (Tu,Grö)	6	6 (An,Tu)	34	8 (An,Grö,Tu)	45
Wurzen	7 (Tu)	41	17 (An,Le,Tu)	101	11 (Le,Schr,Tu)	59
Oschatz	1 (Tu)	4	9 (Erd,Kö,Le,Grö)	71	12 (Le,Lö,Gug,Kel)	116
Döbeln			4 (An,Le)	7		
Grimma	6 (Tu,Grö)	48	30 (An,Kö,Le,Tu,Grö,Zil)	208	17 (Grö,Le,Fö,Tu)	172
Leipzig	8 (Do,Gro,Grö)	29	11 (An,Le,Gro,Do,Grö)	62	13 (Fö,Hoy,Erd,Do,Wb,JS,Grö)	108
Borna	2 (Grö,Tu)	21	3 (Tu)	18	6 (Fö,Le,Große,Tu)	36
Altenburg	3 (St,Kä,Fö)	63	2 (Fö)	28	5 (Fö)	80
Geithain	3 (EB,G,Kä,St)	86	4 (EB,Tu)	68	3 (EB,Fö,Tu)	37
Insgesamt	44	440	108	770	96	854

Deutlich werden die Schwankungen am Beispiel einiger ausgewählter Gebiete:

	1969	1971	1972
STT	1	10	5
BeT	16	25	17
MtMb	9	8	12
GtK	7	10	5
DotW	7	12	5
GöS	20	77	82
Rb	14	31	37
Hast	18	14	56
ET	60	50	31

Übersicht der Wintervorkommen und des Zuges:

1969	Fl	SpW	Fl	GTT	BT
Jan. I	403 G	4 Kk,St			
II	462 Grö	5 Kk,St	4 Fö		
III	472 Grö	10 Kk,St			
Febr. I	402 Grö	39 Kk,St	12 Fö		
II	400 Grö		5 Fö		
III	414 Grö	4 Kk,St			
März I	250 Grö	100 Kk,St			
II	324 Grö	350 Kk,St	38 Fö		
III	324 Grö	446 G	79 Fö		330 Kk,St
Apr. I	74 Grö	230 Kk,St			260 Kk,St
II	7 Grö	148 Kk,St	10 Fö		212 Fö
III	7 Grö	342 Kk,St			
Mai I		167 Kk,St			
II	1 Grö	101 G			200 Kk,St
III	2 Grö	170 Kk,St		128 Tu	
Juni I		144 Kk,St			
II		180 Kk,St			
III		87 Kk,St			226 Fö
Juli I		81 Kk,St		650 Tu	400 BB
II		143 Fö	7 Fö	815 Tu	717 Kk,St
III	1 Grö	202 Kk,St	38 Fö	1440 Tu	998 Kk,St
Aug. I	7 Tu	369 Fö		1195 Tu	923 BB
II	11 Tu	600 Kk,St	180 Fö	1480 Tu	
III	10 Kri	1400 Fö			597 Fö
Sept. I	15 Grö	1050 Kk,St	409 Fö		352 G
II	31 Grö	1050 Kk,St	659 Fö	1528 Tu	611 Fö
III	40 Kri	2000 Fö		326 Fö	
Okt. I	53 Kri	3092 Kk,St	630 Fö		
II	90 Grö	1611 G	313 Fö	160 Tu	80 Kk,St
III	121 Grö	1000 Fö	300 Fö	22 Tu	30 Kk,St
Nov. I	155 Kri	397 Fö	212 Fö		68 Kk,St
II	168 Grö	420 Kk,St	240 Fö	3 Tu	
III	180 Grö	320 Kk,St			45 BB
Dez. I	447 Grö	400 Kk,St			
II	700 Grö	24 Kk,St	119 Fö		
III	700 Kri		33 Fö		

1970		Fl	SpW	Pl	GTT	RT
Jan.	I	600 Grö				
	II	567 Kri		20 Fö		
	III	576 Grö				
Febr.	I	633 Grö				
	II	657 Grö	1 Kä,St	2 Fö		
	III	571 Tu	47 Kä,St	4 Fö		
März	I	580 Grö	41 Kä,St			
	II	392 Grö	224 Kä,St	6 Fö		240 EB
	III	324 Grö	355 Kä,St	16 Fö	68 Tu	300 EB
Apr.	I	10 Grö	287 Kä,St			290 EB
	II	8 Grö	317 Kä,St		116 Tu	150 EB
	III	2 Grö	407 Kä,St			
Mai	I	2 Grö	392 Kä,St		99 Tu	104 EB
	II	2 Grö	297 Kä,St		87 Tu	87 EB
	III	3 Grö	241 Kä,St		60 Tu	
Juni	I	2 Grö	265 Kä,St			148 EB
	II	2 Grö	360 Kä,St		205 Tu	257 EB
	III		226 Kä,St			361 EB
Juli	I	1 Grö	434 Kä,St			501 EB
	II	2 Grö	531 Kä,St		649 Tu	685 EB
	III	2 Grö	462 Kä,St	9 Fö	780 Tu	790 EB
Aug.	I	2 Grö	516 Kä,St	32 Fö	744 Tu	925 EB
	II		620 Kä,St	68 Grö	1079 Tu	
	III	1 Tu	859 Kä,St	151 Fö	716 Tu	1176 EB
Sept.	I	5 Grö	963 Kä,St	297 Fö	1520 Tu	
	II	24 Grö	324 Kä,St		950 Tu	1500 EB
	III	48 Kri	1120 Kä,St	505 Fö	136 Tu	812 EB
Okt.	I	55 Grö	1500 Kä,St		113 Tu	1000 EB
	II	113 Grö	1199 Kä,St	545 Fö	119 Tu	
	III	134 Ger	925 Kä,St		11 Tu	2000 EB
Nov.	I	170 Ger	1535 Kä,St	770 Fö	17 Tu	735 EB
	II	257 Kri	1150 Kä,St	492 Fö	2 Tu	33 EB
	III	290 Ger	1351 Kä,St	402 Fö		
Dez.	I	300 Ger	698 Kä,St			7 EB
	II	334 Ger	490 Fö	355 Fö		19 EB
	III	491 Grö	521 Kä,St	396 Fö		

1971	Fl	SpW	Pl	GTT	BT
Jan. I	63o Grö				
II	89o Grö				
III	921 Grö				
Febr. I	95o PS				
II	842 Tu	34 G	6 Le		
III	7o3 Grö	4o Le			11 BB
März I	752 Grö				
II	78o Kri	78 G		4 Tu, Le	
III	78 PS			14 Le	
Apr. I	24 Grö	134 Grö		57 Tu	18o BB
II	2 Grö				
III	5 Grö				
Mai I	1 Grö			28 Tu	
II	5 PS	17o Grö			
III	7 Grö			87 Tu	
Juni I	4 PS			136 Tu	
II	3 Grö				
III	1 PS			149 Tu	
Juli I	3 Grö				459 BB
II	4 PS				
III	5 Grö				
Aug. I	4 Grö			1o9o Tu	
II	6 PS	935 Le		1328 Tu	12o5 BB
III	7 Tu	1o87 Le	598 Le		1127 BB
Sept. I	15 Grö	1424 Le	67o Le	178o Tu	
II	41 Tu	182o G		135o Leh	
III	7o PS			1o6o Tu	
Okt. I	158 Grö		8oo Grö	296 Tu	37 BB
II	217 Grö	976 G	739 Le	64 Tu	
III	285 PS		1165 G	87 Tu	
Nov. I	33o PS				
II	371 Grö			39 An	
III	654 Grö	154 G			
Dez. I	7oo Grö				
II	759 Grö	163 G			
III	728 Tu	16o Le	269 Le		94 BB

1972	F1	SpW	P1	GTT	ET
Jan. I	770 Ger	185 F8, Le	306 F8		
II	1174 JS		236 F8		
III	1300 Le, Gr8		84 F8		
Febr. I	1400 Gr8, PS				
II	1350 Gr8	8 F8	98 F8		
III	1339 Gr8		129 F8		
Marz I	1039 JS	118 F8		7 Le	151 EB
II	486 JS	285 F8	108 F8	22 Le, Tu	540 EB
III	157 JS	338 F8		145 Le	550 Le
Apr. I	72 Gr8	150 Olz			
II	36 Ger	208 F8		167 F8	311 F8
III	20 PS				
Mai I	7 PS	284 F8		251 Tu	298 F8
II	8 Gr8			216 Tu	
III	7 PS	150 Olz			240 F8
Juni I	6 PS				284 F8
II	1 Ger	252 F8			324 F8
III	4 Ger	361 F8			
Juli I	6 Ger	300 Olz	39 F8	260 Le	538 F8
II	9 JS	433 F8			
III	11 Tu		130 Le		
Aug. I	16 Gr8	577 F8	185 F8	1629 Tu	516 F8
II	17 Gr8	790 F8	292 F8	2100 Le	578 F8
III	25 JS	680 Le	360 Le		350 Le
Sept. I	39 Gr8	989 F8	610 F8		639 EB
II	106 Tu		804 F8		
III	190 Ger	1418 F8	400 F8	155 J, Fie	170 F8
Okt. I	268 PS	873 F8	317 F8, Tu	193 F8	105 EB
II	351 JS	374 F8	165 F8	134 Tu	83 EB
III	452 Tu		190 F8	73 F8	16 EB
Nov. I	511 JS		310 An		9 EB
II	532 Gr8	191 F8	188 F8	15 Tu	
III	636 Ger	145 F8	150 F8		1 EB
Dez. I	696 Gr8				
II	780 Tu	120 F8	199 F8	2 Tu	
III	1040 Tu		223 F8		

Weitere Ansammlungen waren an zahlreichen Gewässern zu bemerken,
 so z.B. HoS/GöS: Sept. I 1970 387 K8
 Aug. III 1971 1171 Le
 Aug. I 1972 1070 Le.

135. Großtrappe - Otis tarda

Intensive Beobachtungstätigkeit ermöglicht einen relativ guten Überblick des Bestandes.

- Raum I: Wolteritz - Werbelin und Umgebung
 II: Kreuma - Mocherwitz - Krensitz - Krostitz und Umgebung
 III: Liemehna - Mutzschlena und Umgebung
 IV: Krippehna und Umgebung

Beobachtungen 1969:

	I	II	III	IV
Januar	3,1 Kre			
Februar	4,2 Kre			9 Ba, Gerst
März	9,5 Kre			9 Ba
April	9,3 Kre	2,0 Kri	5,3 Kri	
Mai		1,1 Grö, Be	2,3 Grö	
August	1,0 Grö			
September	10 Grö			
Oktober	9,3 Kri			
November			6 Fö, Ba	
Dezember			4 Müller	

Am 13.11. fand Kre 1 totes Ex. - Frühjahrsbestand mind. 10,6

Beobachtungen 1970:

	I	II	III	IV
März	6,2 Kri	0,4 Kri		
April	1,4 Kri	4,2 Sei		
Mai			5,2 Fö	
November	10 Sei			2,9 Fö, JS
Dezember	8,3 Kri			

Außerhalb des Gebietes: 4.1. 8 überfliegen Elsterflutbett (An)
 und 11.2. 1 bei Holzhausen (Le). - Frühjahrsbestand mind. 10,6

Beobachtungen 1971:

	I	II	III	IV
Februar				8 Ba
März	0,1 Kre	10,6 Kri		
April	1,1 Kre	6,9 Kri	6,2 Sei	
Mai	6,2 Kre	1,1 Grö,An		
Juni	5,0 Kre			
Juli	6,0 Kre			
August	10,0 Kre			
September	10,0 Kre			3 Ba
Oktober	10,1 Kre			7,0 Fö
November	10,0 Kre			
Dezember		10,0 Kri		

Im Mai 1 Gelege im Baum I (Kre) - Frühjahrsbestand mind. 12,9

Beobachtungen 1972:

	I	II	III	IV
Januar		10,7 Le		
Februar	1,0 Kre	10,7 An		9,0 Ba
März	1,0 Kre	8,0 An		0,3 Le
April	1,0 Kre	4,6 Kri	5,1 Sei- 3,2 Kre	1,2 Kre,Kri
Mai	2,0 Kre			
Juni	8,1 Kre			
Juli	10,2 Kre			
August	10,2 Kre,Grö			
September	10,2 Grö	3,1 Grö,An		
Oktober	9,2 Kre, Grö	4,5 Kri		3,0 Fö-0,3 An
November	6,5 Kre	9,5 Kri		
Dezember	6,5 Kre	6,5 Kri		4 Ba

Außerhalb des Gebietes: 9.8. - 7.10. bei Lossa 0,1 (Ver).

Frühjahrsbestand mind. 12.7

138. Austernfischer Haematopus ostralegus

Nur eine Feststellung: 3./4.10. SpW 1 St.

140. Kiebitz - Vanellus vanellus

Die Übersicht des Brutbestandes ist unvollständig.

(Brutbestand vermutlich 250-300 Paare)

Kreis	1969		1970		1971		1972	
	Geb.	Paare	Geb.	Paare	Geb.	Paare	Geb.	Paare
Torgau	5	24-29 (Mar, Leh, Ver, Tu)	1	1 (Tu)	8	22 (Le, Leh, Tu)	5	9 (Le, Mar, Tu)
Eilenburg	1	16 (Be)	3	6 (Ver, Dör)			6	9-10 (Ver, Le, Tu)
Delitzsch	160 km ²	100 (Grö)	160 km ²	105 (Grö)	9	19 (Brd, Grö)	5	17-18 (Le, Wb)
Wurzen	1	28 (Kop)	8	38 (Kop, Ver, Tu)	7	26-27 (Mü, Le, Ver, Kop, Tu)	9	25 (Le, Mü, Ver, Grö)
Leipzig	10	41 (Fö, Gro, Grö, Wb, Wei)	11	40 (Hoy, Wei, Fö, Brd, Zi, Gro)	11	60-62 (Wei, Hoy, Brd, Le, Do, Zi, Grö)	15	53 (Krd, Wb, Do, Le, Hoy, Grö)
Grimma	9	9 (Grö, Blü, Ver)	2	3-4 (Kö, Fö)	12	34 (Le, Kö, Fö, Grö)	5	35 (Le, Do, Tu)
Oschatz	5	6 (Kel, Lö)			1	2 (Le)	2	5 (Kel)
Borna	2	3 (Fö, Urb)	4	8 (Kö, Fö, Kru, Ang)	2	4 (Fö)		
Altenburg	3	25 (Kä, St, Grö)	5	31 (Kä, St, Ka)	2	4 (Fö, Ka)	3	50 (Le, Ki, Olz)
Geithain	2	3 (EB, Fö)	1	2 (EB)	2	7 (EB, Tu)	1	3-4 (EB)
Gesamt:	34	ca 258	46	235-236	54	ca 180	51	ca 208

Übersicht des Durchzuges - besonders bevorzugte Rastgebiete sind die Feldfluren der Kreise Delitzsch und Eilenburg. Bei milder Witterung mit wenig Schnee verweilen die Vögel bis in den Januar. (Aufgeführt sind die Maximalzahlen pro Dekade für das gesamte Gebiet).

		1969	1970	1971	1972
Febr.	II			3	
	III		25	200	205
März	I	339	6	5	1463
	II	705	1073	1733	2740
	III	79	2950	330	79
Apr.	I	1000	179	900	135
	II	20	166	70	18
Juni	I	345	75	23	353
	II	348	296	445	538
	III	1513	974	276	365
Juli	I	171	736	1088	1950
	II	2000	936	1047	460
	III	760	900	1280	709
Aug.	I	588	1082	319	1300
	II	686	1039	666	2269
	III	1169	1709	508	3060
Sept.	I	1084	1161	832	2014
	II	2660	3390	991	1655
	III	1600	1940	1908	473
Okt.	I	4240	2900	4730	2303
	II	5220	6130	4740	700
	III	5270	6940	8460	8260
Nov.	I	5450	2590	3290	40
	II	7500	3890	3175	1766
	III	521	518	110	472
Dez.	I	1	1246	28	3474
	II		4472	160	910
	III		91	91	2
Jan. 1972				89	

141. Sandregenpfeifer - Charadrius hiaticula

Zugverlauf normal, 1970 hohe Zahlen im Herbst, max. 32 Bx.
zusammen angetroffen! Übersicht des Zugverlaufes (Maximalzahlen
für das Gesamtgebiet, bevorzugte Rastplätze SpW und KLN.
Beobachter: An, Be, Fö, G, Grö, Kä, Kri, Le, Olz, PS, St, Str, Tu, Wb, Web.)

		1969	1970	1971	1972
März	II				1
	III	3	8		5
Apr.	I	2	2	2	
	II		4	5	
	III		4		5
Mai	II	2			
	III	8	1	1	2
Juli	I	5	2	2	1
	II	2	5		6
	III	1	5		
Aug.	I	1	7		2
	II	2	3	2	1
	III	5	10	4	5
Sept.	I	5	26		4
	II	17	30	11	18
	III	16	57	7	12
Okt.	I	23	59	14	9
	II	10	14	3	4
	III	10	3	4	
Nov.	I	6	3		

142. Flußregenpfeifer - Charadrius dubius

Erfasst wurde nur ein Teil des Brutbestandes, oft werden geeignete Stellen kurzfristig besetzt und nach 1-2 Jahren wieder verlassen, wenn sich das Gebiet verändert. Bruten in Feldgebieten, an Ruderalstellen u.ä. sind somit meist Zufallsfunde.

Ermittelter Brutbestand:

	1969		1970		1971		1972	
	Geb. Paare		Geb. Paare		Geb. Paare		Geb. Paare	
Torgau	5	6	3	5	2	5	3	4
	(Kop, Leh, Mar, Tu)		(Tu)		(Kop, Leh, Tu)		(Le, Leh, Mar)	
Eilenburg	1	2	1	1	1	10	3	9
	(Mar)		(Tu)		(An)		(An, Mar, Tu)	
Delitzsch					2	2	1	1
					(An)		(An)	

	1969		1970		1971		1972	
	Geb. Paare		Geb. Paare		Geb. Paare		Geb. Paare	
Wurzen	4	9	3	12	4	14	4	14
	(Kop,Tu,Ver)		(Dö,Kop,Tu)		(An,Kop,Le) Tu,Ver)		(An,Kop, Mü,Tu,Ver)	
Oschatz							2	2
							(Kel,Lö)	
Grimma	1	1	1	1	8	15	6	13
	(Grö)		(Kö)		(Ha,Kö,Le)		(Le)	
Leipzig	5	7	6	8	9	16	8	15
	(Erd,Grö, Zi)		(Erd,Fö,G, Grö,Hoy,Tu, Wei,Zi)		(Ba,Dö,Erd, Fö,Grö, Le)		(An,Do, Erd,Fö, Grö,Le, Oertner)	
Borna			2	14			3	3
			(Fö,Kä,St)				(Fö)	
Altenburg	2	9	3	9	2	2	2	3
	(Kä,St)		(EB,Kä,ST)		(Fö,Grö)		(Fö,Le)	
Geithain	1	2	1	1			1	2
	(Kä,St)		(EB)				(Fö)	
Bezirk	19	36	20	51	28	64	33	66

Durchzug:		1969			1970		
		SpW	KLN	sonst. Gebiete	SpW	KLN	sonst. Gebiete
März	III				4 Kä,St		
Apr.	I	1 Fö			18 Kä,St		4
	II	1 Fö	2 Grö	12	14 Kä,St		16
	III	2 Wei	1 Grö	14	12 Kä,St		7
Mai	I	1 Fö	2 Wg,Grö	5	7 Kä,St		7
	II	2 Fö	2 Grö	5	4 Kä,St		6
	III	5 Fö	2 Grö	8	5 Kä,St		4
Juni	I	9 Fö	2 Grö	5	2 Kä,St		4
	II			7	1 Kä,St		
	III	2 Fö	1 Grö	2	21 Kä,St		
Juli	I		3 Grö	12	50 Kä,St	14 Grö	41
	II	9 Fö	12 Grö	67	53 Kä,St	15 Grö	67
	III		5 Grö	4	48 Kä,St	21 Grö	32
Aug.	I		6 Grö	28	35 Kä,St	21 Grö	55
	II		4 Grö	14	30 Kä,St	5 Grö	1
	III		4 Grö	7	26 Kä,St	9 Kri	4
Sept.	I		11 Grö	23	12 Kä,St	10 Grö	4
	II	4 Fö	4 Wb	16	10 Kä,St	4 Grö	7
	III	1 Wei	3 Grö,Wb	2	4 Kä,St	3 Kri	
Okt.	I			2	2 Kä,St	3 Kri	

Durchzug:		1971			1972		
		SpW	KLN	sonst. Gebiete	SpW	KLN	sonst. Gebiete
März	II						2
	III					1	19
Apr.	I	2 Grö	2 Grö	22	8 Le	1	54
	II		2 Kri, Grö	6	4 Fö		64
	III		2 Grö	3			32
Mai	I	8 G	2 Grö	2	4 Fö		81
	II	6 G		7			19
	III					4 Grö	10
Juni	I					1 Grö	13
	II				4 Fö		8
	III		6 Grö	8	1 Fö	4 Grö	16
Juli	I		13 Grö	31	21 Fö		47
	II		14 Grö	6	19 Le	7 Le	23
	III	10 Le	7 Grö	63	20 Olz	6 Grö	32
Aug.	I	11 G	3 Grö	30	5 Fö	9 Le	19
	II	19 Le	4 Grö	11	6 Le	4 Le, Grö	19
	III	24 Le		23	5 Le	5 Grö	5
Sept.	I	6 G, Le		3	2 Fö	5 Kri	3
	II	3 G		6			1
	III			10	4 Zill	2 Grö	
Okt.	I			4	1 Fö, Tu		3
	II	1 Frie					

147. Kiebitzregenpfeifer - Pluvialis squatarola

Bemerkenswert vier Frühjahrsbeobachtungen:

1969 2.5. SpW 1 G; 17.5. GrWi Rufe Fö; 1971 16.5. SpW 1 Fö, Grö;

1972 6.-7.5. BT 1 Fö, Le

dazu ein recht frühes Herbstdatum: 1970 12.7. SpW 1 Kä, St

Herbstzug normal, 1969 auffallend hohe Zahlen (besonders SpW!)

		1969	1970	1971	1972
Aug.	II				1
	III	2			
Sept.	I	4	4		2
	II	11	6		1
	III	3	5	3	3
Okt.	I	22	13	14	8
	II	55	16	2	2
	III	29	17	7	5
Nov.	I	22	5	1	
	II	3			
	III	1			

Wieder einzelne Ex. in den Feldgebieten Kreis Delitzsch.

Beobachter: An, Fö, Grö, Hö, Kä, Kri, Le, PS, St, Tu, Web, Wei.

148. Goldregenpfeifer - Pluvialis apricaria

Durchzug normal, bevorzugte Rastgebiete die Felder im Kreis Delitzsch, in geringer Zahl auch an Gewässern (SpW, GTT, ET)

		1969	1970	1971	1972
März	I				1
	II				6
	III		1	55	3
Apr.	I		48		
	II	6	33		
	III	8			
Mai	I	1			
Aug.	II		1		15
	III	1	1		68
Sept.	I	1	5		99
	II	3	4		
	III	4	2	1	42
Okt.	I	4	1	6	77
	II	91	5	281	63
	III	169	116	254	447
Nov.	I	89	216	229	92
	II	155	78	148	52
	III		1		503
Dez.	I		132		

	1969	1970	1971	1972
Dez. II				250
III		1		
Beobachter:	An, Ba, Be, EB, Frie, Fö, G, Ger, Grö, Erd, Kä, Kri, Kop, Hoy, Le, Leh, St, Tu, Ver, Wei.			

150. Steinwölzer - Arenaria interpres

Nur am 14.5.1972 SpW 2 Kä, St.

151. Bekassine - Gallinago gallinago

Übersicht der Brutpaare (nur unvollständig erfaßt):

	1969	1970	1971	1972
GTT			1 Leh	6 Le, Tu
Gehet				1 Mar
Staupitz	BV Leh			
Melpitzer Wiesen	2 Mar		2 Mar	x Mar
Elbarm Rosenfeld			BV 2 Leh	
WBr	10-11 Han			4 Le
ZBr	x Patze			
n. Torfhaus	2 Han			
Noitzsch				1 An
Großeschepa			BV 2 Ver	
MtMb		1 Tu	1 Tu	
KbBr			1 Tu	
Dahlen		BV Kel	BV Kel	
IL	2 Ludwig			
ES		BV JS	BV 2 Wei, Fö	
Papitz				1 An
PrL		2 Fö		
Fuchshain	1 Blü			
GöS			BV K8	1 Le, An
MUT			BV K8	
AS			1 Le	
ET	1 Kä, St			

Durchzug		1969			1970		
		SpW	KLN	sonst. Gebiete	SpW	KLN	sonst. Gebiete
März	I			4			
	III	6 Kä,St		1	8 Kä,St		24
Apr.	I		1 Grö	10	11 Kä,St		62
	II	34 Fö		9	8 Kä,St		34
	III			1	2 Kä,St		
Mai	I	10 Kä,St			2 Kä,St		3
	II	2 Fö					
Juli	I	2 Kä,St			11 Kä,St		4
	II	14 Kä,St	6 Grö	8	10 Kä,St		1
	III	10 Kä,St	7 Grö	2	21 Kä,St	2 Grö	38
Aug.	I	25 Kä,St	10 Grö	2	55 Kä,St	10 Grö	47
	II	40 Kä,St	16 Grö	46	67 Kä,St		34
	III	15 Kä,St	60 Grö	52	170 Kä,St	16 Kri	67
Sept.	I	78 Kä,St	50 Grö	19	180 Kä,St	23 Grö	27
	II	147 Kä,St	70 Kri	67	173 Kä,St	7 Grö	72
	III	120 Kä,St	31 Kri	133	235 Kä,St	21 Kri	250
Okt.	I	124 Kä,St	75 Kri	315	120 Kä,St	21 Grö	150
	II	120 Kä,St	20 Kri	194	135 Kä,St	3 Grö	323
	III	40 Kä,St		26	138 Kä,St		46
Nov.	I	52 Kä,St	1 Grö	19	110 Kä,St G	1 Kri	251
	II	6 Kä,St		41	68 Kä,St		62
	III	1 Kä,St		10	16 Kä,St		2
Dez.	I				11 Kä,St		76
	II				2 Kä,St		30
	III				12 Kä,St		18

Durchzug		1971			1972		
		SpW	KLN		SpW	KLN	
Jan.	I			1	1 Fö,Le		5
	II			2			
	III			1			2
Febr.	I			1			
	II						2
	III			2			
März	I				2 Fö		
	II	1 Fö		14			15
	III		6 An	36	6 Fö	1 An	38

Durchzug		1971			1972		
		SpW	KLN	sonst. Gebiete	SpW	KLN	sonst. Gebiete
Apr.	I	5 Grö	8 An	46	1 Olz	1 An	58
	II		4 An,	62	2 Fö		26
	III		Grö	21		2 An	17
Mai	I	1 G, Fö		4	2 Fö, Le		5
Juli	I			3	2 Fö		1
	II			2	9 Le	5 Le	22
	III	3 Le	1 An	18	18 Le	12 Grö	3
Aug.	I	8 Fö		36	4 Fö	22 Le	16
	II	20 Le	1 Grö	51	26 Le	42 Le, Grö	16
	III	27 Fö, Le	2 An	77	10 Le	28 Le, Grö	88
Sept.	I	40 G, Le	2 An	11	28 Fö	30 An, Grö	5
	II	127 G	2 Grö, 101 An			20 Grö, An	3
	III	61 Fö	6 Grö	82	19 Fö	20 Grö	19
Okt.	I	17 Fö		468	32 An	10 Wg	40
	II	56 G		156	78 Olz		37
	III	43 Fö		312			169
Nov.	I			69			
	II			45	39 Le		17
	III			5	2 Fö		1
Dez.	I	1 Fö		1			2
	II			6			2
	III			8			1

152. Doppelschnepfe - Gallinago media

Auf diese im Feld nicht leicht ansprechbare Art werden folgende Beobachtungen bezogen (Artbestimmung immer sicher?):

1970: 5.5. SpW 1 KÄ, St; 1.8. SpW 1 KÄ, St; 26.9. IL 1 Kru

1971: 8.5. SpW 1 G, Web; 12.7. Wolteritz 1 Kre

1972: 27.10. SpW 1 Wg.

153. Zwergschnepfe - *Lymnocyptes minimus*

Übersicht der Beobachtungen:

	1969	1970	1971	1972
Jan. I				1
Febr. II			1	
III			3	
März II		1	4	2
III	1	3	1	10
Apr. I		4	2	16
II	1	3		5
III			1	5
Mai I			2	2
II	1			
Juli I			1	
Sept. III	1	2	2	
Okt. I	18	8	11	4
II	23	2	3	3
III	17	3		3
Nov. I	12	3		
II	8	1		
III	5	2		
Dez. I	2	1		
II	1	2		
III		2	1	

Hauptbeobachtungsgebiet SpW. Beobachter: Ba, EB, Fö, G, Grö, Ki, Kä, Le, PS, St, Stre, Ver, Wei.

154. Waldschnepfe - *Scolopax rusticola*

Angaben über Brutvorkommen liegen nur wenige vor. Kö (Aquila 4/1975) gibt für die Waldgebiete des Kreises Grimma für 1970-71 10-22 Paare an, für das Wernsdorfer Waldgebiet weitere 4-6. Balzende Vögel wurden ferner notiert 1969: 6.4. und 26.5.

bei Ballendorf je 1 Fö; 1970 südlich Glasten am 27.3. und 12.4. Fö; 1971 nahe Rotes Haus/Dübener Heide 3 Fö; 1972 Colditzer Forst 8.4. 1 Fö; SE Dübener Heide 28.5. 1 Le; Schildauer Berg 4.6. 2 Le; Glastener Forst 24.6. 2 Le; nahe HtW 2 am 6.7. Le; Grunaer Wald am 17.5. 1 An.

Zugbeobachtungen gelangen nur wenige:

	1969	1970	1971	1972
März II	3			2
III	2	1	2	2
Apr. I			1	
III	1			
Aug. III	2			
Sept. I	2	1		
III			1	
Okt. I			1	
II		2	3	
III		3	1	
Nov. I	2	2		
II		1		
III	1			

Winterdaten: 8.1.1969 fand Kop 1 verletztes Stück bei Falkenhain. Fö sah am 18.12.71 1 bei Markkleeberg und am 23.12.72 1 im Colditzer Forst.

156. Großer Brachvogel - Numenius arquata

Brutgebiete: Elbaue Graditz: 1969: 3 Paare (Mar,Leh), 1970 2 Paare (Mar,Tu), 1971: 1 Paar (Leh,Tu), 1972: 1 Paar (Le). Elbaue bei Wörblitz-Proschwitz: 1971 BV 2 Paare (Leh). Außerdem 2 neue Stellen: Melpitzer Wiesen 1971 BV (Mar), hier bereits vor 1945 brütend und südl. Hohenheide 1969 1 brütend (Grö)!

Durchzug	1969	1970	1971	1972
März I	7			
II	2		5	2
III		4		
Apr. I	1	3	17	1
II	12	16	1	2
Mai I	5	11	1	
II		2		
III		1		
Juni II			1	1
III		3		
Juli I		5		2
II	2	2	6	2
III	2	19	1	5
Aug. I	13	37	4	5
II	21	42	1	20
III	32	122	10	81
Sept. I	62	22	5	24
II	37	41	9	2
III	22	18	4	41
Okt. I	71	16	5	4
II	10	10	1	3
III	12		1	1
Nov. I			6	
II	16	1	7	35
III			8	26
Dez. I			1	
II				1
III				4

158. Regenbrachvogel - Numenius phaeopus

Auffallend viel Meldungen, besonders vom SpW (bedingt durch intensivere Beobachtungstätigkeit?):

1970: SpW (Kä,St) 21.-29.7. 1, 2.8. 4, 4.8. 1, 10.8. 2, 25.8. 1, 11.9. 2.

1971: 4.7. Wolteritz 1 Kre; 6., 13., 14., 18., 20.8. SpW je 1 Kä,St; 21.8. Treben 1 G; 4.9. GrGz 1 Fö.

1972: 30.4.-1.5. ET 1 EB; SpW 2.8. 1 St, 13.8. 2 St, 16.8. 1 Web,
24.8. 5 St, 2.9. 2 St, 5. und 8.9. 1 St.

159. Uferschnepfe - Limosa limosa

Auffallend viele Herbstbeobachtungen, die 1970 und 1972 bis in den Oktober reichen. Am 25.4.1969 beobachtete Grö bei Wolteritz 1 balzendes Paar. Besonders im Elbbereich wären hin und wieder Bruten möglich.

Durchzug	1969	1970	1971	1972
März II				1
III	2	12	1	4
Apr. I		1	2	21
II	1	6		10
III	4	3		4
Mai I	5	11	11	5
II		6	1	
Juni I	1			
Juli I		10	1	1
II	2	1		2
III	2	4		2
Aug. I	4	16		2
II		3	2	3
III		15	2	1
Sept. I		7		
II		9	1	1
III		5		3
Okt. I		5		3
II		5		3
III				1

160. Pfuhschnepfe - Limosa lapponica

Nur 1970: 3.9. KLN 5 Grö, 20.9. SpW 1 G, Web, KÄ, St

161. Dunkler Wasserläufer - Tringa erythropus

Durchzug in den einzelnen Jahren sehr unterschiedlich. Es gelangen eine Reihe Junibeobachtungen:

1969: 22.6. Gehet 1 Leh
 1970: 16./17.6. GTT 1 Le, 21.6. G8S 3 Le, Hei, 26.6. SpW 1 Kä, St
 1971: 5.6. ET 1 EB, 20.6. SpW 3 Fö, 22.6. GrR 1 An, 24.6. IL 1 Fö
 17.6. Wolteritz 1 Kre, 24.6. Wolteritz 4 Kre
 1972: 24.6. KLN 3 Grö.

		SpW	1969 KLN	sonst. Gebiete	SpW	1970 KLN	sonst. Gebiete
Apr.	III	1 Kä, St Wei		35	2 Kä, St		5
Mai	I	9 Fö		2	6 Kä, St		5
	II	3 Kä, St					
Juli	I	1 Kä, St			4 Kä, St	1 Grö	
	II	16 Kä, St			26 Kä, St		2
	III	5 Kä, St	2 Grö		32 Kä, St		
Aug.	I	2 Kä, St	1 Grö		44 Kä, St		6
	II	2 Kä, St	7 Kri, Grö	6	7 Kä, St	3 Kri	4
	III	6 Kä, St	10 Grö	15	20 Kä, St	5 Kri	14
Sept.	I	15 Kä, St	6 Grö		60 Kä, St	5 PS	9
	II	9 Kä, St	5 Grö	2	7 Kä, St	10 Grö	11
	III	7 Kä, St		11	12 Kä, St		1
Okt.	I	12 Kä, St		5	18 Kä, St		11
	II	10 Kä, St		5	22 Kä, St		33
	III	10 Kä, St		11	11 Kä, St		2
Nov.	I	3 Kä, St			5 Kä, St		1
	II			7	1 Kä, St		2
Durchzug			1971			1972	
		SpW	KLN		SpW	KLN	
Apr.	I	1 Fö					1
	II			2			
	III						13
Mai	I			7	10 Fö		28
	II	7 G		1			
Juli	I			5			
	II					1 Le, An	1
	III	1 Le		5	2 Le, An		
Aug.	I	1 G		2		2 Grö	
	II	4 Le		4	2 Le	2 Le, Grö	3
	III	10 G		10	9 An	7 Le, Tu	4

Durchzug	1971			1972		
	SpW	KLN	sonst. Gebiete	SpW	KLN	sonst. Gebiete
Sept. I	2 G, Fö, Le		5	9 Fö	2 Grö, An	
II	4 G				11 Grö	
III	5 Fö		1		6 Grö	9
Okt. I			6			7
II			6	3 Fö, Olz		
III			5	2 Wg		5
Nov. II						1

162. Rotschenkel - Tringa totanus

1970 im August am SpW starker Durchzug, sonstige Zugverlauf normal. Interessant eine Reihe Junidaten:

1969: 14.6. KLN 1 Grö; 1970: 21.6. KLN 1 Grö; 1971: 17.6. GrB 1 Zi, 20.6. SpW 2 Fö; 1972: 4.6. Mulde Eilenburg N 1 An, 24.6. KLN 1 Grö.

Zugübersicht:

	1969	1970	1971	1972
März II	2			3
III	15	1		1
Apr. I	2	8		5
II	3	5	1	4
III	7	1		5
Mai I	2	2	1	
II	3	1		
III		1	6	1
Juli I	3	5	9	2
II	7	15		6
III	3	10		4
Aug. I	1	29	1	2
II		47	4	4
III	3	21	8	3
Sept. I	3	4	5	2
II	14	2	5	1
III	1		1	
Okt. I	7			
II	6		1	
III	11		1	

163. Grünschenkel - Tringa nebularia

Zugverlauf normal, jedoch wird bereits für den 10.3.72 1 Ex. für das SpW Web angegeben, ferner auch für diese Art einige Junidaten:

1970: 2., 26. und 28.6. SpW 1 Kä,St; 1971: 9.6. Wolteritz 1 Kre, 13.6. GrR 1 Zi.

Zugübersicht:		1969	1970	1971	1972
März	III	1			
Apr.	I		1		1
	II	6	7	6	5
	III	49	18	14	11
Mai	I	30	21	37	66
	II	8	1	2	4
	III	2	1		
Juli	I	5	13	1	7
	II	21	17	1	31
	III	9	25	12	32
Aug.	I	6	25	13	13
	II	17	20	24	14
	III	20	66	21	18
Sept.	I	44	43	27	9
	II	22	23	8	8
	III	9	10	3	6
Okt.	I	5	26	6	2
	II	8	9	1	2
	III	8	17	4	2
Nov.	I	1	1	1	
	II	2	1	1	

164. Waldwasserläufer - Tringa ochropus

Durch intensivere Beobachtungstätigkeit wurden relativ viel Winterdaten gemeldet: 1970/71: 2.12. ET 4 EB, SpW 1 Kä,St; 3.12. SpW 1 Kä,St; 12.12. ET 2 EB, 13.-24.2. ET 2 EB; 1971/72 2., 4., 12. und 13.12. ET 3 EB, 9.12. Mulde Wurzen 1 Mü, 26.12. ET 2 EB, 12. und 23.12. HoS 1 Le, 2. und 16.1. Mulde Grubnitz 1 Ver, 21.2. Mulde Zschepplin 1 Le, 26.2. ET 1 EB; 1972/73: 1.12. ET 1, 9.12. 4-6, 12.12. 1 EB.

Zugverlauf:

		1969		sonst.	1970		sonst.
		SpW	KLN	Gebiete	SpW	KLN	Gebiete
März	III				3 Kä, St	1 Grö	2
Apr.	I		2 Grö	2	3 G		10
	II		2 Grö	1	2 Kä, St	1 Kri	14
	III		4 Grö	5	4 Kä, St		2
Mai	I			1	1 Kä, St		3
	II				1 Kä, St		2
	III			2	1 Kä, St		1
Juni	I		1 Grö	1			1
	II			1	1 Kä, St		3
	III		1 Grö	5	2 Kä, St		
Juli	I	3 Kä, St		7	4 Kä, St	6 Grö	3
	II	8 Kä, St	1 Grö	10	4 Kä, St	2 Grö	4
	III	2 Kä, St	4 Grö	1	9 Kä, St	2 Grö	3
Aug.	I	2 Kä, St	4 Grö	9	6 Kä, St	2 Grö	8
	II	1 Kä, St	2 Kri, Grö	7	9 Kä, St	2 Grö	
	III	11 Kä, St	4 Grö	2	9 Kä, St	2 Kri	4
Sept.	I	1 Kä, St	3 Grö	4	4 Kä, St	1 Kri	2
	II	1 Kä, St	2 Wb	4	3 Kä, St		
	III			1	1 Kä, St		2
Okt.	I	1 Kä, St	1 Kri	5	5 Kä, St		4
	II	1 Kä, St		2	5 Kä, St		
	III	2 Kä, St			2 Kä, St		1
Nov.	I	1 Kä, St					
	II				1 G		
	III			2			

Durchzug

		1971		1972		
		SpW	KLN	SpW	KLN	
März	I					2
	II					9
	III					10
Apr.	I			19	10 Le	33
	II			5	3 Fö	12
	III			3		4

Durchzug	1971			1972		
	SpW	KLN	sonst. Gebiete	SpW	KLN	sonst. Gebiete
Mai I	1 Fö		2			7
II			1			
III					1 Grö	
Juni I			1			
II			5	4 Fö		2
III		2 Grö	3	4 Fö	1 Grö	1
Juli I	2 G	1 Tu	8	3 Olz		8
II		2 Grö	2	4 Fö	1 Le	11
III	1 Le	1 Grö	8	6 Le		4
Aug. I	10 G		16		2 Le	6
II			8	1 J, Fie	1 Le	15
III	2 G, Fö		9		2 Tu	2
Sept. I	7 Le		1	2 Web		3
II	1 Fö		2		1 An	
III	1 Fö		4		1 An	2
Okt. I			7			3
II			16			
III			14			1
Nov. I	1 Fö		2			4
III			2			3

165. Bruchwasserläufer - Tringa glareola

Im günstigen "Limikolenjahr" 1970 erreicht auch diese Art höhere Zahlen.

Durchzug	1969			1970		
	SpW	KLN		SpW	KLN	
Apr. II	2 Kä, St			1 Kä, St		
III	5 Wei			9 Kä, St		1
Mai I	4 Kä, St	11		8 Kä, St		4
II	40 Kä, St	19			1 Grö	10
III	2 Kä, St	8 Grö	1	1 Kä, St		3
Juni I	1 Fö	1 Grö	1	14 Fö		2
II				22 Fö		2
III	1 Kä, St	8 Grö		30 Kä, St	1 Grö	12

Durchzug:		1969			1970		
		SpW	KLN	sonst. Gebiete	SpW	KLN	sonst. Gebiete
Juli	I	45 Kä,St	41 Grö	4	92 Kä,St	41 Grö	2
	II	35 Kä,St	36 Grö	6	60 Kä,St	30 Grö	41
	III	30 Kä,St	80 Grö		89 Kä,St	6 Grö	46
Aug.	I	30 Kä,St	60 Grö	56	191 Kä,St	48 Grö	358
	II	26 Kä,St	60 Grö	100	134 Kä,St	40 Grö	20
	III	45 Kä,St	70 Grö	40	78 Kä,St	40 Kri	27
Sept.	I	21 Kä,St	30 Grö	7	29 Kä,St	6 Grö	1
	II	17 Kä,St	35 Grö	1	12 Kä,St	6 Kri	
	III	12 Kä,St			6 Kä,St		3
Okt.	I	2 Kä,St	1 Kri	2	2 Kä,Wei	1 Kri	1
	II	1 Kä,St		2	1 Kä,St		
	III				2 Kä,St		
Durchzug:		1971			1972		
		SpW	KLN		SpW	KLN	
Apr.	II						1
	III						21
Mai	I	6 G,Fö		14	15 Fö		44
	II	5 G		28			4
	III		1 Grö	2		3 Grö	13
Juni	I						1
	II	2 Fö			1 Fö		1
	III			1	1 Fö		13
Juli	I	2 Fö	6 Tu	45	18 Olz	7 Grö	43
	II	25 Grö		3	14 Fö,Le	30 Le	20
	III	7 Le	4 An	24	28 Le,An	26 Grö	35
Aug.	I	17 Fö	1 An	15	3 Le	90 Grö	25
	II	15 Le	2 An	42	10 Olz	70 Grö	43
	III	8 G	1 An	50	2 Le,An	25 Le	3
Sept.	I	3 Le		3	2 Fö	3 Kri	
	II	1 Fö		4		2 Grö	
	III	2 Fö		3		1 Grö	
Okt.	I			4			

166. Teichwasserläufer - *Tringa stagnatilis*

Die einzige Meldung (Verwechslung mit *nebularia* ?): 2.9.1971
GrR 2 Zi, liegt zeitlich auch recht spät.

167. Flußuferläufer - *Tringa hypoleucos*

Seit einigen Jahren wieder Brutnachweise:

Mulde Kollau: 1969 Juni, 1970 1 Gelege, 1971 2 Gelege, 1972
2 Paare (1 Gelege) Ver; Mulde Groitzsch: 1972 1 Paar mit juv Le;
von der Mulde nördlich Eilenburg liegen keine Angaben vor.

Durchzug:		1969			1970		
	SpW	KLN	Fl	sonst. Gebiete	SpW	KLN	Fl sonst. Gebiete
Apr. II				2	3 Kä,St		2
III	1 Kä,St			6	4 Kä,St		1
Mai I	4 Kä,St			15	3 Kä,St		6
II	15 Kä,St			14	35 Kä,St 1 Grö	1 Grö	14
III	4 Kä,St 2 Grö			5	1 Kä,St 1 Grö	2 Grö	2
Juni I	1 Kä,St Fö		1 Grö	1	1 Kä,St		1
II	2 Kä,St				1 Kä,St		
III					11 Kä,St		2
Juli I	5 Kä,St		9 JS	5	34 Kä,St		6
II	5 Kä,St 10 Grö	20 PS	8	16 Kä,St 4 Grö	1 Grö	32	
III	25 Kä,St 20 Grö	35 PS	18	101 Kä,St 16 Grö	34 PS	23	
Aug. I	14 Kä,St 15 Grö	30 PS	24	76 Kä,St 16 Grö	26 PS	95	
II	21 Kä,St 6 Grö	20 Kri	76	49 Kä,St 15 Kri	30 PS	21	
III	21 Kä,St 8 Grö	12 PS	43	25 Kä,St 16 Kri	15 PS	29	
Sept. I	11 Kä,St 3 Grö	3 JS	14	16 Kä,St 3 Grö	1 Grö	14	
II	12 Kä,St 3 Grö	2 Grö	3	7 Kä,St 5 Kri	5 PS	13	
III	3 Kä,St 1 Kri	5 Kri	1	2 Kä,St 4 Tu			
Okt. I	1 Kä,St		1 JS	5	2 Kä,St 1 Kri		1
II	2 Kä,St			1	1 Kä,St		1
III					3 Kä,St		

letztes Ex.: 15.11. SpW 2 Hö

Durchzug		1971				1972			
		SpW	KLN	Fl	sonst. Gebiete	SpW	KLN	Fl	sonst. Gebiete
Apr.	II				3				
	III			1 PS	1				7
Mai	I	1 G, Fö	1 Grö		19				16
	II	2 G, Grö		2 PS	3			3 PS	2
	III	1 Fö		1 Grö	6				10
Juni	I				4				2
	II				2				3
	III				3				
Juli	I	1 G	4 Grö	6 Grö	7		1 An		6
	II		2 Grö	14 PS	7	19 Le	8 Le	4 Grö	38
	III	21 Le	12 Grö	19 PS	31	38 Le	16 Grö	32 Le	72
Aug.	I	110 St	5 Grö	25 PS	44	6 Le	35 Le	7 Grö	63
	II	20 Grö	6 Grö	25 Le	65	12 Le	13 Grö	23 PS	87
	III	20 Le		9 Grö	60	4 Le	4 Grö	11 PS	63
Sept.	I	3 Le		5 Grö	17	5 Web	3 Grö	6 PS	3
	II	3 Zi		4 Tu	3				2
	III			1 Tu	4			1 Ger	2
Okt.	I	1 Fö			3	1 Olz			
	II								1

späteste Beobachtung: 7.11. ET 1 EB

169. Terekwasserläufer - Tringa terek

Zwei Nachweise:

23.-27.8.1970 SpW 1 Kä, St, Web, Hö, Fö; 23.5.1971 Gehet 1 Tu.

170. Knutt - Calidris canutus

Recht viele Daten, alljährlich nachgewiesen:

1969: 12.9. SpW 1 Brutkl. Kä, St; 26.10. ES 1 G, Fö, Hoy; 1.-2.11. SpW 1 Kä, St; 1970: 27.8. Elster Zschocher 1 Brutkl. Fö; 26.8.-12.9. und 22.9. 28.-29.9. und 22.10. u. 25.10. je 1 SpW Fö, Hö, Kä, St; 1971: 18.8. SpW 1 Brutkl. Fö; 1.-5.9. SpW 1 Fö, Kä, Frie, St; 1972: 27.8. SpW 3 Brutkl. St, 28.8. u. 10.9. SpW je 1 Kä, St.

171. Zwergstrandläufer - Calidris minuta

Auffallend viel Frühjahrsdaten, Herbstzug 1972 recht stark.
Heimzug: 1970: 15.-16.5. SpW 1 Brutkl. Kä,St; 1971: 17.4.-1.5.,
8.-12.5. SpW je 2, am 10.5. sogar 4 Fö,G,Kä,St,Frie,Str; 8.5.
NMT 2 Ver; 23.5. GeheT 2 Tu; 26.5. Lauer 1 Fö; 1972: 22.5.
Kleinpössa 1 Le

Rückzug:		1969			1970		
	SpW	KlN	sonst. Gebiete	SpW	KlN	sonst. Gebiete	
Juli	II			1 Kä,St			1
	III	3 Kä,St		8 Kä,St			
Aug.	I	3 Kä,St		2 Kä,St			
	II			4 Kä,St	2 Grö		
	III	2 Kä,St	2 Grö	29 Kä,St	25 Kri,Grö	6	
Sept.	I	2 Kä,St	7 Grö	4 42 Kä,St	2 Grö		
	II	10 Kä,St	6 Kri	7 31 Kä,St	4 Kri	2	
	III	8 Kä,St	4 Kri	8 11 Kä,St	8 Tu	3	
Okt.	I	16 Kä,St	12	24 Kä,St	12 Grö	6	
	II	3 Kä,St		3 Kä,St	1 Wg	12	
	III	2 Kä,St	1	3 Kä,St		2	
Nov.	I	2 Kä,St	3	1 Kä,St		1	
letztes Ex.: 1.12. ET 1 EB							

Durchzug		1971		1972	
	SpW	KlN	SpW	KlN	
Juli	II			1 Le	
	III	1 Grö		1 Le	
Aug.	I	1 G			
	II		2	2 Le	6
	III	2 Fö,Le	87 Kä,St	26 Le	2
Sept.	I	1 G,Fö	107 Kä,St	30 Kri	13
	II	5 G	1 115 Kä,St	26 Kri	3
	III	1 Fö	21 Fö	13 Grö	
Okt.	I		1 3 Olz	1 Grö	
	II		2 Olz		
	III		1 Kä,St		

172. Temminckstrandläufer - Calidris temminckii

Normaler Durchzug.

Durchzug:		1969	sonst.	1970	sonst.
		KLN	Gebiete	KLN	Gebiete
Mai	I	5 Kä,St		11 Kä,St	
	II	6 Kä,St		6 Kä,St	
	III	1 Kä,St			
Juli	II	1 Grö		1 Fö	
	III	1 Grö		2 Kä,St	1 Grö
Aug.	I	3 Grö		4 Kä,St	1 Grö
	II		7	1 Kä,St	
	III	5 Kä,St	2 Grö	6 Kä,St	1 Grö
Sept.	I	1 Kä,St	2 Grö	2 Kä,St	
	II	3 Kä,St	2 Grö		
	III			1 Kä,St	
Okto.	I	2 Kä,St			

Durchzug:		1971	1972
		KLN	KLN
Mai	I		
	II	5 G,Grö	
Juli	II		
	III	6 Le	
Aug.	I	5 G,Fö	2 Le
	II	1 Le	2 Le,Grö
	III	3 Fö,Le	1 Le,Grö
Sept.	I	2 Le	1 Kri,Grö
	II		
	III		

174. Graubruststrandläufer - Calidris melanotos

Ein weiterer Nachweis gelang 1970:

3.-5.9. spW 1 Fö,Hö,Kä,St u.a.

176. Alpenstrandläufer - Calidris alpina

Übersicht des Durchzuges (Hauptrastgebiete SpW)

		1969	1970	1971	1972
März	II			1	1
	III	1	1	2	6
Apr.	I		1	4	6
	II	20	2	1	
	III		5		
Mai	I	6	5	5	2
	II		3	13	5
	III	1		1	
Juni	II				1
	III		1	1	
Juli	I	2	8		1
	II	1	5		1
	III	35	9	3	4
Aug.	I	21	24	3	3
	II	3	13	1	8
	III	10	27	9	9
Sept.	I	83	44	6	10
	II	83	64	26	47
	III	99	252	31	101
Okt.	I	323	362	83	102
	II	214	372	64	55
	III	545	185	70	10
Nov.	I	373	184	20	
	II	265	80	10	7
	III	114	25		
Dez.	I		3		
	II		8		
	III		7		1

(Beobachter: An, Fö, G, Grö, Kä, Kri, Le, Olz, PS, St, Wb)

177. Sichelstrandläufer - Calidris ferruginea

1971 gelangen Frühjahrsnachweise: 5., 15., 21. und 22.5. SpW
1 G, Kä, St, Wei und 31.5. GrR 1 Le.

Herbstzug (Hauptrastgebiete SpW und KLn):

		1969	1970	1971	1972
Jul.	II	2	1		5
	III		5		8
Aug.	I		12	3	3
	II	7	1	4	1
	III	41	99	2	5
Sept.	I	15	64		11
	II	4	37	3	
	III	2	10	1	11
Okt.	I	5	17	1	1
	II		1		
	III		1		

(Beobachter: An, G, Fö, Grö, Kä, Kri, Le, St, Tu, Web)

178. Sanderling-Calidris alba

Auffallend viel Feststellungen, jedes Jahr nachgewiesen!

1969: 12.-18.9. SpW 2, am 17. sogar 3 Fö, G, Kä, St; 21.9. HasT
1 Fö; 1970: SpW 30.-31.7. 2, 26.-27. und 31.8. je 1, 7.9. 4,
10.9. u. 4.10. je 1, 6., 7. u. 10.10. 2, 11.10. 1 Fö, Kä, Kru,
Hö, Le, Olz, St; 23.8. KLN 1 Kri; 1971: 27.-28.7. SpW 1 Kä, St;
1972: 10.9. SpW 9 (!) Web, 22.-25.9. SpW 1 Frie, Fö, Kä, St;
22.9. ET 1 BB.

180. Sumpfläufer - Limicola falcinellus

Ebenfalls auffallend häufig beobachtet:

1970: 11.8. bei Serbitz 1 St; dann SpW 26.-27.8. 2, 29.8. 1,
30.8. 4, 31.8. 4-5, 1., 2., 5. u. 6.9. je 1, 7.9. 3, 8.10.15.9.
je 1; ferner KLN 23.8. 1 Kri, 24.-31.8. 4 Kri, Grö, 3.9. 2 und
4.9. 1 Grö; 1971: 21.7. u. 14.8. SpW je 1 St; 7.9. bei Nischwitz
1 Mu; 1972: 2.9. SpW 1 Kä, St.

181. Kampfläufer - Philomachus pugnax

Durchzug		1969	sonst.	1970		sonst.
		SpW	KLN Gebiete	SpW	KLN	Gebiete
März	II	1 Kä, St	1	1 Kä, St		
	III	12 Kä, St		11 Kä, St		
Apr.	I	8 Kä, St	13 Grö	25 Kä, St		1
	II	31 Fö	3	24 Kä, St		6

Durchzug		1969		sonst.	1970		sonst.
		SpW	KLN	Gebiete	SpW	KLN	Gebiete
Apr.	III	14 Kä,St	5 Grö	23	18 Kä,St		1
Mai	I	34 Fö	1 Grö	13	15 Kä,St		19
	II	125 Kä,St		8	2 Kä,St	6 Grö	1
	III	14 Kä,St	9 Grö	6			1
Juni	I	9 Kä,St	4 Grö				
	II		5 Grö	4	4, Kä,St	1 Grö	1
	III	1 Kä,St, Fö	16 Grö		9 Kä,St	6 Grö	2
Juli	I	9 Kä,St	19 Grö		45 Kä,St	7 Grö	
	II	20 Kä,St	51 Grö	14	64 Kä,St	33 Grö	13
	III	10 Kä,St	66 Grö	4	61 Kä,St	9 Grö	
Aug.	I	10 Kä,St	60 Grö		80 Kä,St	33 Kri	102
	II	8 Kä,St	50 Kri	10	82 Kä,St	26 Grö	1
	III	5 Kä,St	60 Grö	9	220 Kä,St	94 Kri	62
Sept.	I	60 Kä,St	28 Grö		106 Kä,St	21 Grö	14
	II	108 Kä,St	37 Grö	37	65 Kä,St	27 Grö	4
	III	100 Kä,St	25 Wb	8	8 Kä,St	15 Kri	11
Okt.	I	96 Kä,St	18 Kri	71	65 Kä,St	22 PS	5
	II	91 Kä,St	8 Kri	23	23 Kä,St		17
	III	2 Kä,St, Fö		9	8 Kä,St		
Nov.	I	9 Kä,St		1	4 G		1
	II			6	1 Kä,St		1
	III				1 Kä,St		
					am 1.12. BT 1 EB		

Durchzug		1971		1972		
		SpW	KLN	SpW	KLN	
Febr.	III			1 Kä,St		1
März	I			1 Frie		
	II			1 Fö		20
	III	13 Fö	1 Grö	23	4 An	7
Apr.	I	7 G	4 Grö	43	30 Le	37
	II	5 Str	16 Kri	16	24 Fö	10
	III		54 An	34		85
Mai	I	19 G, Fö	4 An	86	27 Fö	216
	II	43 G	2 An	14		1
	III			4	3 An	1

Durchzug:		1971		1972		sonst.	
	SpW	KLN	Gebiete	SpW	KLN	Gebiete	
Juni I			1				3
III		3 Grö	1	5 Fö			
Juli I		13 An	10	38 Olz	24 Grö		30
II		3 Grö	7	61 Le	25 Le		4
III		5 An	19	59 Fö	50 Grö		1
Aug. I	26 G	9 An	11		37 Le		
II	8 Le, Grö		18	4 Le	45 Kri		1
III	33 Le		61	30 An	41 Grö		12
Sept. I	27 G, Le		3	42 Fö	39 Grö		
II	19 Fö		30		16 Kri		3
III	9 Fö		5	5 Fö	19 An		39
Okt. I	5 Fö		13	11 Olz	8 Tu		19
II	1 G			22 Olz			4
III	2 Fö		2				2
Nov. I			1				
II				2 Le			

185. Odinshühnchen - Phalaropus lobatus

Jährlich mehrere Ex. festgestellt!

1969: SpW 21.8. u. 28.8. je 1, am 30.8. 2 Kä, St; 1970: SpW 22.7. 1 St, 23.-24.8. 1 Web, Kä, St, HÖ, 8.9. 1 u. 10.9. 2 St; Lache Schöna u 1 juv. am 23.8. Grö; 1971: SpW 20.-21.6. 1 im Brutkl. Fö, Web, St, 11.7. 1 St, 28.8. 1 Le, St, G; GÖS 23. u. 29.8. je 1 Le; BT 3.9. 1 juv EB; 1972: SpW 2.6. 1 Weibchen Körner; KLN 2.9. 1 Grö, Kri

186. Triel - Burhinus oedionemus

1972 beobachtete An im Raum Gottscheina am 7.5. 1 rufenden Vogel und im Herbst am 29.8. 7 und am 25.9. 4 Ex.

189. Skua - Stercorarius skua

SpW 1 am 27.3.1971 (Beleg im Mus. Mauritianum Altenburg)

190. Spatelraubmöwe - Stercorarius pomarinus

1970: 23.8. SpW 1 ad St; 14.-15.11. Pl 1 juv. Fö, Wei, Be, Erd, Kb.

192. Falkenraubmöwe - Stercorarius longicaudus

7.10.1970 GÖS 1 juv. gefangen (Le, Heigel), Beleg im Naturw. Mus. Leipzig.

194. Heringsmöwe - Larus fuscus

Jährlich in geringer Zahl: 1969: 2.8. GrGz 1 juv. (spec. ?) Fö;
1970: 18.4. SpW 1 ad. Kä, St, 7.8. Serbitz 1 juv. Kä, St, 23.8.
SpW 1 ad 1 juv. Hö, Web, 27.-30.8. SpW 1 juv. (spec. ?) Kä, St;
1971: 2. u. 14.7. SpW 1 ad. Kä, St, 24.8. SpW 1 ad 7 juv.!,
25.8. 1 ad. 1 juv. Kä, St, Hö, 23.8. GÖS 4 ad. An, Le, 19.9. SpW
1 ad, 17.10. SpW 1 ad. Kä, St; 23.10. GTT 1 ad. An, Le, 4.12. BT
1 juv. KB; 1972: 18.6. SpW 1 ad. Fö, 2.8. SpW 6 ad. St, 13.8.
1 ad. St.

195. Silbermöwe - Larus argentatus

Ebenfalls jährlich, auffallend oft ad.! 1969: 23.2. Fl 1 juv. Grö,
23.2. Fl 1 juv. Wg, 1.-3.8. GTT 1 juv. Tu, 8.8. SpW 1 ad. Kä, St,
5., 12. und 22.10. SpW 1 ad. Kä, St, 21.10. SpW 1 juv. Kä, St,
23.10. SpW 1 ad. 1 juv. Kä, St, 28.10. BT 1 juv. KB; 1970: 18.4.
SpW 3 ad. 1 juv. Kä, St, 19.6. SpW 3 Ad. Kä, St, 4.8. Serbitz 4 ad.
Kä, St, 10.8. GTT 1 ad. Tu, 27.8. SpW 2 juv. (spec. ?) Kä, St, Hö,
28.8. 3 juv. Hö, 30.8. 1 juv. Fö, 26.9. GrWi 1 juv. Fö, 2.10.
SpW 1 juv. (spec. ?) Kä, St, 7.10. SpW 1 juv. Fö, 11. u. 12.10.
GrWi 1 juv. Fö, Kä, St, 16.10. SpW 1 juv. Kä, St, 22.10. SpW 1 juv.
Kä, St, 8.11. Pl 1 juv. Fö, 15.11. GrWi 1 juv. Fö; 1971: 15.5.
GrGz 1 juv. Fö, 15.5. GÖS 1 juv. (spec. ?) Le, 5.-23.8. Fl 1-4
juv. PS, Le, Grö, 17. u. 21.10. GÖS 1 juv. (spec. ?) Le, 27.10. u.
12.11. GTT 1 juv. Tu; 1972: 27.2. Pl 1 juv. Fö, 2., 5. u. 6.8.
GTT 1 juv. Tu, 1.-5.10. SpW 1 juv. Kä, 25.11. GrWi 1 juv. Fö,
17.12. GrWi 1 juv. Fö.

198. Sturmmöwe - *Larus canus*

Brutangaben fehlen, nur für die Grube Paupitzsch werden brutverdächtige Vögel gemeldet (Le). Mitte Juni 1970 1 Paar (Begattung!) am GTT (Kri)

Zugverlauf in den Jahren 1969-72 (beachte 1970 Apr.-Mail!)

		Fl	GrWi	sonstige Gebiete	ad., juv.
1969					
Jan.	I	3 Erd			0,3
	II	2 Grö		1	1,2
	III	2 Grö			0,2
Febr.	I	8 Erd			
	II	11 Grö			5,6
	III	3 Grö			0,3
März	I	2 Erd			
	II	3 Grö		1	3,1
	III	5 Grö	3 Fö	3	4,7
Apr.	I	1 Erd		2	3,0
	II			10	8,2
	III		20 Fö		20,0
Mai	I		2 Fö	2	4,0
	II			2	0,2
Juni	I		1 Fö		1,0
Juli	II		1 Fö	2	3,0
	III			6	3,3
Aug.	I		1 Fö	2	2,1
	II		6 Fö	1	3,4
	III			1	1,0
Sept.	I			8	8,0
	II	1 Tu			0,1
	III			1	0,1
Okt.	II		2 Fö	1	0,3
	III	3 Grö		3	1,5
Nov.	I			3	1,2
	III	2 JS		1	1,1
Dez.	I	4 Grö			2,2
	II	7 Grö	3 Fö		4,6
	III	4 Grö			1,3

Durchzug:	Fl	GrWi	sonst. Gebiete	ad : juv	
1970					
Jan. I	11 Grö			6	5
II	8 Kri			5	3
III	7 Grö			5	2
Febr. II	1 Grö			1	
III	1 Grö			1	
März II	2 Kri		1		3
III	1 Grö		9	3	7
Apr. I		43 Fö		38	5
II		9 Fö	4	10	3
III			1		1
Mai I		34 Fö		34	
III		1 Fö		1	
Juni II		2 Fö	4	4	2
III		2 Fö	1	1	2
Juli I		8 Fö	1	6	3
II		1 Fö		1	
Aug. I			12	7	5
II			1		
III			4		4
Sept. III			1	1	
Okt. I			1		1
II		2 Fö	3	3	2
III			3		3
Nov. I			5		5
II	3 Grö	2 Fö	3	1	7
III			2		2
Dez. I			5		5
II	3 Grö	6 Ka, St	6	8	7
III	3 Grö				3
Durchzug:	Fl	GrWi		ad : juv	
1971:					
Jan. I	1 Grö			1	
II	2 Grö		2	2	2
März I	1 Le				1
II	1 Kri, Grö		13	2	1
III			3	2	1

1971		Fl	GrW1	sonstige Gebiete	ad : juv	
Apr.	II		2 Fö		2	
Mai	I		4 Fö	2	3	3
	II		2 Fö		1	1
	III		5 Fö		5	
Juni	I		2 Fö		2	
	II		3 Fö		2	1
	III		2 Fö		2	
Juli	II		1 Fö	1	1	
	III			16	13	3
Aug.	I	1 Brd				1
	II			1	1	
Sept.	I			3	1	2
	II			4		2
Okt.	I			4	1	3
	II			2	2	
	III			9		7
Nov.	I			3	1	2
	II		5 Fö	3	4	4
	III			3		3
Dez.	I	4 Le		1	1	3
	II	8 Le	3 Fö	1	3	9
	III	12 Le			2	10
Durchzug		Fl	GrW1		ad : juv	
1972: Jan.	I	8 PS, Ger		2	3	6
	II	11 Le	2 Fö		1	12
	III	4 Grö, Le		1	3	2
Febr.	I	8 Grö		6	4	7
	II	4 Brd, Grö		5	3	6
	III	1 JS, Grö	2 Fö		2	1
März	I	2 JS		4	1	2
	II	1 Le, GÖ		9	8	2
	III	1 JS		8	6	3
Apr.	I		1 Fö	2	3	
	II			1		
	III			23	20	3

1972:		Fl	GrWi	sonst. Gebiete	ad : juv	
Mai	I		1 F8	10	4	3
Juni	I	1 PS	1 F8			1
	III			3		
Juli	I		1 F8	22	20	
	II			24	23	1
Aug.	I		1 F8	2		1
	II		1 F8	1		1
	III			15	10	5
Sept.	II		1 F8			
Okt.	I			1		1
	II		5 F8			
	III	2 Gr8	1 F8	4	3	2
Nov.	I	1 Tu	5 An		1	5
	II	3 An	5 F8	3		4
	III	2 Gr8	3 F8			2
Dez.	I	3 Tu		7		3
	II	1 Tu	2 F8	3		1
	III	11 Tu			1	10

199. Schwarzkopfmöwe - Larus melanocephalus

Weitere Beobachtungen: 28.7.1970 SpW 1 ad St; 25.7.1971 Grube Paupitzsch 1 ad Le; 9.7.1972 Grube Paupitzsch 1 ad An.

---. Dünnschnabelmöwe - Larus genei

F8 sah am 23.5.1971 an der Grube Großzössen 1 ad. Beobachter kennt die Art von seinen Auslandsreisen. Eine genaue Beschreibung liegt vor.

200. Lachmöwe - Larus ridibundus

Brutvorkommen: BT 1969: 200 Paare, 1970: 400 Paare, 1971: 250-300 Paare, 1972: durch Wassermangel nur 3-4 Paare BB.

SpW 1970: 65 Paare Kä,St; 1972: 500 Paare Fö; GrWi: 1970 mind. 11 brüten Fö, 1971: 200 Paare Fö, 1972: ca. 600 ad, nur 45 brüten Fö, GrR-La Schö: 1969: 133 Nester 29.6. 159 juv. Grö, 1970: 4 Nester, 20.6. 3 Paare mit pull. Grö, KLN 1970: 3 Nester, 1972: 400 ad, 30 Nester, pull.kommen im Schlamm um Grö.

Zugverlauf einiger ausgewählter Gebiete:

	ES	Fl	SpW	GTT	GrWi
1969:					
Jan. I		100 Grö			
II		212 JS			
III		300 Grö			
Febr. I		300 Grö			
II		180 Grö			
III	2 Fö	280 Tu			
März I		50 Erd	50 Kä,St		
II	1 Fö	552 JS	230 Kä,St	2 Tu	3 Fö
III	70 Fö	700 Tu	200 Kä,St		30 Fö
Apr. I	16 Fö	400 Erd	163 Fö		
II	70 Wei	66 Grö	100 Kä,St		
III		89 Grö	300 Kä,St		100 Fö
Mai I		3 Grö	670 Fö		
II		10 Grö	110 Kä,St		
III		16 Grö	100 Kä,St	1 Tu	
Juni I		66 Grö	170 Fö		
II		21 Erd	100 Kä,St		32 Fö
III	5 Fö	38 Erd	600 Kä,St		
Juli I		58 Erd	200 Kä,St	1 Tu	
II	62 Fö	260 Grö	300 Kä,St	91 Tu	58 Fö
III	45 Fö	567 Erd	600 Kä,St	593 Tu	
Aug. I	25 Fö	589 Erd	925 Fö	437 Tu	661 Fö
II	85 Fö	720 Tu	600 Kä,St	26 Tu	357 Fö
III	298 Fö	350 Erd	550 Fö,St		
Sept. I	190 Fö	600 Grö	200 Kä,St		
II	50 Fö	1000 Erd	400 Kä,St	10 Tu	
III		350 Erd	800 Kä,St		

1969:	BS	Fl	SpW	GTT	GrWi
Okt. I		760 JS	800 Kā,St		
II		618 Grö	1050 Fö	345 Tu	13 Fö
III		600 Grö	400 Kā,St	100 Tu	100 Brd
Nov. I	1900 Fö	480 JS	650 Kā,St		1500 Fö
II		400 Grö	600 Kā,St	54 Tu	
III		454 JS	50 Kā,St		
Dez. I		150 Kri	10 Kā,St		
II		200 Grö			
III		250 Grö			

Zug 1970:	BS	Fl	SpW	GTT	GrWi
Jan. I	3 Fö	332 JS			
II		308 G			
III		243 G			
Febr. I		200 Grö			
II		359 Tu			
III		140 Tu	9 Kā,St		
März I	3 Fö	200 Grö	6 Kā,St		
II	1 Fö	500 Grö	514 Kā,St		
III	210 Fö	500 Grö	420 Kā,St		
Apr. I	26 Fö	450 Grö	600 Kā,St		3100 Fö
II	40 Fö	150 Grö	296 Kā,St	4 Tu	
III		16 Brd	253 Kā,St		
Mai I	14 Fö	2 Grö	182 Kā,St	16 Tu	
II		6 Grö	126 Kā,St		
III		35 Grö	75 Kā,St		
Juni I		4 Grö	266 Kā,St		
II		30 Grö	1524 Kā,St	7 Tu	
III			305 Kā,St		
Juli I		37 Grö	324 Kā,St		
II		216 Grö	813 Kā,St	189 Tu	
III		323 Grö	1024 Kā,St	899 Tu	
Aug. I		1 Grö	1140 Kā,St	748 Tu	15 Fö
II			434 Kā,St	1347 Tu	
III		8 Brd	2800 Kā,St	324 Tu	

Zug 1970:		BS	Fl	SpW	GTT	GrWi
Sept.	I		60 Grö	2300 Kä,St	8 Tu	45 Fö
	II		192 Grö	500 Kä,St	19 Tu	
	III		150 Kri	2500 Kä,St	81 Tu	250 Fö
Okt.	I		126 Brd	2000 Kä,St	42 Tu	
	II		500 Grö	562 Kä,St	203 Tu	58 Fö
	III	160 Fö	400 Grö	852 Kä,St	150 Tu	
Nov.	I		180 JS	600 Kä,St	135 Tu	
	II		525 JS	4500 Kä,St	730 Tu	450 Fö
	III	19 Grö	1000 Grö	280 Kä,St		
Dez.	I		300 Grö	65 Kä,St	26 Tu	
	II		800 Grö	83 Kä,St	5 Tu	75 Kä,St
	III		150 Grö	77 Kä,St		52 Fö
Zug 1971:		BS	Fl	SpW	GTT	GrWi
Jan.	I	11 Fö	400 Ger			
	II		215 Grö			
	III		141 Grö			
Febr.	I		185 Tu			
	II	39 Fö	100 Grö	32 G	7 Tu	6 Fö
	III		140 Grö	17 Fö		3 Fö
März	I		220 JS			
	II	60 Fö	337 JS	275 G	150 Le	725 Fö
	III	69 Fö	378 JS	250 Fö	190 Le	79 Fö
Apr.	I	3 Grö	128 Grö	500 Grö	2 Tu	
	II		19 Grö			995 Fö
	III		27 PS			
Mai	I	20 Brd	8 Grö	23 Fö	13 Tu	700 Fö
	II	20 Grö	27 PS	9 Fö		400 Fö
	III		28 PS		25 Tu	450 Fö
Juni	I		21 PS		150 Tu	2100 Fö
	II		37 PS			600 Fö
	III		83 PS			350 Fö
Juli	I		319 Grö			120 Fö
	II		945 PS			
	III		450 Ger			

Zug 1971:		ES	Fl	SpW	GTT	GrWi
Aug.	I		754 Grö	271 G	989 Tu	
	II		1450 PS		960 Tu	
	III		1500 Ger	766 G		78 Fö
Sept.	I		1415 Grö	60 Fö	1114 Fö	118 Fö
	II	500 Fö	1500 Grö	50 G	3970 Le	
	III	150 Fö	225 Ger	30 Fö	110 Fö	
Okt.	I	37 Fö	460 Ger	63 Fö	117 Fö	660 Fö
	II	27 Fö	474 Tu	83 G	1340 Tu	27 Fö
	III	1530 Fö	822 Tu	557 Fö	612 Tu	
Nov.	I		1090 Ger	82 Fö		
	II	36 Fö	425 JS		1300 Tu	5 Fö
	III		860 JS	14 G		
Dez.	I		500 Ger	29 Fö		
	II	56 Fö	650 Le	21 Fö	37 Tu	1 Fö
	III	95 Le	500 Le	16 Le		
Zug 1972:		ES	Fl	SpW	GTT	GrWi
Jan.	I	45 Fö	800 Grö	25 Le		
	II		1100 Le			
	III		850 Le			
Febr.	I		650 Ger			
	II		300 Grö		131 Le	
	III		400 JS		17 Le	
März	I	45 Fö	464 Grö	280 Fö	121 Le	
	II	115 Fö	500 Grö	185 Fö		17 Fö
	III	8 Grö	500 JS	65 Fö	43 Tu	
Apr.	I	80 Fö	50 PS	40 Olz	3 Le	285 Fö
	II	75 Fö	87 Ger	90 Fö	46 Fö	
	III	158 Fö	35 Ger	200 Olz	110 Le	600 Fö
Mai	I	3 Fö	20 PS	1100 Fö	166 Tu	
	II		21 PS		55 Tu	
	III		13 Grö			
Juni	I	11 Fö	15 Ger			58 Fö
	II		15 Ger	1670 Fö		
	III		146 Ger	600 Fö		171 Fö

Zug 1972:	ES	Fl	SpW	GTT	GrW1
Juli I		286 Ger	1200 Fö		
II		432 Erd	1900 Fö		73 Fö
III		369 Grö	2060 Fö		
Aug. I		38 Grö		2430 Tu	11 Fö
II		57 Grö	150 J.Fie	2417 Tu	
III		210 Grö			
Sept. I		486 Grö	300 Fö		
II		600 PS			167 Fö
III	14 Grö	98 Grö	4 Fö		670 Fö
Okt. I	5 Wg	402 Grö	120 Tu	18 Fö	
II		375 PS	220 Fö	74 Tu	105 Fö
III		640 Tu		165 Tu	
Nov. I		1000 Tu			
II		950 Tu	2000 Le	164 Tu	
III	1500 Fö	720 Tu			
Dez. I	1500 Fö	900 Tu		30 Mü	
II		725 Tu	12 Fö		
III		800 Tu			10 Fö

201. Zwergmöwe - Larus minutus

Regelmäßiger Durchzügler in z.T. beachtlicher Anzahl (besonders 1972!) Bevorzugte Rastgebiete SpW, BT, GTT.

Zugverlauf	1969	1970	1971	1972	ad:juv
Apr. II			3	14	11,6
III		5	1	16	14,8
Mai I	16	14	12	56	43,39
II	1	5	11	6	2,21
III		2	2	3	2,5
Juni I				2	0,2
II		2	2	2	0,6
III			1	9	2,8
Juli I			1	2	0,3
II				5	0,5
III		3		1	0,4

Zugverlauf	1969	1970	1971	1972	ad:juv
Aug. I	10	8	2	2	5,15
II	6	8	3	61	3,75
III	6	14	37	58	2,89
Sept. I		3	17	1	1,17
II	3	1	2		0,4
III		1			0,1
Okt. I			1		0,1
II		2			0,2
Nov. II				1	0,1
III			2		0,2
Dez. I				2	1,1
III				2	2,0

205. Trauerseeschwalbe - Chlidonias niger

Durchzug normal, Hauptrastgebiete SpW, BT und GTT. Beobachter: An, Bb, J.Fie, Fö, G, Grö, Hoy, Kä, Kri, Le, Leh, Olz, St, Tu, Wei, Zil und BB.

Zugverlauf:	1969	1970	1971	1972
Apr. III	40	2	2	51
Mai I	111	119	23	100
II	48	23	36	24
III	38	20	61	55
Juni I	6	9	6	9
II	8	8	11	4
III		15	6	
Juli I		12	2	13
II	8	15	43	12
III	42	19	7	16
Aug. I	95	151	13	17
II	12	56	8	37
III	28	78	12	46
Sept. I	11	20	3	13
II	10	65	6	2
III	2	6	2	
Okt. I			1	

206. Weißflügelseeschwalbe - Chlidonias leucoptera

Auffallend 2 Herbstdaten! 1969: 26.5. GTT 1 Fö; 1970: 7.8. ET 1 juv. EB; 1972: 3.9. SpW 1 Kä, St.

207. Weißbartseeschwalbe - Chlidonias hybrida

Vom 1.-7.5.1972 ET, SpW und Schw 1 Fö, Frie, Kä, St, ferner für den 18.6.72 SpW nochmals 1 Ex. angegeben (Kä, St)

208. Lachseeschwalbe - Gelochelidon nilotica

25.7.1970 SpW 1 ad. Fö, Kä, St.

209. Raubseeschwalbe - Hydroprogne caspia

Jährlich an größeren Gewässern: 1969: 17.9. SpW 2 Frie; 1970: 12.7. SpW 1 ad. Kä, St, 8.9. SpW 2 ad. Kä, St; 1971: 23.5. GTT 1 ad. Tu; 24.-26.8. SpW 1 ad. Kä, St, Hö, 15.9. ET 1 ad. 1 juv. EB 1972: 23.4. GTT 1 ad. An, Le, 23.7. SpW 1 ad. St, 2.9. SpW 3 ad. 1 juv. St.

210. Flußseeschwalbe - Sterna hirundo

Schwacher Durchzug, meist ad.: 1969: 18.7. GTT ad. Tu, 30.7. GTT 6 u. 1 Tu; 1970: 4.7. 1 ad. Kri, 11.7. 2 ad. Tu, 26.7. 1 ad. 1 juv. Tu, 27.-28.7. 1 juv. Tu, 3.8. 1 ad. Tu, ET 25.7. 1 EB, SpW 8.5. 1 ad. Kä, St; BS 24.8. 1 Fö; 1971: 2.6. GÖS 2 ad. Tu, 20. u. 23.6. ET 1 ad. EB, 11.9. ET 1 EB; 1972: 25.6. Grimma 1 ad. Zil.

214. Zwergseeschwalbe - Sterna albifrons

1970: 25.7. SpW 1 ad. Fö, Kä, St, 27.7. Regis 1 Ang, Kru, 14.8. SpW 1 schlicht Kä, St; 1971: 14.7. ET 1 EB; 1972: 19.9. SpW 1 ad. Kä.

215. Brandseeschwalbe - Sterna sandvicensis

Am 22.5.1972 Grube Rückmarsdorf 2 ad. (Beitr. z. Vogelk. 21 (1975) S. 159-160)

225. Hohltaube - Columba oenas

Notizen aus der Brutzeit: Torgau: 1972 Pflückuff 1 Le;
 Oschatz: Dahlemer Heide 1970 und 1972 je 2 Gug, L8,
 Wermisdorfer Forst 1972 1 An, Le; Grimma: Colditzer Forst
 1969 3 F8, 1970 6 F8, 1971 5 F8, K8, 1972 8 F8, Le; Geithain:
 Stöckigt 1970 EB, Frohburg 1970 EB; Altenburg: Pahnna-Forst
 1969 1 F8, 1970 4 K8, St, 1971 nicht gemeldet, 1972 3 F8 (nach
 Le 4), Kämmereiforst 1970 1 G.
 Zugtrupps werden für 1972 gemeldet für den 7.5. für Langenleuba-
 Oberhain 22 Si und den 3.9. für Sachsendorf 20 An.

226. Ringeltaube - Columba palumbus

Winterdaten sind (noch ?) selten: 19.12.1970 nördl. Krippenhna
 2 F8; 14.-24.1.1972 Südfriedhof Leipzig 1-6 An, Le.
 Starke Zugtrupps werden für den 7.10.1970 560 Ex. F8 und
 1.4.1972 450 Ex. An gemeldet.

227. Turteltaube - Streptopelia turtur

Die Übersicht der Brutpaare (meist nach rufenden Vögeln ermit-
 telt) ist auch für das Jahr 1972 noch sehr unvollständig.

	1969	1970	1971	1972
Kreis Torgau		3	11	55
Eilenburg	4	1		38
Delitzsch				1
Oschatz	25	2	1	12
Wurzen	1	1		10
Leipzig	1	1	5	6
Grimma	8	10	22	18
Geithain	2	2	4	2
Borna		1	4	5
Altenburg	5	4		2
erfaßter Bestand	46	25	47	145

Bevorzugt die Kiefernheide, in östlichen Gebieten auch in
 Feldgehölzen nördl. Muldenaus. In der Elster-Luppenaue (Laub-
 wald) nur sehr vereinzelt.

229. Kuckuck - Cuculus canorus

Als Pflegearten wurden notiert:

	1969	1970	1971	1972
Teichrohrsänger	3	7	4	9
Gartenrotschwanz	1		2	
Hausrotschwanz		1		
Bachstelze	2	1		1
Sumpfrohrsänger		2		
Neuntöter		1		1

(Ang, Do, Gro, Ka, Kop, Kru, Ku, Mar)

232. Schleiereule - Tyto alba

Übersicht der Brutplätze (soweit nicht anders vermerkt nach Angaben von An, Do, Le, die sich besonders 1971 sehr intensiv um diese Art bemüht haben):

Torgau: Mockritz (1971 14.7. 4 juv., 19.9. 10 juv.; 1972 1.7. 3 juv.), Wohrlau (1971 25.6. 1 juv.), Neußen (1971 26.6. 2 juv.)

Filenburg: Doberschütz (1972 7.8. 6 juv. Ku), Hohenprießnitz (1972 28.8. 4 juv. Ku), Wildschütz (1972 13.9. 4 juv. Ku), Liemehna (1972 rufend)

Delitzsch: Schenkenberg (1969 Hu)

Leipzig: Seifertshain (1971 9.6. 4 juv., 19.9. 9 juv.; 1972 17.6. 7 Eier, 25.7. 3 juv.); Liebertwolkwitz (1971 14.6. 7 juv.; 1972 2 juv.), Baalsdorf (1972 rufend), Oberholz (1971 Paar 1 juv. Blü), Holzhausen (1972 1 ad., keine Brut), Knautkleeberg (1 juv. tot Hoy)

Wurzen: Lübschütz (1971 19.6. 1 juv.), Püchau (1972 1), Gerichshain (1972 rufend), Burkartshain (1972 28.7. 7 Eier)

Oschatz: Ganzig (1971 13.6. 5 juv., 12.9. 3 juv. Teu; 1972 6.8. 4 juv. Teu); Lampersdorf (1971 19.6. 7 juv., 12.9. 7 juv. Teu); Lampertswalde (1971 18.6. 5 juv., 12.9. 7 juv. Teu, 1972 6.8. 5 juv. Teu); Hof (1971 12.9. 7 juv. Teu), Laas (1971 11.6. 3 juv. Teu), Sörnewitz (1971 19.6. 1 juv., 1972 1 ad. Teu)

Merkwitz (1971 19.6. 2 juv., 12.9. 5 juv. Teu; 1972 6.8. 3 juv. Teu), Wellerswalde (1972 6.8. 4 juv. Teu), Luppä (1972 rufend), Calbitz (1972 rufend).
Grimma: Köhra (1970 Blü), Rohrbach (1971 30.5. 4 juv., 1972 rufend); Schönbach (1971 12.8. 4 juv.), Albrechtshain (1971 21.6. 3 juv., 1972 1.7. 5 juv.), Mutzschen (1971 4 juv. Kö), Zschoppach (1972 1.7. 2 juv.), Fuchshain (1972 rufend), Threna (1972 rufend).
Borna: Oelzschau (1971 1.7. 5 juv.), Trages (1.7. 3 juv.)
Döbeln: Gallschütz (1971 11.7. 5 juv.), Knobelsdorf (1971 14.7. 2 juv. 19.9. 3 juv.); Jahna (1971 6.7. 5 juv., 19.9. 6 juv.); Sitten (1971 10.6. 5 Eier, 3 juv.); Schrebitz (1971 17.6. 8 juv.).
Altenburg: Windischleuba (1969 4 Paare Kä, St; 1970 4 Paare Kä, St), Flemmingen (1972 16.9. 8 juv. Ki).

238. Steinkauz - Athene noctua

Aufgeführt sind alle gemeldeten Angaben (die Art ist recht selten geworden!) 1969 Windischleuba (Altenburg) 1 Paar Kä, St; bei Canitz (Wurzen) Li; Dahlen (Oschatz) 3 juv. Kel, Lö; Kirchturm Schöna (Eilenburg) 2 juv.! Stl.
1970 Windischleuba (Altenburg) 1 Paar, Brut ? Kä, St; Prösitz (Grimma) Kö; Groitzsch Pegauer Str. (Borna) Ang, Kru 1971 nördl. Eilenburg 3 juv. Schu; Prösitz (Grimma) Kö; Falkenhain (Wurzen) Okt.-Nov. Kop; Beuden-Mocherwitz (Delitzsch) 1 Totfund 26.6. Wb; Wurzen Nov. Mü; Langenleuba-Oberhain (Geithain) Brut Si; LPG Frohburg (Geithain) EB; Schlauditz (Altenburg) 4 juv. Ka
1972: Langenleuba-Oberhain (Geithain) Brut? Si; Frohburg (Geithain) EB.

239. Waldkauz - Strix aluco

Obwohl sicher nur ein Bruchteil des tatsächlichen Bestandes erfaßt wurde, sei eine Übersicht gewagt (die auffällig hohen Zahlen für Leipzig beruhen sicherlich auf die Konzentration der Beobachter in diesem Raum)

	1969	1970	1971	1972
Kreis Torgau	1			3
Eilenburg	2		3	1
Delitzsch	keine Meldung!			
Oschatz	2		2	1
Wurzen				1
Grimma	2	7	10	5
Döbeln	1			1
Leipzig	14	13	13	24
Borna	1	1		6
Altenburg	1	4		3
Geithain				3
	24	25	28	48

242. Waldohreule - Asio otus

Zu der Übersicht der Winteransammlungen von J. Schmidt, Actitis 8 (1974) kann nachgetragen werden:

- 1969: Döbeln 2.2. 28 Ex. Rei, Schöd; Mockau 12 u. 15 J. Fie;
Groitzsch max. 37 Ludwig; Grube Witznitz Febr. 4 Fö
- 1969/70: Groitzsch 41 Ang, Kru
- 1970/71 Mölkau 24.1.-6.3. max. 6 Oertner; Markranstädt 14.2.
23 Zi; Knautkleeberg 31.1. 17 Hoy; Lindenthal 26.11.
25 Wb;
- 1971/72 Groitzsch 26.2. 42 Große; Knautkleeberg 30.1. 26 Hoy;
Friedhof Borna 5.2. 20 Ur; Mölkau 31.1. 12 Le;
Südfriedhof Leipzig 18.1. 42 Le; Taucha Kriekauer
Siedlung 25.2. 7 Le

Die folgende Übersicht der Brutvorkommen ist sicher noch unvollständiger als dies beim Waldkauz der Fall ist.

	1969	1970	1971	1972
Kreis Torgau	1	1	1	7
Eilenburg				1
Delitzsch	keine Meldung			
Oschatz			2	2
Wurzen		2	1	1
Grimma		2	1	2
Leipzig	2	2	6	8
Borna	3	1	3	
Altenburg		2		

	1969	1970	1971	1972
Kreis Geithain			1	3
	6	10	15	24

243. Sumpfohreule - Asio flammeus

1969: 25.-26.4. SpW 1 Ki, KÄ, St; 23.12. Scherbelberg Leipzig 1 Do.
 1970: 22.3. u. 12.4. ES je 1 Wei, Hoy; 3.4. Ziegelteich Bachefeld
 2 St; 28.5. Nötnitz/Borna 2! Frank, Arndt; 8.11. Knautkleeberg
 1 vergesellschaftet mit otus Hoy; 20.12. GrWi 2 KÄ, St.
 1971: 11.2. ET 1 EB; Grube Kulkwitz 17.1.-11.2. 1-10 Ex. Zi, Do
 1972: Grube Kulkwitz 30.1.-17.2. 1-5 Ex. An, Le; 25.11. Hain/
 Borna 1 Fö; 13.12. Gerbisdorf 1 Kre; 24.12. Werbelin 1 Kre.
 (vielleicht identisch).

244. Rauhfußkauz - Aegolius funereus

Die im Heft 10, S. 58 für das Gebiet zwischen Wildenhainer
 Bruch und Pressel (18.5.1969) erwähnten Rufe sind nach Rück-
 sprache mit D. Förster dem Waldkauz zuzuschreiben, er hörte
 die gleichen Rufreihen später bei Markkleeberg und konnte den
 rufenden Vogel ansprechen.

245. Nachtschwalbe - Caprimulgus europaeus

Balzfliegende Vögel wurden vermerkt:

1969 Lindenvorwerk/Geithain EB; 1970 Ochsenaal/Oschatz 1 Kop,
 Falkenhain/Wurzen 3 Kop; 1971 Ochsenaal/Oschatz 1-3 Kop,
 Pressel/Eilenburg 1 Fö, Schmannewitz/Oschatz 2 Gug; 1972 Le
 meldet für den Kreis Torgau: Staupitz 1, Belgern 2, Pflückuff
 3, Döbrichau 1, Dahlenberg 1; Grimma: Glasten 1; Wurzen:
 Tresenwald 1; Oschatz: Luppä 1-2, Dahlen 1; Eilenburg: Pressel
 2, ferner Flößberg/Geithain 1 EB, Wöllnau/Eilenburg 1 An,
 Noitzscher Heide/Eilenburg 2 An, Rotes Haus/Eilenburg 2 Tu.

249. Bisvogel - Alcedo atthis

Zur Brutzeit angetroffen: 1969 Wyhra im Krs. Geithain EB, Groitzsch/Borna Ludwig; 1970 Benkenteich/Torgau Mar, Wyhra Krs. Geithain EB, Großzscheпа/Wurzen Kop, Langenreichenbach/Torgau Kop, Kollau/Wurzen Dör, DL/Wurzen Ser, HtGr/Grimma KÖ 1971: Eythra Entenlache/Leipzig Wei, KiTW/Oschatz Tu, Bennewitzer Teiche/Torgau Mar, Pflückuff/Torgau Leh; 1972: Zöschau/Oschatz Schönn, Wyhra Krs. Geithain EB, IL/Leipzig 2 Paare Fö, Langenreichenbach/Torgau Kop, GTT u. Gehet/Torgau Le, KiTW/Oschatz Le, Mulde nördl. Wurzen Le, BeT/Torgau Tu,

Übersicht der Zugbeobachtungen:

	1969	1970	1971	1972
Jan	6	6	1	1
Febr.	8	2	1	2
März	6	3	-	8
Apr.	-	2	1	3
Juli	4	3	4	7
Aug.	4	7	2	15
Sept.	20	10	7	15
Okt.	18	12	14	15
Nov.	13	9	1	5
Dez.	3	6	1	13

251. Blauracke - Coracias garrulus

Lediglich zwei Zugdaten: 26.8.1970 Kieritzsch S 1 Fö und 6.6. 1971 GrWi 1 Fö.

252. Wiedehopf - Upupa epops

Brutzeitdaten: 1970 30.5. Groitzsch/Borna 2 Fra; 1972: 12.5. u. 30.5. Schmannewitz/Oschatz 1 rufend Hummel u. Gug, 5.7. Döbrichau/Torgau 1 Paar mit 2 flüggen juv. Le, 5.7. BeilrodeW/Torgau 1 rufend Le.

Die Zahl der Durchzugsbeobachtungen ist sehr gering:

1969: 12.4. - 26.4. (n 3 p 3) u. 16.8. - 19.9. (n 2 p 2)

1970: 11.4. - 19.4. (n 4 p 4) u. 27.7. - 24.8. (n 3 p 3)

1971: 10.4. - 9.5. (n 2 p 2) u. 6.8. 1 Ex.

1972: 15.4. - 3.5. (n 3 p 4) u. 19.7. - 14.8. (n 4 p 4)

Beobachter Ang, Fö, Fra, G, J. Fie, Kä, Kop, Mü, Le, Leh, Si, St u. EB

254. Grauspecht - Picus canus

Die Vorkommen konzentrieren sich auf wenige Gebiete, die Anzahl der Beobachtungen ist nicht sehr groß.

Fleissen-Elster-Aue von Altenburg bis Leipzig:

1969: Pannaforst (Laubwaldgebiet mit Alteichen u. -buchen)

im Frühjahr u. Herbst 2 rufende Ex. Fö; Rötha 2.2. 1 Männ. Fö;

Rosental-Leipzig 23.3. 1 Kri (hier sicher keine Brut!),

Markkleeberg 6.3. 1 Weib. Fö; 1970 Panna-Forst 2 Paare Fö, Kä, St;

Haselbacher Teiche 17.5. Fö, Grube Witznitz 18.4. Fö; Rötha 26.9.

Fö; 1971: Panna-Forst 1-2 rufende Ex. Fö; Rüdigsdorf BV Frie;

1972: Panna-Forst 1 rufendes Ex. Fö, Le; Haselbacher Teiche 31.3.

1 Männ. Fö; Lauer/Leipzig 19.11. Fö; Markkleeberg 9.1. Fö.

Vorkommen im Kreis Geithain: 1970 ET 5.7., 11.7. u. 19.9. jeweils

1 Ex. EB, Deutsches Holz Kä, St; Streitwald Kä, St; Langenleuba-

Oberhain 17.-18.4. rufend Si; 1972 Langenleuba-Oberhain 18.3.

u. 19.11. je 1 Si; Deutsches Holz 24.9. rufend Fö; ET 19.3.-15.9.

EB, Zill; Rüdigsdorf ganzjährig Frie; Schöna 3.6. 1 EB; Le gibt

für den 7.5. für die ET 3 Männ. an!

Vorkommen im Kreis Altenburg (teilw. isoliert):

1969: Lödla 7.11. 1 Männ. Oel; 1970: Kammerforst 1 Kä, St;

Leina-Forst 1 Kä, St; 1971: 28.3. Kammerforst 1 Fö.

Vorkommen im Kreis Grimma (Colditzer Forst, Umgebung von Grimma; zu erwarten im Grenzgebiet zum Kreis Oschatz im Wermsdorfer Forst, vielleicht auch Muldengebiet zum Kreis Döbeln):

1969: Colditzer Forst 25.1. 1 Fö, Ebersbach 29.3., 2. u. 15.6. Fö;

1970: Ebersbach 10.5. 2 rufend Fö; Colditzer Forst 19.9. Fö;

1971: Döbener Wald 15.3. rufend Zill; Naunhof NW 29.3. 1 rufend

Grö; Nimbschen 10.4. 1 KÖ; 1972: Colditzer Forst 4.3., 8.4.

11.6. u. 8.10. rufend Fö; ferner im W. Teil 29.4. u. 24.6. Le;

30.4. östl. Fremdiswalde Weib. rufend Le.

Vorkommen im Wermsdorfer Forst (Kreis Oschatz).

1969: 4.5. DrT Männ. Tu; 1970: ZtW 5.5. rufend Tu; 1972: KiTW 3.9. Weib. An;

Vorkommen im Kreis Torgau (Nähe Torgau, Schildau, weitere Gebiete im Kreisgebiet zu erwarten): 1970: GTT 7.10. Weib. Tu; 17.10. Fö; GeheT 1 Fö; 1972: GTT 2.4. Männ. Le; Schildau 3.5. rufend Le.

Im Kreis Döbeln dürfte die Art vermutlich noch an verschiedenen Stellen zu erwarten sein, gemeldet wurde nur für 1971 Hochweitzschen 13.2. u. 12.3. 1 Ex. u. 1 Paar durch Pog.

Im Kreis Eilenburg in den Bruchgebieten: 1972: 1.10. Zadtitzbruch 1 Männ. Zi, 29.10. Wildenhainer Bruch rufend Fö.

255. Schwarzspecht - Dryocopos martius

Regelmäßig nur in den größeren Waldungen, die noch für die Brut erforderliche ältere Bäume aufweisen: Pannaforst 1 Paar; Colditzer Forst (1970 fehlend?); Dahleener Heide (1971 fehlend?), Pflückuff/Torgau (1970, 1972) BTT/Torgau (1970, 1972), Wermsdorfer Forst (1969, 1970, 1972), hier wohl 2-3 Paare; Dübener Heide 2-3 Paare 1972.

Ferner Beobachtungen zur Brutzeit: 1969: Leipzig, Connewitzer Holz, Eichholz; 1970: Connewitzer Holz, Nimbschen/Grimma; 1971: Klosterbuch/Döbeln, Döben/Grimma, Seidewitz/Grimma, Müncherholz/Grimma; 1972: Connewitzer Holz, Deutsches Holz/Geithain, Tresenwald/Wurzen, Thierbach/Borna (Brut), Schildau, Naunhof, Schkeuditz S, Thümlitzwald (2 Bruten)

Beobachter: An, Fö, G, Grö, Kä, Kö, Lö, Mar, Pog, St, Tu.

(---. Blutspecht - Dendrocopos syriacus)

Eine Beobachtungsmeldung - 6.10.1972 Wbr Männ. Zi, ist wohl nicht als sicherer Nachweis zu werten.

257. Mittelspecht - Dendrocopos medius

Die Brutvorkommen decken sich meist mit denen des Grauspechtes!
Die Zahl der ermittelten Brutpaare ist gering!

Elster-Pleisse-Auen: 1969: Pannaforst, Groitzsch (Brut ?), Markkleeberg, Zöbiger, Lauer, Connewitzer Holz. Aus anderen Gebieten keine Beobachtungsmeldungen! 1970: Pannaforst, Zöbiger, Markkleeberg, Lauer (2 Paare), Connewitzer Holz (mindestens 5 Paare), Rosental (Brut ?); 1970: Pannaforst, Groitzsch; 1972: Pannaforst, Lauer (4 Paare!), Connewitzer Holz (mindestens 4 Paare), Hainholz (1 Paar). Außerhalb dieses Gebietes nur angegeben für: Döbeln (1971 Februar), Langenleuba-Oberhain (1971 Nov.), Westewitz/Döbeln (1972 Dez.), Streitwald/Geithain (1970) Die Art ist an Eichen gebunden, auf Vorkommen außerhalb des Auwaldbereiches ist besonders zu achten.

259. Kleinspecht - Dendrocopos minor

Bevorzugt lockere Gehölze, größere Parks u.ä., gern an Birken, fehlt meist in größeren Waldgebieten. Übersicht der gemeldeten Vorkommen (Bestand unvollständig erfaßt):

	1969	1970	1971	1972
Kreis Torgau	2	-	5	4
Eilenburg	-	-	-	3
Delitzsch	-	1	-	-
Oschatz	-	-	2	2
Grimma	-	1	3	6
Wurzen	1	-	1	2
Leipzig	3	5	2	10
Döbeln	-	-	2	-
Borna	-	1	-	1
Geithain	-	4	2	1
Altenburg	3	8	3	1
=	9	20	20	30

261. Wendehals - Jynx torquilla

Im Auwaldbereich von Leipzig seit Jahren fast völlig verschwunden, Konzentration der Brutvorkommen in den Kiefernheiden. Brutzeitdaten liegen vor für 1969 Groitzsch/Borna, Pannaforst/Altenburg, GTT/Torgau, Ballendorf/Grimma, Markranstädt/Leipzig (5 juv. Do); 1970: IL 1-2 Paare, Ammelshain/

Grimma, Colditz/Grimma, Dahlen/Oschatz (7 juv. L8), LT/Wittenberg, BT/Geithain, Deutsches Holz/Geithain, Pannaforst/Altenburg, Kammerforst/Altenburg, Haselbacher Teiche/Altenburg, Wilchwitzer Teiche/Altenburg; 1971 LT/Wittenberg, BT/Geithain, Nimbschen/Grimma, GTT/Torgau, Langenleuba-Oberhain/Geithain, Markranstädt/Leipzig (6 juv. Do), Zeuckritz/Oschatz (5 juv. L8), Schkeuditz/Leipzig (Weib. mit Brutfleck Gro); 1972: Grube Witznitz/Borna (2 F8), Colditzer Forst/Grimma (2), BT/Geithain, Markranstädt/Leipzig (2), GTT/Torgau, BTT/Torgau, Naunhof E/Grimma (3 An, Le) Pannaforst/Altenburg (2), Pressel/Eilenburg, Schildau W/Torgau; Prellheide (5.7. juv. Le).

Ferner beringte Ku bei Lausig/Eilenburg Bruten mit

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	juv.
1969	n			1	2	2	3	3	1		
1970				2	2	2	4	4	1	1	
1971				1	1	1	5	1	3	3	ferner 1 Brut 12 juv.!
1972		2	1	2	3	2	1	4	4	2.	