Die Böden Mecklenburg-Vorpommerns: Bildung, Potenziale und Gefährdung

Christel Baum & Peter Leinweber

Professur für Bodenkunde
Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät

- 1. Einführung: Boden = Naturkörper & Ressource**
- 2. Grundlagen der Bodenbildung in M-V**
- 3. Übersicht über die häufigsten Bodentypen, ihre Potenziale (mit eigenen Forschungen)**
- 4. Gefährdungen der Bodenpotenziale und Schlußfolgerungen für Bodenschutz & Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit**

1. Einführung: Boden = Naturkörper & Ressource

Definition „Boden“ = Teil der belebten, oberen Erdkruste

- ... Naturkörper
- ... Lebensraum
- ... Teil von Ökosystemen
- ... Komponente von Standorten

... 3-phasig, polydispers, oberflächen-aktiv, offen + dynamisch

2. Grundlagen der Bodenbildung in M-V

Vereisungsgrenzen und Lößverbreitung (punktiert) in
Mitteleuropa (nach Brinkmann 1990)

Elster (= Mindel) Saale (= Riß) Weichsel (= Würm)
780-330 TJ.v.h. 300-130 TJ.v.h. 115-10 TJ.v.h.

Pleistozäne und holozäne Ausgangsmaterialien der Bodenbildung

Sedimentäre Lockergesteine
der glazialen Serie:

- Geschiebemergel (Pl.)
- Geschiebesande, -lehme (Pl.)
- Sandersande (Pl.)
- Talsande, Torfe (Hol.)

2. Grundlagen der Bodenbildung in M-V

Geologische Karte von Mecklenburg-Vorpommern Übersichtskarte: Boden

Topographische Orthorektifiziert Geologische Karte Oberflächenerhebung

Bodengesellschaften der Moore

- 17 Moore
- 18 Moore

Bodengesellschaften auf anthropogen veränderten Flächen

- 20 Sand-Lehm-Fein-Schluff-anthropogene Böden
- 21 Sand- und Schluffeisen, antriebslos flugschuttig und Deponien, sehr heterogen
- 22 Grünland

Legende

Bodengesellschaften auf vorherrschend sandigen Sedimenten des Alt- und Jungmoränengebietes

- 1 Regosole (Schicht, Redox-Oxy)
- 2 Regosole
- 3 Regosole (schichtlos, Redox-Oxy)
- 4 Regosole
- 5 Gleye
- 6 Gleye
- 7 Gleye
- 8 Braunerden
- 9 Braunerden
- 10 Podsole

Bodengesellschaften auf vorherrschend sandigen lehmigen, schluffigen und tonigen Sedimenten des Alt- und Jungmoränengebietes

- 11 Sand-Feinlehm-Lehm-Sandregosole (Sandregosole) / Lehm-Parabraunerden-Pseudogleye (Sandregosole)
- 12 Glimmersand- und Schluffeisen-Parabraunerden, z.T. mit mäßigem Staunässeanteil, eben bis hügelig
- 13 Sand-Feinlehm-Sandregosole (Sandregosole) / Lehm-Parabraunerden-Pseudogleye (Sandregosole)
- 14 Fahlerden
- 15 Parabraunerden
- 16 Parabraunerden (Sandregosole)
- 17 Lehm-Parabraunerden-Pseudogleye-Parabraunerden (Sandregosole)
- 18 Glimmersand, meist kalkreich, mit mäßigem, humosem Staunässeanteil, eben bis hügelig
- 19 Sand-Feinlehm-Sandregosole (Sandregosole)
- 20 Kalksand (Kalkregosole)
- 21 Kalksand und Glimmer mit starkem Relief (z.T. gestrichelt), mit mäßigem Staunässeanteil, hügelig bis hügelig, sehr heterogen, steinig
- 22 Lehm-Parabraunerden-Pseudogleye (Sandregosole)
- 23 Kalksand und Glimmer mit starkem Relief (z.T. gestrichelt), mit mäßigem Staunässeanteil, hügelig bis hügelig, heterogen, steinig
- 24 Lehm-Parabraunerden-Pseudogleye (Sandregosole)
- 25 Lehm-Parabraunerden-Pseudogleye (Sandregosole)
- 26 Kalksand und Glimmer mit starkem Relief (z.T. gestrichelt), mit Staunässeanteil oder Grundwasseranteil, hügelig bis hügelig, heterogen, steinig
- 27 Lehm-Parabraunerden-Pseudogleye (Sandregosole)
- 28 Lehm-Parabraunerden-Pseudogleye (Sandregosole)
- 29 Lehm-Parabraunerden-Pseudogleye (Sandregosole)
- 30 Lehm-Parabraunerden-Pseudogleye (Sandregosole)

Pseudogleye

- 21 Pseudogleye (Schicht)
- 22 Pseudogleye (Schicht)
- 23 Pseudogleye (Schicht)
- 24 Pseudogleye (Schicht)
- 25 Pseudogleye (Schicht)
- 26 Pseudogleye (Schicht)
- 27 Pseudogleye (Schicht)
- 28 Pseudogleye (Schicht)
- 29 Pseudogleye (Schicht)
- 30 Pseudogleye (Schicht)

Bodengesellschaften der Auen

- 31 Sand-Lehm-Fein-Schluff-Pseudogleye (Sandregosole)
- 32 Sand-Lehm-Fein-Schluff-Pseudogleye (Sandregosole)
- 33 Sand-Lehm-Fein-Schluff-Pseudogleye (Sandregosole)
- 34 Sand-Lehm-Fein-Schluff-Pseudogleye (Sandregosole)
- 35 Sand-Lehm-Fein-Schluff-Pseudogleye (Sandregosole)
- 36 Sand-Lehm-Fein-Schluff-Pseudogleye (Sandregosole)
- 37 Sand-Lehm-Fein-Schluff-Pseudogleye (Sandregosole)
- 38 Sand-Lehm-Fein-Schluff-Pseudogleye (Sandregosole)
- 39 Sand-Lehm-Fein-Schluff-Pseudogleye (Sandregosole)
- 40 Sand-Lehm-Fein-Schluff-Pseudogleye (Sandregosole)

Stand: 1995

Anlage:

Mittlere Ackerzahlen der Gemeinden des Landes Mecklenburg-Vorpommern (nach Ergebnissen der Bodenschätzung)

	Landesgrenze		< 24
	Kreisgrenzen		24 - 27
	Gemeindegrenzen		28 - 30
	Kreisstädte		31 - 37
	Stand- und Fließgewässer		38 - 44
	Wald (>10km²)		> 45

Quellen:
 Topographie: Arc-Deutschland 500, ESRI GmbH
 Wald: CORINE - Daten zur Bodendecke für die neuen Länder und Berlin
 Statistisches Bundesamt Wiesbaden
 Verwaltungsgrenzen: Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern
 Stand: 01.01.2000
 Kartoinhalt: Gemeindegrenzen des Datenspeichers Boden (GEMDAT)
 - Bearbeitung 2001

2. Grundlagen der Bodenbildung in M-V

Schema: Zeitliche Abfolge der Bodenbildung infolge fortschreitender Verwitterung, Versauerung und Verlagerungsprozesse

3. Übersicht der Bodentypen

Ah/C-Böden

Ah/C-Bodentypen unterschieden nach Carbonatgehalt und Ausgangsgestein der Bodenbildung (Fest- oder Lockergestein)

Regosol (Ah/IC): carbonatfrei, regelhaft vorhanden auf Dünen

Rendzina (Ah/cC), aus festem oder lockerem Carbonatgestein (≥ 75 M.-%), regelhaft vorhanden auf Schreiekreide Rügen

Pararendzina (Ah/eC), aus carbonathaltigem (2 bis 75 M.-%), festen oder lockeren Kiesel- oder Silikatgestein

Pararendzina Kieswerk Perniek

Pararendzina als Resultat der Bodenerosion

Resultat der Erosion: Verarmte Kuppen mit starkem Bodenverlust

Braunerde (Ah(p)/Bv/C)

Entwicklung: vorwiegend aus Quarz- und Silikatgesteinen unter gemäßigten Klimabedingungen

Bodenbildende und profilprägende Prozesse:

Verbraunung: Freisetzung von Eisen bei der Verwitterung von Mineralen, Anlagerung Eisenoxide an Bodenpartikel führt zu typischer Braunfärbung

Verlehmung: (1) Verwitterung von silikatischem Ausgangsmaterial, (2) Neubildung von Tonmineralen, (3) Änderung des Korngrößenspektrums von grobkörnig-sandig zu lehmig

Lessivés: Parabraunerde (Ah/AI/Bt/(Bv)/C) Fahlerde (Ah/Ael/Bt/C)

Unterscheidung nach Tongehaltsdifferenzen abhängig v. % Ton-Schluff

Tonverlagerung = **Lessivierung**

Tonverarmung (AI) und Ausbleichung (Ael)

Teilprozesse: (1) Dispergierung, (2) Transport, (3) Ablagerung d. Tonteilchen

Voraussetzungen: (1) weitgehende Entsalzung und Entkalkung, hoher Anteil quellfähiger Tonminerale (2) schnelles Sickerwasser, Grob- und Mittelporen, Wechselfeuchte (Schrumpfrisse), (3) Ablagerung wenn einer o. mehrere Faktoren nicht mehr wirksam

Boden des Jahres 2006 FISBo BGR
Fahlerde - Albeluvisol Fachinformationssystem Bodenkunde der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

■ Kerngebiete der Fahlerde, vergesellschaftet mit Bänderparabraunerden und Braunerden
■ Parabraunerden und Fahlerden, je nach regionaler Ansprache*) und Differenzierung
■ Verbreitet Podsol-Braunerden und Bänderparabraunerden, gering verbreitet Fahlerden

*) Die Begriffe Fahlerde und Parabraunerde werden vielfach auch synonym verwendet

Quelle: Digitales Archiv FISBo BGR: BÜK 1000, Vers. 2.0 (Stand 2000)

Podsole

Klassische Podsolierungstheorie:

3 Teilprozesse:

- (1) Mobilisierung
- (2) Transport: niedermolekulare organische Verbindungen (aus unvollständiger Abbau) bilden mit Al und Fe Komplexe
- (3) Fällung

Ah

Ae

Bh

Bs

C

Beispiel:

Profil - Darß (unter Fichte) auf reinem S (Ss), bodenchemische Parameter

Horizont	Tiefe	pH CaCl ₂	C _{org}	TOC %	Al _t	Fe _t	Fe _d /Fe _t	¹ C _p /Fe _p	Al _o g/kg	Fe _o g/kg	P _o mg/kg	DPS %
Ah	0..15	2,4	9,3	2,9	1,6	1,3	0,83	-	0,36	0,17	23	9
Ae	15..27	2,8	2,4	1,9	0,4	0	-	-	0,27	0	10	7
Bh	27..41	3,1	5,4	3,8	5,1	0,7	0,29	44	4,5	0	121	5
Bhs	41..110	3,7	0,8	3,2	3,9	1,6	0,38	16	2,4	0,11	71	5
ICv	>110	4,1	0,3	4,6	3,5	2,5	0,42	-	1,5	0,11	77	8

C_{org} in m-%

TOC % = % Heißwasserextrahierbarer C_{org} an Gesamt C_{org}

Al_t und Fe_t ... Gesamtgehalte an Aluminium und Eisen in g kg⁻¹

Fe_d/Fe_t = Anteil pedogenes Fe an gesamt Fe

¹Pyrophosphat-extrahierbarer C und Fe (C_p/Fe_p: >10 = Bh; <3 = Bs; 3..10 = Bhs o. Bsh

Al_o, Fe_o, P_o = oxalatrextrahierbare = schlecht kristalline pedogene Oxide in: pro kg Boden

DPS% = Phosphorsättigungsgrad pedogener Al und Fe (Oxalatrextrakt) (Wald: 5..15, Acker 15..30)

- Ah** **Podsol unter Fichte
auf dem Darß**
- Ae** (Analysendaten siehe
vorherige Folie)
- Bh**
- Bhs**
- ICv**

Besonderheit: Tschernosem in MV (Ap/Axh/eIC) >4 dm

Voraussetzungen und bodenbildende Prozesse:

- kalkhaltigen, lockeres Ausgangsmaterial: Löss
- Klima: kontinental mit kurzem, feuchtem Frühjahr & heißem, trockenem Sommer, kalte Winter
- Steppenvegetation
- Mullhumus-Bildung, Krümelgefüge durch eingeschränkten Streuabbau (aus Vegetation) im trockenen Sommer bzw. kalten Winter
- starke Bioturbation (kalte Winter), Wühltätigkeit von Kleinsäugetern („Krotowinen“), Einmischung humosen Materials aus Axh in Unterboden bzw. Unterbodenmaterial in Axh
- Fruchtbarste Böden, aber oft Bewässerung nötig (durch kontinentales Klima)

Voraussetzungen in MV nicht gegeben – trotzdem Tschernosem vereinzelt vorhanden

Terrestrische anthropogene Böden: Kolluvisol

Kolluvisol **Ah/M/II ... Ah + M > 4 dm**, regelhaft &
typisch in Ackerflächen weit verbreitet

Wassererosion als wichtige Ursache der Kolluviation

Differenzierung der bodenbiologischen Aktivität

Seit 1999 pfluglose Bearbeitung an stark erosionsgefährdetem Standort

Pararendzina (Kuppen)

Kolluvisol-Gley (Senken)

Dehydrogenaseaktivität als Indikator bodenmikrobieller Aktivität

Infolge pflugloser Bearbeitung: Tiefgründige biologische Aktivität auch in Kuppenlage (gekoppelt mit hoher Regenwurmaktivität), allerdings deutlich geringer als in der Senkenposition (Kolluvium)

Stauwasserböden

Wechselfeuchte Böden, Redoximorphose durch gestautes Niederschlagswasser; dadurch Marmorierung, d.h. Rostflecken und benachbarte Bleichzonen sowie schwarze Mn-Konkretionen

Pseudogley **Ah/Sw/Sd/C**

Haftpseudogley **Ah/Sg/C**

Regelhaft weit verbreitet in der Grund- und Endmoräne, vergesellschaftet mit Parabraun- und Fahlerden, drainiert für Ackernutzung, gehören zu den besseren Ackerböden, **verdichtungsgefährdet!**

Fahlerde-Pseudogley unter Buchenmischwald, Endmoräne bei Züsow

Semiterrestrische Böden (Auen, Gleye):

Auen:

Böden der Flußtäler, kaum redoximorphe Merkmale
MV vor allem im Elbetal und einige kleinere Flussniederungen; ansonsten meist Moore in die Flußniederungen

Gleye: Entstehung unter Einfluß O₂-armen Grundwassers

(Ah/Go/Gr): anhydromorphe Horizonte < 4 dm; **Go** mit >10 % Rostflecken, **Gr** stets mit Reduktionsfarben (grau, graublau, graugrün) und bis zu 5 % Rostflecken auf Wurzelbahnen

Kolluvisol-Gley Pölchow (Subtypen regelmäßig vorhanden in Senkenbereichen von Äckern)

Natürliche Moore

Böden aus Torfen (>30 % OS; > 30 cm) und Organomudden (bei < 20 cm mächtig: Moorgley)

Klassifikation nach *Profilaufbau/Veränderungen* in Natürliche Moore // Kultivierte Moore, weiter nach **Bildung** (Nieder- // Hochmoor) bzw. **Art der Kulturmaßnahmen**

In MV hauptsächlich Natürliche Moore (besitzen noch ursprüngliches Profil), deren Wasser-, Gefüge-, Nährstoffdynamik ist meist durch Entwässerung/Nutzung verändert.

Torfwachstum bei aktiven (noch wachsenden) Mooren etwa 1 mm pro Jahr

Moordegradierung Lewitz

4. Gefährdungen der Bodenpotenziale und Schlußfolgerungen für Bodenschutz & Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit

- **Versiegelung/Überprägung/Bodenverlust**
- **Erosion, Humusschwund & Verlust an Biodiversität**
- **Organische und anorganische Kontaminationen**

Die organische Bodensubstanz: Humus & Bodenorganismen

Bildung & Umsetzung

Bodenart, -feuchte, Menge & Qualität der Ausgangsmaterialien, Zersetzung & Mineralisierung („Bodenatmung“ = f [Temperatur, Feuchte, Organismenbesatz, Durchlüftung], physikalische/chemische Stabilisierung

Wirkung des Humus auf die Bodenfruchtbarkeit

Biologische

Grössere Biodiversität
 Verbesserter Stoffumsatz
 (Nährstofffreigabe, Schadstoffabbau)
 Höherer Organismenreichtum

Chemische

Höhere Nährstoffgehalte
 Bessere Verfügbarkeit
 Erhöhte Bindung (KAK)

GRATIS!

Grob- & Mittelporenvermehrung
 Verbesserung der Porosität, Nährstoff-
 Gasnutzung = Niedrigerer
 Düngbedarf

Verbesserung Durchlüftung, Durchwurzelbarkeit, Infiltration, Wasserhaltefähigkeit

Schadstoffabbau/
 -immobilisierung

Verringerte Verdichtbarkeit

Physikalische

Humusschwund – Klimawandel

Bildung & Umsetzung der organischen Bodensubstanzen

„Fließgleichgewicht“

Menge & Qualität der Ausgangsmaterialien, Zersetzung & Mineralisierung („Bodenatmung“), selektive Anreicherung, physikalische/chemische Stabilisierung

... durch Umverteilung in der Fläche: Erosion → Transport
→ Ablagerung

Winderosion verlagert humusreiches
Feinmaterial und humusfreien Sand
unterschiedlich weit

© Foto Dr. J. Kruse

Erhöhte Erosionsanfälligkeit bereits
Resultat der Humusverarmung?

© Foto Dr. J. Kruse

... durch Umverteilung in der Fläche: Erosion → Transport
→ Ablagerung Extreme Wassererosion Ende Mai 2013

© Foto Prof. P. Leinweber

Veränderungen des Humuszustandes

Modell-Standort im Landkreis Rostock: Auswirkung landwirtschaftlicher Nutzung von 1957-1978 bis zur Gegenwart

Schlußfolgerungen: Bodenfruchtbarkeit und ihre Erhaltung

- Die Böden in MV sind - wie auch andernorts - vielfältigen Gefährdungen und Belastungen ausgesetzt.
- Wichtigste Maßnahmen zum Bodenschutz sind Abwehr der Versiegelung & Entsiegelung, Verminderung der Erosion durch angepaßten Anbau (z.B. weniger Mais, mehr Dauerkulturen), Vermeidung von Kontaminationen (z.B. Cd und U in P-Düngern).
- Allseits positive Wirkungen des Humus auf Bodenfruchtbarkeit (ökologische Bodenfunktionen) und Biodiversität der Bodenlebewesen erfordern Maßnahmen zum Humuserhalt bzw. –mehrung, extensivere Landnutzung erhöht Biodiversität und beeinflußt Humusqualität.
- Verständnis der herausragenden Rolle fruchtbarer Böden als wichtige Lebensgrundlage muss in der Bevölkerung verbreitet werden.

Danke!

Die präsentierten Bodenprofile wurden mit Einverständnis der nutzenden Land- und Forstwirte angelegt.

Hierbei wurde teilweise freiwillige Hilfe und unentgeltliche Arbeit geleistet.

Die bodenchemischen Analysen der landwirtschaftlichen Standorte wurden finanziell unterstützt im Rahmen des BMBF-Projektes InnoSoilPhos.

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

InnoSoil hos